



Title	本邦産草蜻蛉科の一新種に就きて
Author(s)	岡本, 半次郎
Citation	札幌博物学会会報, 4(1), 13-14
Issue Date	1912-09-20
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/60852
Type	article
File Information	Vol.4No.1_003.pdf



[Instructions for use](#)

本邦産草蜻蛉科の一新種に就きて

農學士 岡本半次郎

EINE NEUE CHRYSOPIDEN-ART JAPANS.

Von

H. OKAMOTO, *Nogakushi*

(Mit 1 Textfigur)

Apochrysa matsumurae nov. spec.

Körper mit den Anhängen gelb-weisslich; Fühler etwas verdunkelt, das 1. Basalglied aussen breit purpurrot gestreift und das 2. Basalglied aussen dunkelbraun markiert. Clypeus an den Seiten je mit einem purpurroten Flecke. Pronotum an den Seiten je mit einem purpurroten Streifen gerandet. Hinterschenkel nahe der Spitze breit dunkelbraun geringelt. Jedes Tarsenglied an der Spitze hellbräunlich behaart. Klauen an der Spitze braun. Jedes Abdominalsegment an den Seiten purpurrot gestreift.

Fühler lang, länger als die Vorderflügel, ca. 30mm. Pronotum länger als breit. Flügel breit und lang, hyalin; Flügelfleck wie beim Textfigur 1, dunkelgrau. Nervatur fast farblos, hellgelb bis dunkelgrau behaart; im Vorderflügel stark, im Hinterflügel schwach netzartig nerviert. Venulae sectoris radii im Vorderflügel 22-26. Venillas gradiformis im Vorderflügel drei, nicht parallel; im Hinterflügel zwei, fast parallel. Flügelrand sehr dicht kurz behaart. Membran der beiden Flügel ziemlich stark grün bis rot irisierend.




Fig. 1.

Körperlänge 12-13 mm.

Vorderflügelänge 22-24 mm.

Grösste Vorderflügelbreite 9-10 mm.

Kagoshima: 2♂, 7/X, 1905, gesammelt von Herrn Prof. S. Matsumura.

Diese Art benenne ich zum Andenken am Sammler.

摘 要

本邦産草蜻蛉科の一新種に就きて

Apochrysa matsumurae nov. spec.

あみめくさかげろう (新 稱)

體全体黄白にして、觸角は少しく暗色を帶ぶ。觸角の第一基節はその外側に赤紫色の一縦線を有し、第二節の外側は暗褐色を呈す。額片は兩側に赤紫色の一斑紋を有し、前胸の側縁は赤紫色にて彩らる。後腿節は其尖端に近く暗褐の一環を具ふ、跗節の各節はろの尖端に淡褐毛を生じ、爪の尖端褐色なり。腹部の各節は兩側に赤紫色の一線を有す。

觸角は前翅より長く、約三十耗あり、翅は幅廣く且つ長くして、透明。翅の斑紋の位置は圖の如し、暗灰色なり。翅脈は殆んど無色にして、淡黄と暗灰色の短毛を密生し。前翅の脈は強く、後翅のものは弱く網目状を呈す。前翅の徑小脈枝(Venulae sectoris radii)は二十二乃至二十六を算す。Venillas gradiformisは前翅に於て三連、後翅に於て二連あり、而して前者の併行せざるに反し、後者のものは併行せり。翅縁に短き密毛あり。翅は紅綠色を稍強く放射す。

体長 12 - 13 耗

前翅の長さ 22 - 24 耗

前翅の幅 (最も廣き處) 9 - 10 耗

採集地及び採集者——鹿兒島 2 合, (松村博士)