



Title	MATERIAE FLORAE BRYOPHYTAE NIPPONICAE
Author(s)	Ihsiba, Eikiti
Citation	札幌博物学会会報, 13(4), 394-397
Issue Date	1934-12-20
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/64135
Type	article
File Information	Vol.13No.4_004.pdf



[Instructions for use](#)

MATERIAE FLORAE BRYOPHYTAE NIPPONICAE

AUCTORE

EIKITI IHSIBA

Brachyhecium populeum (HEDW.)

var. *brevinerve* IHSIBA, nov. var.

Folia anguste ovato-lanceolata, longe acuminata, nervis brevioribus.

Hab. Minô, Settu. (N. UI) Mt. Katuragi, Izumi. (T. NAKAZIMA, 1934)
Nokawa, Iyo. (IMAIZUMI, 1934) Uzi, Yamasiro. (M. AZUMA, 1934).

var. *lanceolatifolium* IHSIBA, nov. var.

var. *angustii* affinis, sed folia lanceolata, nervis brevioribus.

Hab. Atasika, Kii. (T. KOIDE, 1933).

Brachyhecium angustifolium IHSIBA. nov. sp.

Corticolum, gracile, longe repens. Folia anguste lanceolata, longe attenuata, integra vel ad apicem minute serrata, margine plus minusve involuta; cellulis anguste rhomboideo-linearibus ca. $78 \times 8 \mu$., alaribus quadratis vel rectangularibus, minutis, ca. 15μ . Perichaetium lanceolati-acuminatum, subintegrum, enervum. Seta ca. 12 mm. longa, rubra, laevis. Capsula ovalis, inclinata, minutis, fuscescens. Operculum?

Hab. Mt. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI 1933).

Brachyhecium Nakazimae IHSIBA. nov. sp.

Latercolum, gracile, sordido-viride. Caulis pergracilis, longe repens. Folia caulinis ovate-lanceolata, longe attenuata, integra vel ad apicem indistincte serrata; cellulis lineari-rhomboideis, alaribus minutis, brevi-rectangularibus; nervo ultra medium evanido. Seta ca. 8 mm. longa, purpurea. Perchaetium e late-basi piliformi-acuminatum. Capsula subinclinata, longe-elliptica. Operculum obtusum, erostratum.

Hab. Tokyo, Musashi. (T. NAKAZIMA, 1929).

Breidleria homaliaceus (BESCH.)

var. *longiseta* IHSIBA. nov. var.

Saxicola. Seta ultra 3 cm. longa.

Hab. Takayamamura, Settu. (N. UI, 1934.).

Catharinaea Haussknechtii (J. M.)var. ***elamellata*** IHSIBA et NAKAZIMA. nov. var.

Planta typicae peraffinis, sed nervo folii elamellato, rarius cum uniprocesso-unicelluli evanido.

Hab. Ame, Iga. (T. NAKAZIMA, 1933).

Fissidens Uii BROTHERUS.var. ***brevifolius*** IHSIBA. nov. var.

Folia elliptica, subobtusa, nervo undulato.

Hab. Kamiakitumura, Kii. (N. UI, 1934).

Ishibaea japonica BROTH. et OKAM.var. ***angustifolia*** IHSIBA, nov. var.*I. japonicae* peraffinis. Folia anguste-lanceolata vel lanceolata, subpiliformi-acuminata. Seta 6-10 mm. longa. Capsula cylindrica, erecta vel subcurvata. Operculum?

Hab. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI, 1933).

Distichophyllum TUTIGAE IHSIBA. nov. sp.Corticolum? Planta fere 4 cm. longa, flavo-virens, inferne lutea, plus minusve ramosa, complanate perspicenda. *F. C.* longe elliptica, brevi-cuspidata, integra; limbo angusto; cellulis rhomboideis, incrassatis, inferne longi-rhomboides, omnibus hyalinis; nervo tenue longe-infrae apicem evanido.

Hab. Mt. Kama, Ise. (Y. TUTIGA, 1934).

Isothecium diversiforme (MITT.)var. ***minor*** IHSIBA, nov. var.

Corticolum, gracile, atro-viride. Folia ovalis, breve-attenuata, subintegra; cellulis anguste-rhomboides-brevi-linearibus. Seta 4-5 mm. longa. Capsula longe-ovata vel oblonga. Perichaetium minute serratum.

Hab. Minô, Settu. (N. UI, 1933).

Philonotis Uii IHSIBA. nov. sp.Terricola; Planta laete viridis, usque ad 3 cm. alta, inferne brunneo-rhadiculosa. Folia patentia, late-lanceolata, longe attenuata, subfiliformia, basi excepta minute serrata; nervo cum apicem folii evanido; cellulis brevi-linearibus, subpapillosis, subobscuris, infernis rectangularibus hyalinis $15-31 \times 15 \mu$. Seta 4 cm. longa, purpurea. Capsula erecta. Dioica?

Hab. Mt. Iwawaki, Kawati. (N. UI, 1934).

Sphagnum hakkodense* WAR.**f. ***purpurea IHSIBA, nov. form.

Planta purpurascens.

Hab. Mt. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI, 1933).

Neckera pusilla* MITT.**var. ***longinervia IHSIBA, nov. var.

Corticola, subpusilla. Folia ovato-oblonga vel oblonga, subobtusata, sub-integra; nervo bino, brevi vel ultra medium evanido.

Hab. Mt. Kibune, Yamashiro. (R. TOYAMA, 1934.).

***Cyatophorella Nakazimae* IHSIBA, nov. sp.**Monoica? Corticola, pusilla, nitido-viridis-fuscosa. Folia secunda, pugioformia, brevi-obtusata terminata. integra vel superne minute serrata; cellulis anguste-rhomboidae-oblongis, $50 \times 1-2 \mu$; limbo indistincto; nervo ad medio desunt; amphigastria minuta, longiovata, subobtusata-attenuata, nervis bina vel indistincta. Seta 2 mm. Capsula ovalis; Operculum longe terminatum.

Hab. Mt. Usitaki, Izumi. (T. NAKAZIMA, 1934).

var. ***brevinerve*** IHSIBA, nov. var.

Nervo folii breviori vel indistincto.

Hab. Mt. Usitaki, Izumi. (T. NAKAZIMA, 1933).

Plagiothecium longisetum* LINDB.**var. ***brevinerve IHSIBA, nov. var.

Nervo folii infra medium dissoluto.

Hab. Mt. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI, 1933).

***Trichostomum robustum* BROTH. ms.**Planta 2 cm. longa. Ad *T. Uematui* et *Tortella tortuosae* affinis, sed folia anguste-oblonga, longe lineariae attenuata, elimbata; nervo fusco fere cum apice vel breviter excedente; cellulis basilaribus rectangularibus, hyalinis.

Hab. Mt. Yatu, Sinano. (IHSIBA).

***Madotheca kôtukensis* IHSIBA, nov. sp.**Corticola? Planta atrofuscescens, 8 cm. longa. Folia caulis ovata, rotundato-obtusata, integra vel minus crenata; cellulis $20-33 \mu$. Amphigastria ca, quadrato-rotundata, perremote obtuso-longispinosa vel subintegra; lobulus ovalis, remote spinosus vel destitutus.

Hab. Hinomura, Kôtuke. (K. MOMOI 1933).

Mastigobryum Pompeanum SANDE.

var. ***Uedae*** IHSIBA, nov. var.

Planta 6 cm longa, laete viridis, inferne brunnea. Folia ovato-ovalia, apice trilobata, rarus magis lobata, margine minute rotundato-obtusa crenata vel undulata; amphigastria subreniformequadrata, multifida, hic illic spinosis.

Hab. Kusuyama, Karahuto. (K. UEDA 1931).