



Title	MATERIAE FLORAE BRYOPHYTAE NIPPONICAE
Author(s)	Ihsiba, Eikiti
Citation	札幌博物学会会報, 13(4), 394-397
Issue Date	1934-12-20
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/64135">http://hdl.handle.net/2115/64135</a>
Type	article
File Information	Vol.13No.4_004.pdf



[Instructions for use](#)

# MATERIAE FLORAE BRYOPHYTAE NIPPONICAE

AUCTORE

EIKITI IHSIBA

## *Brachyhectium populeum* (HEDW.)

var. *brevinerve* IHSIBA, nov. var.

Folia anguste ovato-lanceolata, longe acuminata, nervis brevioribus.

Hab. Minô, Settu. (N. UI) Mt. Katuragi, Izumi. (T. NAKAZIMA, 1934)  
Nokawa, Iyo. (IMAIZUMI, 1934) Uzi, Yamasiro. (M. AZUMA, 1934).

var. *lanceolatifolium* IHSIBA, nov. var.

var. *angustii* affinis, sed folia lanceolata, nervis brevioribus.

Hab. Atasika, Kii. (T. KOIDE, 1933).

## *Brachyhectium angustifolium* IHSIBA. nov. sp.

Corticolum, gracile, longe repens. Folia anguste lanceolata, longe attenuata, integra vel ad apicem minute serrata, margine plus minusve involuta; cellulis anguste rhomboideo-linearibus ca.  $78 \times 8 \mu$ ., alaribus quadratis vel rectangularibus, minutis, ca.  $15 \mu$ . Perichaetium lanceolati-acuminatum, subintegrum, enervum. Seta ca. 12 mm. longa, rubra, laevis. Capsula ovalis, inclinata, minutis, fuscescens. Operculum?

Hab. Mt. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI 1933).

## *Brachyhectium Nakazimae* IHSIBA. nov. sp.

Latercolum, gracile, sordido-viride. Caulis pergracilis, longe repens. Folia caulinis ovate-lanceolata, longe attenuata, integra vel ad apicem indistincte serrata; cellulis lineari-rhomboideis, alaribus minutis, brevi-rectangularibus; nervo ultra medium evanido. Seta ca. 8 mm. longa, purpurea. Perchaetium e late-basi piliformi-acuminatum. Capsula subinclinata, longe-elliptica. Operculum obtusum, erostratum.

Hab. Tokyo, Musashi. (T. NAKAZIMA, 1929).

## *Breidleria homaliaceus* (BESCH.)

var. *longiseta* IHSIBA. nov. var.

Saxicola. Seta ultra 3 cm. longa.

Hab. Takayamamura, Settu. (N. UI, 1934).

***Catharinaea Haussknechtii*** (J. M.)var. ***elamellata*** IHSIBA et NAKAZIMA. nov. var.

Planta typicae peraffinis, sed nervo folii elamellato, rarius cum uniprocesso-unicelluli evanido.

Hab. Ame, Iga. (T. NAKAZIMA, 1933).

***Fissidens Uii*** BROTHERUS.var. ***brevifolius*** IHSIBA. nov. var.

Folia elliptica, subobtusa, nervo undulato.

Hab. Kamiakitumura, Kii. (N. UI, 1934).

***Ishibaea japonica*** BROTH. et OKAM.var. ***angustifolia*** IHSIBA, nov. var.*I. japonicae* peraffinis. Folia anguste-lanceolata vel lanceolata, subpiliformi-acuminata. Seta 6-10 mm. longa. Capsula cylindrica, erecta vel subcurvata. Operculum?

Hab. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI, 1933).

***Distichophyllum*** TUTIGAE IHSIBA. nov. sp.Corticolum? Planta fere 4 cm. longa, flavo-virens, inferne lutea, plus minusve ramosa, complanate perspicenda. *F. C.* longe elliptica, brevi-cuspidata, integra; limbo angusto; cellulis rhomboideis, incrassatis, inferne longi-rhomboides, omnibus hyalinis; nervo tenue longe-infrae apicem evanido.

Hab. Mt. Kama, Ise. (Y. TUTIGA, 1934).

***Isothecium diversiforme*** (MITT.)var. ***minor*** IHSIBA, nov. var.

Corticolum, gracile, atro-viride. Folia ovalis, breve-attenuata, subintegra; cellulis anguste-rhomboides-brevi-linearibus. Seta 4-5 mm. longa. Capsula longe-ovata vel oblonga. Perichaetium minute serratum.

Hab. Minô, Settu. (N. UI, 1933).

***Philonotis Uii*** IHSIBA. nov. sp.Terricola; Planta laete viridis, usque ad 3 cm. alta, inferne brunneo-rhadiculosa. Folia patentia, late-lanceolata, longe attenuata, subfiliformia, basi excepta minute serrata; nervo cum apicem folii evanido; cellulis brevi-linearibus, subpapillosis, subobscuris, infernis rectangularibus hyalinis  $15-31 \times 15 \mu$ . Seta 4 cm. longa, purpurea. Capsula erecta. Dioica?

Hab. Mt. Iwawaki, Kawati. (N. UI, 1934).

***Sphagnum hakkodense* WAR.**f. ***purpurea*** IHSIBA, nov. form.

Planta purpurascens.

Hab. Mt. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI, 1933).

***Neckera pusilla* MITT.**var. ***longinervia*** IHSIBA, nov. var.

Corticola, subpusilla. Folia ovato-oblonga vel oblonga, subobtusata, sub-integra; nervo bino, brevi vel ultra medium evanido.

Hab. Mt. Kibune, Yamashiro. (R. TOYAMA, 1934).

***Cyatophorella Nakazimae* IHSIBA, nov. sp.**Monoica? Corticola, pusilla, nitido-viridis-fuscosa. Folia secunda, pugioformia, brevi-obtusata terminata. integra vel superne minute serrata; cellulis anguste-rhomboidae-oblongis,  $50 \times 1-2 \mu$ ; limbo indistincto; nervo ad medio desunt; amphigastria minuta, longiovata, subobtusata-attenuata, nervis bina vel indistincta. Seta 2 mm. Capsula ovalis; Operculum longe terminatum.

Hab. Mt. Usitaki, Izumi. (T. NAKAZIMA, 1934).

var. ***brevinerve*** IHSIBA, nov. var.

Nervo folii breviori vel indistincto.

Hab. Mt. Usitaki, Izumi. (T. NAKAZIMA, 1933).

***Plagiothecium longisetum* LINDB.**var. ***brevinerve*** IHSIBA, nov. var.

Nervo folii infra medium dissoluto.

Hab. Mt. Hakkôda, Mutsu. (S. MURAI, 1933).

***Trichostomum robustum* BROTH. ms.**Planta 2 cm. longa. Ad *T. Uematui* et *Tortella tortuosae* affinis, sed folia anguste-oblonga, longe lineariae attenuata, elimbata; nervo fusco fere cum apice vel breviter excedente; cellulis basilaribus rectangularibus, hyalinis.

Hab. Mt. Yatu, Sinano. (IHSIBA).

***Madotheca kôtukensis* IHSIBA, nov. sp.**Corticola? Planta atrofuscescens, 8 cm. longa. Folia caulis ovata, rotundato-obtusata, integra vel minus crenata; cellulis  $20-33 \mu$ . Amphigastria ca, quadrato-rotundata, perremote obtuso-longispinosa vel subintegra; lobulus ovalis, remote spinosus vel destitutus.

Hab. Hinomura, Kôtuke. (K. MOMOI 1933).

***Mastigobryum Pompeanum*** SANDE.

var. ***Uedae*** IHSIBA, nov. var.

Planta 6 cm longa, laete viridis, inferne brunnea. Folia ovato-ovalia, apice trilobata, rarus magis lobata, margine minute rotundato-obtusa crenata vel undulata; amphigastria subreniformequadrata, multifida, hic illic spinosis.

Hab. Kusuyama, Karahuto. (K. UEDA 1931).