



Title	Die Heteromeren aus den Kurilen (Col.) (Erster Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kurilen)
Author(s)	Kono, Hiromichi
Citation	Insecta matsumurana, 9(3), 85-89
Issue Date	1935-03
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/9291">http://hdl.handle.net/2115/9291</a>
Type	bulletin (article)
File Information	9(3)_p85-89.pdf



[Instructions for use](#)

DIE HETEROMEREN AUS DEN KURILEN (*COL.*)  
(ERSTER BEITRAG ZUR KENNTNIS  
DER KÄFERFAUNA DER KURILEN)

VON

HIROMICHI KÔNO

Herr K. DOI hat sich die Erforschung der Insektenfauna der Kurilen zur Aufgabe gestellt und mir die Heteromeren seiner Sammelausbeute zur Bearbeitung zugesandt. Ausserdem erhielt ich von Herrn M. L. PEELE 2 auf der Insel Etorofu gesammelte Arten. Hiermit drücke ich den beiden Herren für ihre Freundlichkeit meinen herzlichsten Dank aus.

Familie *OEDEMERIDAE*

Tribus **Nacerdini**

1. *Xanthochroa atriceps* LEWIS

*Xanthochroa atriceps* LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 436 (1895); KÔNO, Ins. Mats., VI, 3, p. 141 (1932); id., Ins. Mats., IX, p. 27 (1934); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundorte: Ins. Kunashiri (Nikishiro, 1 ♂ u. 1 ♀, 12/VIII. 1925, K. DOI, Fushikokotan, 1 ♀, 11/VIII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Kikubi-kamikirimodoki*.

2. *Xanthochroa hilleri* HAROLD

*Xanthochroa hilleri* HAROLD, Deutsch. Ent. Zeitschr., XX, p. 71 (1878); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 108 (1933).

*Xanthochroa hilleri* KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 62 (1931); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 27 (1934).

Fundort: Ins. Shikotan.

G. V.: Kurilen, Hokkaido, Honshu, Shikoku.

J. N.: *Kiuro-kamikirimodoki*.

3. *Ezonacerta nigripennis* (MATSUMURA)

*Oedemera nigripennis* MATSUMURA, Journ. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ., Sapporo, IV, p. 128 (1911); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931).

[Ins. Mats., Vol. IX, No. 3, March, 1935]

*Nacerda nigripennis* KÔNO, Ins. Mats., VI, p. 143 (1932); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

*Ezonacerda nigripennis* KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 28 (1934).

Fundorte: Ins. Etorofu (Rubetsu, 1 ♀, 3/VIII. 1931, M. L. PEELE); Ins. Shikotan.

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido.

J. N.: *Kuro-kamikirimodoki*.

#### Tribus **Asclerini**

##### 4. *Chrysanthia viatica* LEWIS

*Chrysanthia viatica* LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 443 (1895); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., p. 110 (1933); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 29 (1934).

Fundorte: Ins. Etorofu (Oyama, 1 Ex., 24/VII. 1924, K. DOI); Ins. Shikotan (Notoro, 1 Ex., 14/VII. 1925, Shakotan, 1 Ex., 22/VII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Suji-kamikirimodoki*.

#### Tribus **Oedemerini**

##### 5. *Oedemera concolor* LEWIS

*Oedemera concolor* LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 442 (1895); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 30 (1934).

Fundorte: Ins. Etorofu (Kamuikotan, 2 ♀, 20/VII. 1927, Shana, 1 ♂, 9/VII. 1927, K. DOI); Ins. Shikotan (Shakotan, 1 ♂ u. 2 ♀, 6/VII. 1925, Horobetsu, 2 ♂ u. 1 ♂, 10/VII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido.

J. N.: *Kuroao-kamikirimodoki*.

##### 6. *Oedemera lucidicollis* MOTSCHULSKY

*Oedemera lucidicollis* MOTSCHULSKY, Bull. Mosc., XXXIX, 1, p. 174 (1866).

*Oedemera montana* MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), VI, p. 485 (1876); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundorte: Ins. Etorofu (Shana, 1 ♂ u. 1 ♀, 30/VII. 1927, K. DOI); Ins. Shikotan; Ins. Kunashiri (Nikishiro, 2 ♀, 12/VIII. 1925, K. DOI).

G. V.: Kurilen, Hokkaido, Honshu, Kiushu.

J. N.: *Momobuto-kamikirimodoki*.

Familie *PYROCHROIDAE*1. *Schizotus fuscicollis* (MANNERHEIM)

*Pyrochroa fuscicollis* MANNERHEIM, Bull. Mosc., p. 301 (1852).

*Schizotus fuscicollis* KÔNO, Ins. Mats., III, p. 65 (1929); id., Ins. Mats., IX, p. 30 (1934); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundorte: Ins. Paramushiru (Nosauki, 2 ♂ u. 1 ♀, 9/VII. 1926, Arakawa, 1 ♂, 7/VII. 1926, K. Doi).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Kamtchatka, Sibirien.

J. N.: *Karafuto-akahanemushi*.

2. *Pseudopyrochroa rufula etorofuensis* n. subsp.

*Pseudopyrochroa vestiflua* KÔNO, Ins. Mats., III, p. 69 (1929); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Die mir vorliegenden 5 Exemplare aus den Süd-Kurilen—in dieser Lokalität wurde das Männchen noch nicht aufgefunden—haben Fühler mit etwas längeren und schlankeren Ästen als die der Stammform.

KOBAYASHI'sche *vestiflua* aus der Ins. Shikotan ist auch höchst wahrscheinlich auch *etorofuensis*.

Fundorte: Ins. Etorofu (Kamuikotan, 2 ♀, 20/VII. 1927, Iriribushi, 1 ♀, 22/VII. 1927, Naipo, 1 ♀, 18/VII. 1927, Shana, 1 ♀, 10/VII. 1927, K. Doi); Ins. Shikotan.

G. V.: Kurilen.

J. N.: *Akahanemushi*.

Familie *MELOIDAE*Tribus **Meloini**1. *Meloe lobata* GEBLER

*Meloe lobata* GEBLER, Nouv. Mém. Mosc., II, p. 57 (1832); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 31 (1934).

Fundort: Ins. Kunashiri (nach T. KANO).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Ins. Querspart, Korea, Ost-Sibirien.

J. N.: *Karafuto-tsuchihanmyo*.

Familie *MORDELLIDAE*Tribus **Mordellini**1. *Mordella aculeata* LINNÉ

*Mordella aculeata* LINNÉ, Syst. Nat., ed. X, p. 420 (1758); KÔNO, Ins. Mats., III, p. 83 (1929);

id., Ins. Mats., IX, p. 33 (1934); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundort: Ins. Shikotan (1 Ex., 14/VII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Korea, Mongolei, Kamtschatka, Sibirien, Europa.

J. N.: *Kuro-hananomi*.

#### Tribus **Anaspidini**

##### 2. **Anaspis frontalis** (LINNÉ)

*Mordella frontalis* LINNÉ, Syst. Nat., ed. X, p. 420 (1758).

*Anaspis frontalis* KONO, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., XII, p. 154 (1932); id., Ins. Mats., IX, p. 34 (1934).

Fundort: Ins. Shikotan (1 ♀, 9/VIII. 1931, M. L. PEELE).

G. V.: Sachalin, Ins. Kaibato, Kurilen, Hokkaido, Sibirien, Europa.

J. N.: *Ô-kuro-funagatahananomi*.

#### Familie **SERROPALPIDAE**

#### Tribus **Serropalpini**

##### 1. **Serropalpus niponicus** LEWIS

*Serropalpus niponicus* LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 263 (1895); KONO, Ins. Mats., IX, p. 35 (1934).

Fundort: Ins. Kunashiri (Fushikokotan, 1 Ex., 11/VIII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Hoso-nagakuchiki*.

#### Familie **TENEBRIONIDAE**

#### Tribus **Phalerini**

##### 1. **Phaleromela subhumeralis** (MARSEUL)

*Phaleria subhumeralis* MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), VI, p. 102 (1876).

Bisher ist diese Art nur aus Hokkaido, Honshu und Sachalin bekannt. Neuerdings ist ihr Vorkommen auch auf den Kurilen festgestellt worden.

Fundort: Ins. Uruppu (Onsenzaki, 3 Ex., 10/IX, 1927, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Kamtschatka.

J. N.: *Ko-hone-gomimushidamashi*.

##### 2. **Obenbergeria riederi** (FALDERMAN)

*Phaleria Riederi* FALDERMAN, Bull. Mosc., VI, p. 57, t. 3, f. 8 (1833).

Diese von Mandschurei bis Kamtschatka weit verbreitete Art kommt auch

auf den Kurilen vor. Meine Sammlung weist bereits 5 Exemplare aus dieser Lokalität auf.

Fundorte: Ins. Uruppu (Tokotan, 3 Ex., 31/VIII. 1927, Kobuneminato, 1 Ex., 26/VIII. 1927, K. Doi); Ins. Shikotan (1 Ex., 5/VII. 1925, K. Doi).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Kamtschatka, Mandschurei.

J. N.: *Hone-gominushidamashi*.

### Tribus **Helopini**

#### 3. ***Stenophanes strigipennis*** MARSEUL

*Stenophanes strigipennis* MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), VI, p. 138 (1876).

Dass dieses Tierchen auch auf den Kurilen vorkommt, ist eine Neufeststellung.

Fundort: Ins. Etorofu (Shana, 1 Ex., 12/VII. 1927, K. Doi).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Hime-kimawari*.

#### 4. ***Stenophanes strigipennis doii*** n. subsp.

Das Tierchen unterscheidet sich von der Stammform durch das viel kürzere und breitere Halsschild mit der weniger gewölbten Scheibe.

Fundort: Ins. Uruppu (Onsenzaki, 3 Ex., 10/IX, 1927, K. Doi).

G. V.: Kurilen.

### Literaturverzeichnis

- 1929 KÔNO, H.: Die Pyrochroiden Japans (Ins. Mats., III, pp. 62-72).  
 ——— : Die Mordelliden Japans, Erster Nachtrag (Ins. Mats., III, pp. 83-86).
- 1931 KOBAYASHI, K.: Chishima-no-kuni Shikotan-tô no Saishûhin ni tsuite (Trans. Kansai Ent. Soc., 2, pp. 55-66).
- 1932 KÔNO, H.: Die Nacerdinen Japans (Ins. Mats., VI, pp. 138-144).
- 1933 KANO, T.: Coleopterous Insects from the Northern Kuriles, with Some Considerations on the Insect-Fauna of the Kurile Islands (Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, pp. 91-121).
- 1934 KÔNO, H.: Die Heteromeren von Sachalin (Ins. Mats., IX, pp. 27-40).