



Title	Die Heteromeren aus Kurilen 2 (Sechster Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kurilen)
Author(s)	Kono, Hiromichi
Citation	Insecta matsumurana, 10(3), 104-106
Issue Date	1936-03
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/9321
Type	bulletin (article)
File Information	10(3)_p104-106.pdf



[Instructions for use](#)

DIE HETEROMEREN AUS DEN KURILEN II
(SECHSTER BEITRAG ZUR KENNNTNIS
DER KÄFERFAUNA DER KURILEN)

VON

HIROMICHI KÔNO

Im Jahre 1935 gelang Herrn Dr. T. UCHIDA mit Hilfe von Herrn Y. SUGIHARA eine sehr erfolgreiche Ausbeute aus den Süd-Kurilen. Unter der Sammlung befinden sich 13 Heteromeren-Arten, von denen 3 für den Kurilen neu sind.

Hiermit spreche ich Herrn Dr. T. UCHIDA für die Überlassung von Material meinen besten Dank aus.

Familie *OEDEMERIDAE*

Tribus **Nacerdini**

†*Xanthochroa atriceps* LEWIS

Fundort: Ins. Kunashiri (Nikishiro, 1 ♂, 17-22/VII., Dr. T. UCHIDA, Maruyama, 1 ♂ u. 1 ♀, 26/VII., Dr. T. UCHIDA u. Y. SUGIHARA).

Tribus **Asclerini**

†*Chrysanthia viatica* LEWIS

Fundort: *Ins. Kunashiri (Maruyama, 1 ♀, 26/VII., Dr. T. UCHIDA u. Y. SUGIHARA, Nikishiro, 1 ♂ u. 1 ♀, 17/VII., Dr. T. UCHIDA, Yambetsu, 1 ♀, 22-25/VII., Dr. T. UCHIDA).

Ditylus laevis (FABRICIUS)

Helops laevis FABRICIUS, Mant. Ins., I, p. 213 (1787).

Diese von Europa bis Sachalin und Hokkaido weit verbreitete Art kommt auch auf den Kurilen vor.

Fundorte: *Ins. Shikotan (Shakotan, 1 ♂ u. 1 ♀, 23-27/VI., Y. SUGIHARA); *Ins. Kunashiri (Nikishiro, 2 ♀, 17-22/VII., Dr. T. UCHIDA).

† Siehe auch: KÔNO, H.—Die Heteromeren aus den Kurilen (Ins. Mats., IX, pp. 85-86) (1935).

* Neuer Fundort.

[Ins. Mats., Vol. X, No. 3, March, 1936]

Geographische Verbreitung: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Sibirien, Europa.
 Japanischer Name: *Miyama-kamikirimodoki*.

Tribus **Oedemerini**

†**Oedemera concolor** LEWIS

Fundorte: Ins. Etorofu (Shana, 8 ♂ ♀, 11-20/VII., Y. SUGIHARA, Rubetsu, 1 ♀, 2-10/VII., Y. SUGIHARA); *Ins. Kunashiri (Yambetsu, 3 ♀, 22-25/VII., Dr. T. UCHIDA).

†**Oedemera lucidicollis** MOTSCHULSKY

Fundorte: Ins. Kunashiri (Yambetsu, 2 ♂ u. 3 ♀, 22-25/VII., Dr. T. UCHIDA); Ins. Shikotan (Shakotan, 1 ♀, 23-27/VI., Y. SUGIHARA).

Familie *PYROCHROIDAE*

†**Schizotus fuscicollis** (MANNERHEIM)

Fundort: Ins. Paramushiru (Suribachiwan, 1 ♀, 23/VII. 1935, K. HATSUMI, K. NISHI u. K. OTA).

†**Pseudopyrochroa rufula** (MOTSCHULSKY)

Pyrochroa rufula MOTSCHULSKY, Bull. Mosc., p. 173 (1866).

Pyrochroa vestiflua LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 169 (1887).

Pseudopyrochroa vestiflua KÔNO, Ins. Mats., III, p. 69 (1929); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Pseudopyrochroa rufula etorofuensis KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 87 (1935).

Fundort: *Ins. Kunashiri (Maruyama, 1 ♂ u. 1 ♀, 26/VII., Dr. T. UCHIDA u. Y. SUGIHARA, Nikishiro, 1 ♀, 17/22VII., Dr. T. UCHIDA).

G. V.: Sachalin, Kurilen (Ins. Kunashiri, Ins. Etorofu, Ins. Shikotan), Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Akahanemushi*.

Familie *MORDELLIDAE*

†**Anaspis frontalis** (LINNÉ)

Fundorte: *Ins. Kunashiri (Seseki, 1 ♀, 27-28/VII. Dr. T. UCHIDA, Yambetsu, 1 ♂ u. 1 ♀, 29/VII., Dr. T. UCHIDA); *Ins. Etorofu (Shana, 6 ♂ u. 1 ♀, 11-20/VII., Y. SUGIHARA); Ins. Shikotan (Shakotan, 1 ♂ u. 1 ♀, 23-27/VI., Y. SUGIHARA).

Familie *OTHNIIDAE****Othnius kraatzi*** REITTER

Othnius Kraatzi REITTER, Deutsch. Ent. Zeitschr., XXIII, p. 226 (1879).

Diese Art ist bisher nur aus Hokkaido und Honshu bekannt. Sie kommt aber auch auf den Kurilen vor.

Fundort: *Ins. Kunashiri (Maruyama, 2 Ex., 26/VII., Dr. T. UCHIDA u. Y. SUGIHARA).

G. V.: Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Kuchikidamashi*.

Familie *LAGRIIDAE****Lagria nigricollis*** HOPE

Lagria nigricollis HOPE, Proc. Ent. Soc., p. 61 (1842).

Dass dieses Tierchen auch auf den Kurilen vorkommt, ist eine Neufeststellung.

Fundort: *Ins. Kunashiri (Yambetsu, 2 ♀, 22-25/VII., Dr. T. UCHIDA).

G. V.: Sachalin, Kurilen (Ins. Kunashiri), Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu, China, Sibirien.

J. N.: *Hamushidamashi*.

Familie *TENEBRIONIDAE*Tribus **Phalerini**†***Phaleromela subhumeralis*** (MARSEUL)

Fundorte: *Ins. Kunashiri (Nikishiro, 12 Ex., 17-22/VII. Dr. T. UCHIDA, Yambetsu, 3 Ex., 22-25/VII., Dr. T. UCHIDA); *Ins. Etorofu (Rubetsu, 16 Ex., 2-10/VII., Y. SUGIHARA); *Ins. Shikotan (Shakotan, 5 Ex., 23-27/VII., Y. SUGIHARA).

†***Obenbergeria riederi*** (FALDERMAN)

Fundort: *Ins. Etorofu (Rubetsu, 2 Ex., 2-10/VII., Y. SUGIHARA).

Tribus **Helopini**†***Stenophanes strigipennis*** MARSEUL

Fundort: *Ins. Kunashiri (Yambetsu, 1 ♂ u. 1 ♀, 22-25/VII., Dr. T. UCHIDA).