



Title	Zur Synonymie der japanischen Ichneumoniden (6)
Author(s)	Uchida, Toichi
Citation	Insecta matsumurana, 20(1-2), 49-49
Issue Date	1956-06
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/9585
Type	bulletin (article)
File Information	20(1-2)_p49-49.pdf



[Instructions for use](#)

schwarz gefärbten Hinterleib. In der Färbung verwandt die Art mit dem *A. diminutus* (UCHIDA), weicht aber von ihm durch die nicht weiss geringelten Antennen und die Form des Schildchens leicht ab, und zwar ist das Schildchen dieser Art dachförmig stark gewölbt, deutlich breiter als lang, hinten abfallend, aber in der letzteren Art ist das Schildchen rundlich konvex, länger als breit und hinten nicht abfallend.

ZUR SYNONYMIE DER JAPANISCHEN ICHNEUMONIDEN (6)

Von TOICHI UCHIDA

Colptrochioides UCHIDA (1930) = *Colpotrochia* HOLMGREN (1856)

Nach den Herrn Dr. H. TOWNES ist *Colptrochioides*, der ich in Jour. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., 25 (4), p. 263, 1930 als eine neue Gattung unter der Tribus Exochini der Unterfamilie Metopiinae veröffentlichte, Synonym der *Colpotrochia*. Also sind die 4 folgenden Arten, nämlich *Colpotrochioides orientalis* UCHIDA (Korea), *C. kurisuei* UCHIDA (Korea), *C. flavus* UCHIDA (Japan), *C. fasciatus* UCHIDA (China) unter der Gattung *Colpotrochia* zu stellen.

Tylocomnoides UCHIDA (1940) = *Pseudometopius* DAVIS (1897)

Eine Gattung *Tylocomnoides* UCHIDA (Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., 16 (3), p. 178, 1940) von der Tribus Tylocomnini der Metopiinae ist nichts anders als die nordamerikanische Gattung *Pseudometopius* DAVIS (Amer. Ent. Soc. Trans., 20, p. 197, 1897), wie die Weisung des Herrn Dr. H. TOWNES.

Nach seiner Meinung ist noch eine andere Gattung *Odontotylocomnus* UCHIDA (lit. cit., p. 179, 1940) auch Synonym des *Pseudometopius*, aber sie scheint mir eine gute Gattung der letzteren zu sein; und man kann sie von dem typischen *Pseudometopius* durch das oben stark gewölbte und 2 zahnförmige Fortsätze gehabte Gesicht, den an der Spitzenhälfte dicht gold behaarten Hinterleib sowie auch die stark verdickten Beine, besonders die 4 vorderen Tarsen, leicht abweichen.