



# HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	Zweiter Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Japans
Author(s)	UCHIDA, Toichi
Citation	Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University, 21(5), 177-297
Issue Date	1928-07-31
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/12623">https://hdl.handle.net/2115/12623</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	21(5)_p177-297.pdf



# Zweiter Beitrag zur Ichneumoniden- Fauna Japans

Von

Toichi Uchida

(Mt 3 Tafeln)

## EINLEITUNG

Im Jahre 1926 habe ich einen Beitrag über eine Unterfamilie Ichneumoninen von Ichneumoniden Japans im „Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univer., Vol. XVIII, pt. 2“ veröffentlicht; diesmal möchte ich auf eine Unterfamilie Ophioninen in Japan, inklusive Sachalin, Kurilen, Okinawa (Riukiu-Inseln), Formosa und Korea zu sprechen kommen.

Als Ophioninen Japans waren bis heute nur etwa 48 Arten und 5 Varietäten bekannt. In diesem Beitrage habe ich jedoch 164 Arten und 29 Varietäten anzugeben, von denen 79 Arten und 23 Varietäten für die wissenschaftliche Welt neu sind. Die systematische Forschung verlangt ausserdem die Aufstellung von 5 neuen Gattungen.

Die folgenden 37 Arten und eine Varietät sind neu für Japan:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <i>Opheltes glaucopterus</i> L.             | 2. <i>Paniscus cephalotes</i> HOLMGR.      |
| 3. <i>P. grumi</i> KOKJ.                       | 4. <i>P. nigriventris</i> BRULL.           |
| 5. <i>P. testaceus</i> GRAV.                   | 6. <i>P. ocellaris</i> THOMS.              |
| 7. <i>P. gracilipes</i> THOMS.                 | 8. <i>P. capito</i> KOKJ.                  |
| 9. <i>P. opaculus</i> THOMS.                   | 10. <i>Parabatus virgatus</i> FOURC.       |
| 11. <i>P. tarsatus</i> BRISCH.                 | 12. <i>P. cristatus</i> THOMS.             |
| 13. <i>P. latunguls</i> THOMS.                 | 14. <i>Eremotylus sibiricus</i> SZÉPL.     |
| 15. <i>Diocetes vulgaris</i> MORL.             | 16. <i>Henicospilus flavocephalus</i> KBY. |
| 17. <i>H. combustus</i> GRAV.                  | 18. <i>H. ramidulus</i> L.                 |
| 19. <i>H. reticulatus</i> CAM.                 | 20. <i>H. meridarius</i> GRAV.             |
| 21. <i>Schizoloma amictum</i> F.               | 22. <i>S. capitatum</i> DESV.              |
| 23. <i>Exochilum circumflexum</i> L.           | 24. <i>Heteropelma calcator</i> WESM.      |
| var. <i>nigroscutellata</i> HELL.              |  |
| 25. <i>Trichomma enacator</i> ROSS.            | 26. <i>Aphanistes bellicosus</i> WESM.     |
| 27. <i>Agrypon varitarsum</i> WESM.            | 28. <i>A. flaveolatum</i> GRAV.            |
| 29. <i>Plesiophthalmus melanocephalus</i> HAB. | 30. <i>P. atarius</i> GRAV.                |
| 31. <i>Mesochorus fulugrans</i> CURT.          | 32. <i>Banchus monileatus</i> GRAV.        |
| 33. <i>B. falcatorius</i> F.                   | 34. <i>Xenoschesis fulvipes</i> GRAV.      |
| 35. <i>Exetastes ichneumoniformis</i> GRAV.    | 36. <i>E. robustus</i> GRAV.               |
| 37. <i>E. cincipes</i> REZ.                    | 38. <i>E. fornicator</i> F.                |

Fast alle Ophioninen sind Schmarotzer, und zwar leben sie in den Larven verschiedener Insekten besonders in Lepidopteren; sie sind somit für die Land- und Forstwirtschaft sehr nützlich, aber das Studium über Wirt und Lebensweise weist noch grosse Lücken auf. Durch meine Arbeit habe ich gefunden, dass unter den 164 Arten und 29 Varietäten nur die folgenden 32 schmarotzen können, und zwar 3 in Hymenopteren- und 29 in Lepidopteren-Larven:

<i>Opheltes glaucopterus</i> L. ....	<i>Cimbex femorata</i> L.
<i>Opheltes glaucopterus</i> L.	{ <i>Cimbex femorata</i> L. var. <i>japonica</i> KBY. <i>Dendrolimus albolineatus</i> MATS.
var. <i>apicalis</i> MATS. ....	
<i>Paniscus cephalotes</i> HOLMGR. ....	{ <i>Amorpha amurensis</i> STGR. <i>Smerinthus ocellatus</i> L. <i>Dasychira pudibunda</i> L.
	<i>Acronycta psi</i> L.
	<i>A.</i> <i>tridens</i> SCHIFF.
	<i>Cucullia asteris</i> SCHIFF.
	<i>C.</i> <i>frateris</i> SCHIFF.
	<i>Siderides (Leucania) unipuncta</i> HAW.
	<i>Dendrolimus spectabilis</i> BUTL.
<i>Paniscus testaceus</i> GRAY. ....	{ <i>Amorpha amurensis</i> STGR. <i>Acronycta psi</i> L. <i>Cucullia asteris</i> SCHIFF. <i>Cimbex femorata</i> L.
	<i>Dendrolimus spectabilis</i> BUTL.
	<i>Acronycta psi</i> L.
	<i>A.</i> <i>major</i> BREM.
<i>Paniscus ocellaris</i> THOMS. ....	{ <i>Cucullia perforata</i> BREM. <i>Barathra brassicae</i> L. <i>Plusia agnata</i> STGR. <i>Siderides (Leucania) unipuncta</i> HAW.
	<i>Cosmia trapezina saturata</i> STGR.
	{ <i>Tephroclysta castigata</i> HB. <i>T.</i> <i>virgaureata</i> DBLD.
<i>Thyreodon purpurascens</i> SM. ....	<i>Ampelophaga rubiginosa</i> BREM. et GREY.
<i>Henicospilus striatus</i> CAM. ....	<i>Orgyia postica</i> WK.
<i>Nipponophion variegatus</i> UCH. ....	<i>Actias artemis</i> BREM.
	{ <i>Dicraneura vinura felina</i> BUTL. <i>Acronycta leporia leporella</i> STGR.
	<i>A.</i> <i>lutea</i> BREM. et GREY.
	<i>Rhyasia c-nigrum</i> L.
	{ <i>Barathra brassicae</i> L. <i>Calymnia bifasciata pryeri</i> LEECH <i>Psiloreta calida</i> BUTL.
<i>Ophion luteus</i> L. ....	<i>Dasychira pudibunda</i> L.
<i>Henicospilus merdarius</i> GRAY. ....	{ <i>Panolis griseovariegata</i> GEOG. <i>Dianthoecia irregularis aberrans</i> EV.
	<i>Henicospilus sakaguchii</i> MATS. et UCH. <i>Sesamia inferens</i> WK.

<i>Henicospilus combustus</i> GRAV. ....	<i>Trachea tokiensis</i> BUTL.
<i>Henicospilus ramidulus</i> L. ....	<i>Catocala electa</i> BUTL.
<i>Schizoloma amictum</i> F. ....	{ <i>Dendrolimus albolineatus</i> MATS. <i>Dasychira pudibunda</i> L.
<i>Exochilum circumflexum</i> L.	
var. <i>dendrolimi</i> MATS. ....	<i>Dendrolimus albolineatus</i> MATS.
<i>Trichomma enaphalocrocise</i> UCH. ..	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i> GUEN.
	{ <i>Dictyoploca japonica</i> MOOR.
<i>Acanthostoma insidiator</i> SM. ....	{ <i>Antharea pernyi</i> GUÉR. <i>A. yamamai</i> GUÉR. <i>Caligula boisduvalii</i> EV.
<i>Habronyx heros</i> WESM.	
var. <i>matsukemushii</i> MATS. ....	<i>Dendrolimus albolineatus</i> MATS.
<i>Aphanistes jozankeanus</i> MATS. ....	<i>Dendrolimus albolineatus</i> MATS.
<i>Exetastes cinctipes</i> RETZ. ....	<i>Barathra brassicae</i> L.
<i>Agrypon flavifrontatum</i> SM. ....	<i>Episyrphus balteatus</i> DEG.
<i>Zacharops narangae</i> CUSH. ....	<i>Naranga aenescens</i> MOOR.
<i>Rhythmotus takagii</i> MATS. ....	<i>Dendrolimus spectabilis</i> BUTL.
<i>Melalophacharops tamanukii</i> UCH. ..	<i>Melalopha anastomosis</i> L.
<i>Diocles lineatus</i> ISHID. ....	<i>Eucosma schistaceana</i> SNELL.
<i>Limmerium exartemae</i> UCH. ....	<i>Exartema mori</i> MATS.
<i>Diaparsis japonicus</i> ASH. ....	<i>Chilo simplex</i> BUTL.
<i>Diaparsis coreanus</i> UCH.	
var. <i>kondonis</i> UCH. ....	<i>Nephoteryx puvivorella</i> MATS.

Von diesen Arten und Varietäten sind *Opheltes glaucopterus* L. var. *apicalis* MATS., *Exochilum circumflexum* L., *Exochilum circumflexum* L. var. *dendrolimi* MATS., *Schizoloma amictum* F. und *Habronyx heros* WESM. var. *matsukemushii* MATS. sowohl in Sachalin wie auch auf den Kurilen, sowie *Rhythmotus takagii* MATS. in Korea, sehr nützliche Insekten. Die letztere Art kann in der Larve von *Dendrolimus spectabilis* BUTL., und die anderen in der Larve von *Dendrolimus albolineatus* MATS. schmarotzen. Diese beiden *Dendrolimus*-Arten sind sehr schädliche Insekten für die verschiedenen Arten von Koniferen in Japan.

*Diaparsis japonicus* ASH. ist eine sehr wertvolle Schmarotzerhymenoptera, welche sich in der Larve einer den Reispflanzen schädlichen Insektenart, *Chilo simplex* BUTL., ernährt.

*Paniscus ocellaris* THOMS. und *Ophion luteus* L. sind in Hokkaido sehr bekannt als die nützlichen Schmarotzer von *Barathra brassicae* L.

Das Material, welches zu dieser Arbeit vorlag, stammt hauptsächlich aus der im Entomologischen Museum der Kaiserlichen Hokkaido Universität in Sapporo deponierten Sammlung des Herrn Prof. Dr.

S. MATSUMURA und des Verfassers selbst. Ausserdem haben auch die Herren K. TAMANUKI, H. KÔNO und Y. MURASE aus Sachalin, J. SHIBUYA, S. TAKANO, H. KÔNO und K. TAMANUKI aus Hokkaido, K. DOI von den Kurilen, F. SCRIBA, U. NAWA, H. KÔNO, C. TERANISHI, K. TAKEUCHI, S. HIRAYAMA, K. FUKUDA, Y. MIWA, T. TAKAGI, M. NAKAMURA und M. YANAGIWARA aus Honshu, K. YASUMATSU und T. UYE aus Kiushu, S. ARAKAWA und K. FUJII aus Shikoku, S. SAKAGUCHI und S. HIRAYAMA von den Riukiu-Inseln, S. ISSHIKI, J. SONAN, S. TAKANO, S. HIRAYAMA, R. SAITÔ, M. KATÔ und K. KIKUCHI aus Formosa und T. KURISUE und K. SATÔ aus Korea für mich gesammelt und mir ihre Ausbeuten freundlichst zugeschickt, wofür ich den genannten Herren sehr dankbar bin.

Zum Schluss sage ich meinen verbindlichsten Dank Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA, der mir bei dieser Arbeit freundliche Förderung angedeihen ließ.

#### GESCHICHTE

Über die ersten systematischen Forschungen über die Ophioninen Japans wurde von F. Smith im Jahre 1874 in „Trans. Ent. Soc. Lond.“ berichtet, und zwar wurden in jener Arbeit die folgenden 7 neuen Arten, welche G. LEWIS in Honshu gesammelt hatte, veröffentlicht:

*Thyreodon purpurascens* SM.

*Anomalon flavifrons* SM. = *Agrypnon flavifrontatum* SM.

*Anomalon insidiator* SM. = *Acanthostoma insidiator* SM.

*Ophion unicolor* SM. = *Ophion smithi* DALLA TORRE

*Ophion pungens* SM. = *Henicospilus pungens* SM.

*Ophion flavopictus* SM. = *Ophion obscurus* F.

*Paniscus unicolor* SM.

Von diesen Arten wurde *Ophion flavopictus* SM. von C. MORLEY (Rev. Ichn. Vol. I, 1912) als ein Synonym von *O. obscurus* F. behandelt, und *Ophion unicolor* SM. von DALLA TORRE (Cat. Hym. Vol. III, pt. 1, 1901) zu *O. smithi* gemacht, denn der Name dieser Art war bereits im Jahre 1860 einer anderen Art gegeben worden. Ferner wurden die Gattungsnamen *Anomalon flavifrons* und *Ophion pungens* von C. MORLEY (Rev. Ichn. Vol. I, 1912 und Vol. II, 1913) und *Anomalon insidiator* von J. SONAN (Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, Vol. XV, 1924) wie oben verbessert.

In diesem Jahre hat F. WALKER in „Cist. Ent. pt. XI“ 3 neue

Arten, *Campoplex albimanus*, *Sagaritis ventralis* und *Charops* (?) *luteipes* beschrieben, aber diese sind mir unbekannt.

O. RADOZKOWSKI hat im Jahre 1887 in „Horae Soc. Ent. Ross. Vol. XXI“ *Ophion metallicum* erwähnt, die von KALINOWSKI in Korea gefunden wurde, aber diese Art scheint mir ein Synonym von *Thyreodon purpurascens* SM. zu sein.

Im Jahre 1894 hat J. KRIECHBAUMER in „Ber. Naturf. Ges. Leipzig“ eine neue Gattung (*Acanthostoma*) und eine neue Art (*A. japonicum*), welche von R. KRIEGER auf Honshu (in Yokohama) gesammelt wurde, diagnostiziert; diese Art wurde im Jahre 1874 von F. SMITH unter dem Namen *Anomalon insidiator* veröffentlicht, aber die KRIECHBAUMER'sche Gattung *Acanthostoma* ist richtig.

1904 hat N. KOKUJEW in „Rev. Russ. Ent.“ eine neue Untergattung *Exetastes* (*Allexetastes*) und 2 neue Arten (*A. coreanus* und *A. komarovi*) aus Korea erwähnt, aber diese sind mir unbekannt.

In „Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. XXX, 1906“ hat W. H. ASHMEAD eine neue Gattung *Nawaia* und die folgenden neuen Arten aus Honshu, die ihm von A. KOEBELE und Y. NAWA zugeschickt wurden, zum erstenmal beschrieben.

*Campoplex hakonensis* ASH.

*Campoplex bicoloripes* ASH.

*Nawaia japonica* ASH.

*Temelcha japonica* ASH. = *Diaparsis japonicus* ASH.

*Ateleute pallidipes* ASH.

Dieses Jahr wurden in „Entomologist, Vol. XXXIX“ 2 neue Arten *Anomalon japonicum* und *Campoplex japonicus* von P. CAMERON veröffentlicht, von denen die erstere von C. MORLEY in „Rev. Ichn. Vol. II, 1913“ als Synonym zu *Exochilum circumflexum* L. gestellt wurde, die andere aber habe ich noch nirgends erwähnt gefunden.

Im Jahre 1911 hat Prof. Dr. S. MATSUMURA in „Journ. Coll. Agr., Tohoku Imp. Univ., Vol. IV, pt. I“ eine neue Art (*Corynephanes sachalinensis*) aus Sachalin beschrieben, aber sie ist nichts anderes als ein Synonym von *Banchus falcatorius* F. Im nächsten Jahre 1912 hat er ferner in seiner klassischen Arbeit „Thous. Ins. Jap. Suppl. IV“ die folgenden 9 neuen und 4 schon bekannten Arten enumeriert:

*Astiploma apicalis* MATS. = *Opheltis glaucopterus* L. var. *apicalis* MATS.

*Ophion nigropictus* MATS. = *Dicamptus nigropictus* MATS.

- Ophion semiopacus* MATS. = *Henicospilus semiopacus* MATS.  
*Paniscus formosanus* MATS. = *Paniscus ocellaris* THOMS.  
*Habronyx sachalinensis* MATS. = *Schizoloma amictum* F.  
*Habronyx jozankeanus* MATS. = *Aphanistes jozankeanus* MATS.  
*Mesochorus japonicus* MATS. = *Campoplex matsumuræ* UCH.  
*Anomalon suzukii* MATS. = *Agyron suzukii* MATS.  
*Exetastes scutellaris* MATS. = *Exetastes ichneumoniformis* GRAV.  
*Thyreodon purpurascens* SM.  
*Habronyx japonicum* KRIECHB. = *Acanthostoma insidiator* SM.  
*Paniscus unicolor* SM. = *Paniscus ocellaris* THOMS.  
*Ophion pungens* SM. = *Ophion luteus* L.

Unter diesen Arten gehört *Mesochorus japonicus* zur Gattung *Campoplex*, da aber dieser Name (*Campoplex japonicus*) bereits im Jahre 1906 von P. CAMERON benutzt wurde, so ist es nötig ihr einen neuen Namen zu geben. Prof. S. MATSUMURA hat *Paniscus ocellaris* THOMS. und *Ophion luteus* L. irrtümlich als *Paniscus unicolor* SM. und *Ophion pungens* SM. determiniert. Noch später, im Jahre 1925, hat er in „Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ. Vol. XXXVI“ über die folgenden 4 neuen und 3 schon bekannten Arten, welche in der Larve von *Dendrolimus albolineatus* MATS. schmarotzen, geschrieben:

- Opheltes apicalis* MATS. = *Opheltes glaucopetrus* L. var. *apicalis*  
 MATS.  
*Exochilum dendrolimi* MATS. = *Exochilum circumflexum* L.  
 var. *dendrolimi* MATS.  
*Exochilum sachalinense* MATS. = *Schizoloma amictum* F.  
*Habronyx matsukemushi* MATS. = *Habronyx heros* WESM.  
 var. *matsukemushi* MATS.  
*Mesochorus kuwayamæ* MATS.

*Habronyx jozankeanus* MATS. = *Aphanistes jozankeanus* MATS.

Im nächsten Jahre wurden von ihm 7 bekannte Arten und eine neue Art (*Casinaria takagii* = *Rhythomonotus takagii*), die in den Larven der *Dendrolimus*-Arten in Sachalin, auf den Kurilen, in Hokkaido, Honshu und Korea schmarotzen können, beschrieben.

C. MORLEY hat im Jahre 1912 in „Rev. Ichn. Vol. 1“ 2 unbekannte Arten, nämlich *Henicospilus lineatus* CAM. aus Formosa und *Ophion obscurus* F. aus Honshu enumeriert. Im nächsten Jahre veröffentlichte er den 2. Band dieser Arbeit; darin hat er über eine neue Varietät *Paniscus gracilipes* THOMS. var. *formosus* aus Formosa und eine noch nicht bekannte Art *Exochilum circumflexum*

L. aus Honshu geschrieben; auch in diesem Jahre hat er in „Faun. Brit. Ind., Hym. Vol. III, pt. I“ 2 unbekannte Arten *Stauropodoctonus orientalis* MOEL. und *Heteropelma fulvitarse* CAM., welche von A. F. WILEMAN in Formosa gesammelt wurden, erwähnt.

Eine neue Art *Anomalon lineatum*, die Parasit von *Eucosma schistaccana* SNELL. ist, wurde von S. ISHIDA in „Taiwan-Sotoku Shokusanikioku Hokoku, 88, 1-2, 1914“ beschrieben, aber diese gehört zur Gattung *Diocetes* FÖRST.

In der „Stett. Ent. Zeit. 82, 1921“ hat G. ENDERLEIN eine neue Gattung (*Gongropelma*) und die folgenden neuen Arten aus Formosa, welche von H. SAUTER erbeutet wurden, bekannt gemacht:

*Gongropelma formosana* END.

*Agrypon gratiosum* END.

*Henicospilus Sauteri* END.

*H. tristrigatus* END.

*H. formosanus* END.

*H. emacescens* END.

*H. laqueatus* END.

Im Jahre 1922 hat R. A. CUSHMAN in „Phil. Journ. Scien. Vol. 20, No. 5“ eine neue Art (*Zacharops narangæ*), die dem Naturwissenschaftlichen Museum der Vereinigten Staaten von Nordamerika von Dr. T. SHIRAKI zugeschiedt wurde, erwähnt; sie ist Schmarotzer von *Naranga aenescens* MOOR. in Formosa; auch 1924 hat er in „Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. LVII“ eine neue Gattung (*Nephopheltes*) und 2 neue Arten (*Nephopheltes japonicus* und *Opheltes major*) veröffentlicht, aber die letztere (*Opheltes major*) ist eine Varietät von *Opheltes glaucopterus* L.

J. SONAN hat im Jahre 1925 in „Taiwan Nôji-Hô, 219“ eine unbekannte Art *Henicospilus striatus* CAM. und ihren Wirt beschrieben.

Prof. Dr. S. MATSUMURA und der Verfasser haben die Hymenopteren-Fauna von den Riukiu-Inseln in den „Ins. Matsumurana, Vol. I, No. 1-2“ veröffentlicht, mit einer Tafel dazu. In dieser Arbeit haben wir die folgenden 6 neuen, 3 unbekannten und 2 schon bekannten Arten behandelt:

*Henicospilus striatus* CAM.

*H. nigropictus* MATS. = *Dicamptus nigropictus* MATS.

*H. riukiuensis* MATS. et UCH.

*H. okinawensis* MATS. et UCH.

- H. flavicaput* MORL. = *H. merdarius* GRAV.  
*H. analis* MATS. et UCH.  
*H. similis* MATS. et UCH. = *H. flavocephalus* KBY.  
*H. sakaguchii* MATS. et UCH.  
*Agrypon nigrinotum* MATS. et UCH.  
*Paniscus orientalis* CAM.  
*Ophion luteus* L.

Unter diesen Arten ist *Henicospilus similis* Synonym von *H. flavocephalus* KBY.; wir haben *Henicospilus merdarius* GRAV. irrtümlich als *H. flavicaput* MORL. determiniert.

## UNTERFAMILIE OPHIONIAE

### Allgemeine Charakteristik

Kopf in der Regel quer, selten etwas aufgetrieben, noch seltener rundlich. Gesicht oft weisslich pubescent. Clypeus in den meisten Fällen nicht vom Gesicht getrennt, vorn abgerundet oder abgestutzt, selten in der Mitte nur wenig ausgerandet oder mit Zahn. Augen innen ausgerandet, nur bei wenigen Gattungen behaart. Antennen lang und dünn, höchst selten gegen das Ende hin verdickt. Schildchen oft schwach erhaben. Metathoracalfelder meist undeutlich, die Luftlöcher des Metathorax linear oder rundlich. Die Areola im Vorderflügel fehlt bei vielen der grösseren Arten; in den meisten Fällen ist sie klein, dreieckig und gestielt; in den einzelnen Fällen ist sie gross und rhombisch; noch seltener ist sie pentagonal wie bei der Gattung *Nawaia* ASH. Beine schlank und meist ohne besondere Auszeichnung; bei vielen *Anomalon*-Arten sind die Hintertarsen verdickt. Hinterleib mehr oder weniger komprimiert, gestielt, höchst selten sitzend. Die Länge des Bohrers ist verschieden; während derselbe bei den grösseren Arten kurz ist, ist er bei den kleineren nicht selten von Hinterleibslänge.

### Übersicht der Tribus

1. Stigma im Vorderflügel lang und mehr oder weniger schmal, zuweilen fast fehlend. Radialzelle gestreckt, an oder nahe der Flügelspitze endend ... 2.  
 — Stigma und Radialzelle kurz und breit; die beiden Abschnitte des Radius bilden einen steilen, oft rechten Winkel ..... 12.
2. Flügel mit unvollständiger Nervatur, es fehlt namentlich der 2te rücklaufende Nerv ..... PHARSALIINI.  
 — Flügel mit vollständiger Nervatur; der 2te rücklaufende Nerv vorhanden. . 3.
3. Hinterschenkel gegen das Ende unten mit Zahn ..... XIPHOSOMINI.

- Hinterschenkel gegen das Ende unten ohne Zahn.....4.
4. Der 2te rücklaufende Nerv mündet vor dem Cubitalquernerv, die erste Cubitalzelle nimmt die beiden rücklaufenden Nerven auf .....5.  
—Der 2te rücklaufende Nerv mündet hinter dem Cubitalquernerv, in seltenen Fällen ist derselbe interstitial .....7.
5. Fühler nach der Spitze hin deutlich verdickt, ziemlich kurz ..HELLWIGIINI.  
—Fühler nicht verdickt .....6.
6. Mittelschienen mit zwei Sporen. Thorax fast glatt. Fühler lang  
.....OPHIONINI.  
—Mittelschienen mit je nur einem Sporen. Thorax runzelig punktiert. Fühler meist kurz .....NOTOTRACHINI (partim).
7. Hintertarsen mehr oder weniger verdickt. Metathorax runzelig punktiert, über die Hinterhüften hinaus verlängert. Areola im Vorderflügel fehlt  
.....ANOMALONINI.  
—Die Hintertarsen nicht verdickt oder Thorax glatt .....8.
8. Mittelschienen mit je nur einem Sporen .....NOTOTRACHINI (partim).  
—Mittelschienen mit zwei Sporen .....9.
9. Areola sehr gross, meist rhombisch. Bohrer vorragend. Männchen am Hinterleibsende mit zwei langen griffelförmigen Anhängseln  
.....MESOCHORINI.  
—Areola nicht auffallend gross. Männchen ohne griffelförmige Anhängsel. .10.
10. Hinterleib sitzend, oft etwas gestielt. Nervellus ganz schräg nach aussen und weit über der Mitte gebrochen.....BANCHINI.  
—Hinterleib deutlich gestielt .....11.
11. Luftlöcher des ersten Segmentes hinter der Mitte. Luftlöcher des Metathorax meist rundlich. Färbung schwarz .....CAMPOPLEGINI.  
—Luftlöcher des ersten Segmentes vor oder selten in der Mitte. Luftlöcher des Metathorax meist länglich. Färbung gelbrot.....PANISCINI.
12. Die Hinterbeine weit länger und dicker als die vorderen. Die Hinterschenkel unten mit einem Zahn; wenn nicht, dann der Vorderflügel mit grosser rhombischer Areola.....PRISTOMERINI.  
—Die Hinterbeine nicht auffallend dicker und länger als die vorderen. Die Hinterschenkel unten ohne Zahn. Areola im Vorderflügel niemals gross und rhombisch.....13.
13. Cubitalnerv im Hinterflügel gegen die Basis erloschen oder ganz fehlend. Die beiden Abschnitte des Radius bilden einen rechten Winkel  
.....PORIZONINI.  
—Cubitalnerv im Hinterflügel bis zur Basis deutlich. Die beiden Abschnitte des Radius bilden keinen rechten Winkel .....14.
14. Kopf nicht besonders klein; Clypeus weder konvex noch seitlich zusammengedrückt. Flügel ohne Areola.....CREMASTINI.  
—Kopf in der Regel klein; Clypeus konvex und gewöhnlich von der Seite zusammengedrückt.....PLECTISCINI.

### TRIBUS PANISCINI

#### Übersicht der Gattungen

1. Kopf gross, nach hinten aufgetrieben, mit breiten Wangen. Schildchen an den Seiten nicht gerandet.....2.

- Kopf nach hinten nicht oder kaum aufgetrieben, mit schmalen Wangen. Schildchen wenigstens an der Basis seitlich gerandet .....3.
2. Luftlöcher des Metathorax länglich oval. Innere Orbitae an jeder Seite der Stirn stark gerandet ..... *Nephopheltes* CUSHMAN  
—Luftlöcher des Metathorax breit oval. Innere Orbitae schwach gerandet. .... *Opheltes* HOLMGREN
3. Hinterhaupt durch eine Leiste abgegrenzt. Nervulus weit hinter der Gabel ..... *Paniscus* SCHRANK  
—Hinterhaupt nicht durch eine Leiste abgegrenzt .....4.
4. Nervulus fast interstitial. Schläfen breit und ziemlich hoch aufgetrieben ..... *Parabatus* THOMSON  
—Nervulus weit hinter der Gabel. Schläfen sehr schmal und gar nicht aufgetrieben ..... *Amebachia* gen. n. ov

### Gattung *Opheltes* HOLMGREN

*Opheltes* HOLMGREN, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh., XV, p. 323 (1858).

*Netelia* GRAY, Ann. Mag. Nat. Hist., V, p. 341 (1860).

#### 1. *Opheltes glaucopterus* LINNÉ

*Ichneumon glaucopterus* LINNÉ, Syst. Nat. Ed., 10, p. 566 (1758).

*Ophion glaucopterus* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 236 (1798).

*Paniscus glaucopterus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 633, ♀♂ (1829); RATZBURG, Ichn. d. Först., p. 100 (1844).

*Opheltes glaucopterus* HOLMGREN, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Handl., p. 30 (1858); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 82 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1844, ♀♂ (1910); WHITMARSH, Ann. Ent. Soc. Am., III, p. 197, ♀♂ (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 76 (1911); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 285, ♀♂ (1913); id., Rev. Ichn., II, p. 134 (1913); CUSHMAN, Proc. U.S. Nat. Mus., Vol. 64, p. 14 (1924).

Fundorte: Sachalin (Motodomari, Korea (Shakôji)); 2 ♂ Exemplare wurden von S. ISSHIKI, J. ADACHI und dem Verfasser gefunden.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Bekko-amebachi*.

#### 1a. *Opheltes glaucopterus* LINNÉ

##### var. *apicalis* MATSUMURA

*Astiphromma apicalis* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 112, Pl. XLVII, Fig. 14, ♀ (1912).

*Opheltes apicalis* MATSUMURA, Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., p. 36, ♀ (1925); id., Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 25, Pl. IV, Fig. 1, ♀ (1926).

Fundorte: Sachalin (Kiminai, Konuma, Kawakami), Hokkaido (Sapporo, Jōzan-kei, Kuccharo), Kurilen, Honshu (Akita, Nikko), Tsushima, Kiushu (Fuknoka), Korea (Shakôji); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, F. SCRIBA, K. DOI, S. HARADA, S. HIRAYAMA, K. TAMANUKI und dem Autor. Diese Varietät hat grosse Ähnlichkeit mit var. *flavipennis* PROVANCHER aus Nord-Amerika, und sie ist viel häufiger in Japan als die typische Art und lebt in der Larve von *Dendrolimus alboliniatus* MATS. und *Cimbex femorata* L. var. *japonica* KBV.

1b. *Opheltes glaucopterus* LINNÉ var. *fuscus* var. nov.

Der Färbung nach der vorhergehenden Varietät etwas ähnlich, sie weicht aber wie folgt ab:

1. Fühler des Männchens grösstenteils schwärzlich, unten gegen die Basis braun.

2. Hinterkopf und das erste Hinterleibssegment ausgenommen der Hinterrand schwarz; das 2te und 3te auf der Rückenseite mit 2 schwarzen Flecken, in seltenen Fällen diese Segmente ganz schwarz. Länge: ♀♂ 24-27 mm.

Fundorte: Kurilen, Hokkaido (Sapporo, Otaru, Jôzankei), Honshu (Kioto); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von M. SUZUKI, K. DOI, S. HARADA und dem Autor.

1c. *Opheltes glaucopterus* LINNÉ var. *major* CUSHMAN

*Opheltes major* CUSHMAN, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 64, p. 16, ♀♂ (1924).

Fundort: Honshu (Gifu); nur ein ♀ Exemplar wurde von M. YANAGIWARA gesammelt.

**Gattung *Nephopheltes* CUSHMAN**

*Nephopheltes* CUSHMAN, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 64, p. 16 (1924).

2. *Nephopheltes japonicus* CUSHMAN (Taf. VI, Fig. 26, ♀)

*Nephopheltes japonicus* CUSHMAN, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 64, p. 17, Fig. 6, ♀ (1924).

Fundort: Honshu (Gifu); nur ein ♀ Exemplar wurde von U. NAWA gesammelt. T. N.: *Heritori-bekko-amebachi*.

**Gattung *Paniscus* SCHRANK**

*Paniscus* SCHRANK, Faun. Boica, 11, p. 316 (1802).

*Paropheltes* CAMERON, Journ. Bom. Nat. Hist., p. 111 (1907).

**Übersicht der Arten**

1. Kopf nach hinten mehr oder weniger aufgetrieben .....2.  
—Kopf nach hinten mehr oder weniger verschmälert .....5.
2. Thorax ganz schwarz und matt. Schildchen fast bis zur Mitte seitlich gerandet.....nigrus sp. nov.  
—Thorax nicht ganz schwarz.....3.
3. Thorax kräftig und kurz; Mesonotum vorn abgerundet, zum Teil verdunkelt .....*takaozamus* sp. nov.  
—Thorax nicht auffallend kräftig und kurz; Mesonotum vorn ziemlich vorgestreckt, nicht verdunkelt .....4.

4. Kopf hinten ziemlich stark aufgetrieben. Metathorax deutlich quengerunzelt .....*cephalotes* HOLMGREN  
—Kopf hinten schwach aufgetrieben. Metathorax fein quengerunzelt .....*unicolor* SMITH
5. Stemmaticum schwarz.....6.  
—Stemmaticum nicht schwarz .....10.
6. Parapsidenfurchen nur vorn deutlich.....*orientalis* CAMERON  
—Parapsidenfurchen wenigstens bis zur Mitte des Mesonotums reichend.7.
7. Kopf, Thorax und Hinterleib grösstenteils schwarz .....*grumi* KOKUJEW  
—Kopf, Thorax und Hinterleib grösstenteils gelbrot.....8.
8. Stigma schwarz getrübt.....*nigriventris* BRULLÉ  
—Stigma nicht schwarz getrübt.....9.
9. Hinterleibsende mehr oder weniger schwarz. Mesonotum ganz matt .....*testaceus* GRAVENHORST  
—Hinterleibsende nicht schwarz. Mesonotum ziemlich glänzend .....*ocellaris* THOMSON
10. Metathorax hinten an den Seiten ohne Querleisten ...*glacitipes* THOMSON  
—Metathorax hinten an den Seiten mit deutlichen Querleisten .....11.
11. Kopf hinten kaum verschmälert; das 2te Geisselglied nicht oder kaum länger als der Schaft .....*capito* KOKUJEW  
—Kopf hinten verschmälert; das 2te Geisselglied weit länger als der Schaft .....*opaculus* THOMSON

### 3. *Paniscus cephalotes* HOLMGREN

*Paniscus cephalotes* HOLMGREN, Svensk. Vet.-Akad. Handl., 11, p. 31, ♀♂ (1858); POULTON, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 588 (1888); KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 133 (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., 111, p. 77 (1901); SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hung., 111, p. 539 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ich., p. 1871 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); HABERMEHL,\* Konowia, 1, p. 267, ♀♂ (1922).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Teshio, Józankei), Honshu (Tochigi, Saitama, Tôkiô, Gifu); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von F. SCRIBA, C. TERANISHI, H. TAKABAYASHI, M. YANAGIWARA, M. TANAKA, K. TAMANUKI und dem Autor. Als Wirte werden angeführt: *Amorpha amurensis* STGR., *Smerinthus ocellatus* L., *Herse convolvuli* L., *Dasychira pudibunda* L., *Acronycta psi* L., *A. tridens* SCHIFF., *Cucullia asteris* SCHIFF., *Siderides (Leucanis) unipuncta* HAW. und *Cucullia fraterna* BUTL.

Sonstige Fundorte: Europa, Indien, Nord-China und Assam.

T. N.: Ô-zu-amebachi.

### 4. *Paniscus nigrus* sp. nov. (Taf. VI, Fig. 19, ♀)

♀. Kopf nach hinten nicht verschmälert, glatt und matt; Ocellen nicht an die Augen stossend, sondern weit entfernt; Gesicht kaum fein punktiert, in der Mitte etwas gewölbt; Clypeus am Vorderrande abgerundet. Fühler schlank, fast von der Körperlänge, gegen das Ende leicht verdünnt, das 2te Geisselglied um die Hälfte länger als der Schaft. Thorax ganz matt und fast glatt; Parapsidenfurchen kurz, nicht tief; Metanotum mit einzelnen feinen Quer-

runzeln, hinten mit schwachen Querleisten; Schildchen kaum bis über die Mitte hinaus gerandet. Flügel hyalin; Nervulus senkrecht, nicht weit hinter der Gabel. Beine mässig schlank. Hinterleib kaum glänzend, glatt; das erste Segment auf der Oberseite mit schwacher Längsfurche. Bohrer ziemlich vorragend.

Schwarz und matt. Kopf grösstenteils gelbrot; Stemmaticum und Occiput schwarz. Thorax fast schwarz; Schildchen, Postschildchen, Tegulen und die Suturen zwischen dem Pro- und Mesothorax rot. Beine ganz rot, nur die Hintertarsen rötlichgelb. Antennen rot, an den Spitzen etwas verdunkelt. Stigma und Nerven gelb. Hinterleib rot, gegen das Ende verdunkelt. Länge: ♀ 11 mm.

Fundort: Hokkaido (Jōzankei); nur ein ♀ Exemplar wurde von Prof. Dr. S. MATSUMURA gesammelt.

T. N.: *Ô-zu-munaguro-amebachi*.

Diese Art ist dem *P. caucasicus* KOK. sehr ähnlich, aber sie weicht durch den nach hinten nicht verschmälerten Kopf, die kurzen, schwachen Parapsidenfurchen und die nicht an die Augen stossenden Ocellen ab.

##### 5. *Paniscus takaozanus* sp. nov. (Taf. VI, Fig. 17, ♂)

Diese Art ist dem *P. cephalotes* HOLMGR. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch die folgenden Merkmale:

- ♂. 1. Kopf nach hinten kaum aufgetrieben.
2. Fühler zum grössten Teil bräunlich verdunkelt, aber an der Basis nicht verdunkelt.
3. Thorax breiter als der Kopf; Mesonotum vorn abgerundet und stark niedergedrückt.
4. Parapsidenfurchen etwas kräftiger.
5. Mesonotum und Hinterleib deutlich dunkler.

Fundort: Honshu (der Berg Takao); zwei ♂ Exemplare wurden von C. TERANISHI gefunden; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Takao-ô-zu-amebachi*.

##### 6. *Paniscus unicolor* SMITH

*Paniscus unicolor* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 396, ♂ (1874); DALLA TORRE, Cat. Hym., 111, p. 81 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 75 (1911); MORLEY, Rev. Ichm., 11, p. 120 (1913).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Garugawa, Otaru); Honshu (Tōkio, Akita, Saitama, Gifu, Kioto, Kōbe, Yamaguchi); Kiushu (der Berg Wakasugi); Formosa (Tarowan); Korea (Kongōsan); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren

VON Prof. Dr. S. MATSUMURA, E. GALLOIS, H. TAKABAYASHI, S. HIRAYAMA, H. HARUKAWA, T. KURISUE, K. YASUMATSU und dem Verfasser.

Sonstige Fundorte: Nord- und Süd-China, Singapore, Penang, Borneo.

T. N.: *Amebachi*.

### 7. *Paniscus grumi* KOKUJEW

*Paniscus grumi* KOKUJEW, Rev. Russ. Ent., p. 165, ♀ (1906); SCHMIEDEKNECHT, Oupsc., Ichn., p. 1860, ♀ (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); MORLEY, Rev. Ichn., 11, p. 120 (1913).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, der Berg Daisetsu, Garugawa), Kurilen, Honshu (Fukushima, der Berg Takao, Nikko, Gifu, Gumma, Nagano); gesammelt in zahlreichen ♀ Exemplaren von F. SCRIBA, E. GALLOIS, H. KÔNO, C. TERANISHI, K. DOI, S. HIRAYAMA, M. YANAGIWARA und dem Autor.

Sonstige Fundorte: China, Transcaspien und Afghanistan.

T. N.: *Usuguro-amebachi*.

### 8. *Paniscus nigriventris* BRULLÉ

*Paniscus nigriventris* BRULLÉ, Hist. Nat. Ins. Hym., IV, p. 157, ♀ (1846); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 121 (1913); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 349, ♀ (1913).

Fundort: Formosa (Horisha); nur ein ♂ Exemplar gesammelt am 15. Juni 1926 von R. SAITÔ und K. KIKUCHI.

Sonstige Fundorte: Ceylon, Borneo, Java und Sumatra.

N. T.: *Taiwan-usuguro-amebachi*.

### 9. *Paniscus testaceus* GRAVENHORST

*Paniscus testaceus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 626, ♀ (1829); RATZBURG, Ichn. d. Forst., II, p. 80 (1848); HOLMGREN, Svensk. Vet.-Akad. Handl., II, p. 32, ♀ (1858); TOSQUINET, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIII, p. 4 (1839); KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 134 (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym. III, p. 80 (1901); SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hung., p. 539 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Oupsc. Ichn., p. 1874 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 119 (1913); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 352, ♀ (1913).

*Ophion testaceus* LUCAS, Exep. Alg. Zool., III, p. 326 (1846).

*Paniscus melanurus* THOMSON, Oupsc. Ent., XII, p. 1199, ♀ (1888).

*Paniscus longitarsis* CAMERON, Manch. Mem., p. 108, ♀ (1907).

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa, Konuma), Hokkaido (Sapporo, Teshio, Nopporo, Jôzankei), Kurilen, Honshu (Nikko, Gifu, Miye), Shikoku (Iyo), Korea (der Berg Kongô, Sharien): zahlreiche ♀ Exemplare wurden von T. KURISUE, K. FUJII, K. DOI, M. YEGUCHI, M. TANAKA, T. ITÔ, K. TAMANUKI und dem Verfasser gesammelt. Schmarotzer von *Dendrolimus spectabilis* BUTL., *Amorpha amurensis* STGR., *Acronycta psi* L., *Cucullia asteris* SCHIFF. und *Cimbex femorata* L.

Sonstige Fundorte: Europa, Sibirien und Indien.

T. N.: *Aka-amebachi*.

9a. *Paniscus testaceus* GRAVENHORST  
var. *nigronotatus* var. nov.

Der Form und Färbung nach der typischen Art ähnlich, sie unterscheidet sich jedoch wie folgt:

♀, ♂. 1. Mesonotum ganz oder grösstenteils, Metanotum an der Basalhälfte und das Schildchen zum Teil schwarz.

2. Postpetiolus ausgenommen die Basis schwarz; das 2te und 3te Segment des Hinterleibs auf dem Rücken schwärzlich verdunkelt.

Länge: ♀♂ 15–20 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo), Honshu (Sanjôgatake in der Prov. Shinano, Tôkio, Gifu, Shimauchi), Kiushu (der Berzge Waka-sugi); gesammelt in 5 (3 ♀, 2 ♂) Exemplaren von S. ISSHIKI, H. Kôno, K. YASUKAWA und S. HIRAYAMA.

9b. *Paniscus testaceus* GRAVENHORST  
var. *nigrinotus* var. nov.

♀, ♂. Der Färbung nach der vorhergehenden Varietät etwas ähnlich, aber das 2te und 3te Hinterleibssegment und am Hinterleibsende nicht schwarz.

Länge: ♀♂ 17–22 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Garugawa, der Berg Daisetsu), Honshu (Hachijô-Insel), Shikoku (Iyo), Kiushu (Fukuoka); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von S. ARAKAWA, K. FUJII, K. YASUKAWA und dem Verfasser.

10. *Paniscus ocellaris* THOMSON

*Paniscus ocellaris* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1199, ♀♂ (1888); BRAUNS, Arch. Nat. Meck., XLIII, p. 48 (1889); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 79 (1901); SCHMIDKEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1875 (1910); MORLEY, Ind. Faun. Hym., III, p. 350, ♀♂ (1913); HABERMEHL, Konowia, I, p. 267 (1922).

*Paniscus testaceus* GRAVENHORST var. *ocellaris* KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 135 (1899).

*Paniscus ferrugineus* CAMERON, Manch. Mem., p. 107, ♀ (1899).

*Paniscus testaceus* SZÉPLIGETI (nec GRAVENHORST), Gen. Ins., 114, p. 74 (1911).

*Paniscus fromosanus* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 115, Pl. XLVIII, Fig. 4, ♂ (non ♀) (1912).

*Paniscus unicolor* MATSUMURA (nec SMITH), Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 116, Pl. XLVIII, Fig. 5, ♀ (1912).

Fundorte: Diese Art ist über ganz Japan, Okinawa, Formosa und Korea verbreitet, und die Wirte wie folgt: *Dendrolimus spectabilis* BUTL., *Acronycta psi* L., *A. major* BREM., *Cucullia perforata* BREM., *Barathra brassicae* L., *Plusia agnata* STGR.

und *Siderides (Leucania) unipuncta* HAW. Dazu kommt als Wirt noch eine *Cimex*-Art.

Sonstige Fundorte: Indien und Europa.

T. N.: *Yotô-yadori-amebachi*.

### 11. *Paniscus gracilipes* THOMSON

*Paniscus gracilipes* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1201, ♀♂ (1888); BRAUNS, Arch. Naturg. Meck., XLII, p. 84 (1889); KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 131 (1899); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1869 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 196, ♀♂ (1913).

Fundort: Honshu (Nikko); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von S. HIRAYAMA; das Männchen noch nicht aufgefunden.

Sonstige Fundorte: Europa und Sibirien.

T. N.: *Usu-kiashi-amebachi*.

#### 11a. *Paniscus gracilipes* THOMSON var. *formosus* MORLEY

*Paniscus gracilipes* THOMSON var. *formosus* MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 122, ♂ (1913).

Fundort: Formosa (Baibara); gesammelt in nur einem ♂ Exemplare von K. KIKUCHI und R. SAITÔ.

### 12. *Paniscus capito* KOKUJEW

*Paniscus capito* KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., p. 132, ♀ (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 77 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1869 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); MORLEY, Rev. Ichn., 11, p. 123 (1913).

Fundort: Honshu (Nagano); gesammelt in nur einem ♂ Exemplare von H. KÔNO.

Sonstige Fundorte: Europa und Sibirien.

T. N.: *Nagano-amebachi*.

### 13. *Paniscus opaculus* THOMSON

*Paniscus opaculus* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1199, ♀♂ (1888); KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 132 (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., 111, p. 80 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1870 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); HABERMEHL, Konowia, 1, p. 266, ♀♂ (1922).

*Paniscus testaceus* MORLEY (nec GRAVENHORST), Brit. Ichn., V, p. 294, ♀♂ (1913).

*Paniscus testaceus* GRAVENHORST var. *opaculus* MORLEY, Rev. Ichn., 11, p. 122 (1913).

Fundort: Honshu (Gifu); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren von M. YANAGIWARA.

Sonstige Fundorte: Assam, Indien und Europa.

T. N.: *Usu-ki-amebachi*.

### 14. *Paniscus orientalis* CAMERON

*Paniscus orientalis* CAMERON, Spolia Zeylanica, p. 126, ♀ (1905); MORLEY, Ind. Faun. Hym., 111, p. 355, ♀ (1913); id., Rev. Ichn., 11, p. 122 (1913); MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, 1, p. 74, ♀♂ (1926).

Fundorte: Ogasawara, Okinawa; gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von H. KUROIWA, S. SAKAGUCHI, H. HARUKAWA und S. HIRAYAMA.  
 Sonstiger Fundort: Indien.  
 T. N.: *Okinawa-aka-amebachi*.

**Gattung *Parabatus* THOMSON**

*Parabatus* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1194 (1888).  
*Apatagium* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., p. 115 (1912).  
*Paniscus (Parabatus)* BRADLEY, Ann. Mag. Nat. Hist., III, p. 324 (1919).

**Übersicht der Arten**

1. Mesonotum und Hinterleib stets grösstenteils verdunkelt. Thorax und Kopf mit blassgelber Zeichnung .....2.  
 —Mesonotum und Hinterleib nicht verdunkelt. Thorax und Kopf ohne helle Zeichnung .....5.
2. Beim ♀ die Hinterschenkel auffallend verdickt...*maculifemoratus* sp. nov.  
 —Beim ♀ die Hinterschenkel nicht verdickt .....3.
3. Schildchen nicht gerandet, Metathorax in der Mitte mehr oder weniger eingedrückt .....*virgatus* FOURCROY  
 —Schildchen fast bis zur Mitte seitlich gerandet. Metathorax in der Mitte nicht eingedrückt.....4.
4. Hinterleib schlank. Kopf nach hinten nicht aufgetrieben..*baibarensis* sp. nov.  
 —Hinterleib kräftig. Kopf nach hinten aufgetrieben.....*cristatus* THOMSON var. *japonicus* var. nov.
5. Schildchen an den Seiten nicht gerandet .....6.  
 —Schildchen an den Seiten gerandet .....7.
6. Grosse Art. Beine kräftig .....*kiuhabonus* sp. nov.  
 —Kleine Art. Beine schlank. Bohrer lang vorragend..*tarsatus* BRISCHKE
7. Schildchen bis zum Ende gerandet .....*cristatus* THOMSON  
 —Schildchen fast bis zur Mitte gerandet. Metathorax rundlich und ganz glatt .....*latungula* THOMSON

15. *Parabatus maculifemoratus* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 9, ♀)

♀. Kopf nach hinten verschmälert, glatt und matt; Gesicht kaum punktiert; Clypeus am Vorderrande breit abgerundet; Mandibeln ziemlich kräftig. Antennen etwas kürzer als der Körper, ziemlich dick. Thorax matt, kaum punktiert; Parapsidenfurchen deutlich tief; Schildchen nicht gerandet; Metathorax rundlich, sehr fein querverunzelt. Flügel hyalin; Stigma ziemlich breit, gelbrot; Nerven schwärzlich; Areola dreieckig, lang gestielt; Ramellus kurz; Nervellus weit über der Mitte gebrochen. Beine auffallend dick, kurz, besonders die hintersten. Hinterleib glatt, etwas glänzend.

Grundfarbe bräunlichgelb. Kopf gelb; Mandibeln an den Spit-

zen schwarz. Antennen gelbrot. Mesonotum mit 3 schwarzen Längsflecken, wovon der mittlere nach hinten verkürzt ist. Beine gelbrot. Hinterleib dunkelbraun. Länge: ♀ 12 mm.

Fundort: Formosa (Baibara); gesammelt am 5. Juni 1926 von R. SAITÔ und K. KIKUCHI; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Momobuto-amebachi*.

Diese Art ähnelt etwas *P. baibarensis* UCH., weicht aber durch die dickeren und kürzeren Beine ab.

#### 16. *Parabatus baibarensis* sp. nov.

♀, ♂. Körper ziemlich schlank. Kopf hinten verschmälert; Ocellen gross, an die Augen stossend; Augen innen deutlich ausgerandet; Gesicht und Clypeus matt, spärlich fein punktiert, der letztere am Vorderrande fast abgestutzt, aber beiderseits ein wenig abgerundet; Mandibeln und Palpen normal. Fühler fast von Körperlänge, schlank, das 2te Geisselglied etwas länger als der Schaft. Schildchen an den Seiten bis zum Ende gerandet, lederartig, kaum glänzend; Metathorax hinten an den Seiten mit je einer schwachen Querleiste; Metanotum sehr fein querrissig; Luftlöcher des Metathorax ovalförmig. Hinterleib ziemlich schlank und lang, von der Seite stark zusammengedrückt; Genitalklappen lang; Bohrer vorstehend. Flügel ganz hyalin; Stigma blassgelb; Nerven dunkelbraun; Areola dreieckig, kurz gestielt. Beine schlank, besonders die hintersten; Klauen dicht gekämmt.

Färbung schalgelb oder weisslichgelb. Kopf und Thorax kaum glänzend; Gesicht, Clypeus und Schläfen rein gelb; Mandibeln gelbrot, an den Spitzen schwarz. Antennen fast rot, gegen die Spitzen hin etwas verdunkelt. Mesonotum mit drei dunklen Längsstreifen, von denen der mittlere nach hinten abgekürzt ist; beim Männchen das Mesonotum zuweilen durchaus verdunkelt. Hinterleib einfarbig verdunkelt. Beine hell gelblichrot; Hüften und Trochantern weisslichgelb, aber die Hinterhüften auf den Oberseiten verdunkelt, deren Tarsen weisslichgelb. Länge: ♀♂ 12-15 mm.

Fundort: Formosa (Baibara, Kiuhabon, Tamaho, Tonpo); 11 (2 ♀, 9 ♂) Exemplare wurden von K. KIKUCHI und dem Verfasser erbeutet.

T. N.: *Baibara-heri-maebachi*.

17. *Parabatus virgatus* FOURCROY

*Ichneumon virgatus* FOURCROY, Ent. Paries, II, p. 40 (1785).

*Paniscus virgatus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 625, ♀♂ (1829); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 75 (1911); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 29, ♀♂ (1913).

*Parabatus virgatus* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1197 (1888); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1853 (1910); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 129 (1913); HABERMEHL, Konowia, I, p. 266 (1922).

*Parabates virgatus* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 76 (1901).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, der Berg Daisetsu), Honshu (Nikko, Niigata), Korea (Shakôji, Choanji); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von E. GALLOIS, T. KURISUE, M. NAKAMURA und dem Verfasser. Schmarotzer von *Cosmia trapezina saturata* STGR.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N. *Seguro-amebachi*.

18. *Parabatus kiuhabonus* sp. nov.

♀, ♂. Kopf hinten etwas verschmälert, glatt; Gesicht punktiert, in der Mitte ziemlich stark konvex; Clypeus glatt, vorn abgerundet; Mandibeln kräftig; Palpen schlank. Antennen fadenförmig, dick, von Körperlänge, das 2te Geisselglied so lang wie der Schaft, das erste viel länger als das folgende.

Thorax robust, dicht, fein punktiert; Mesonotum matt; Parapsidenfurchen nur vorn deutlich tief; Schildchen an den Seiten nur an der Basis gerandet; Metathorax kurz, hinten gerundet, an den Seiten mit Querleisten; Metanotum dicht fein quengerunzelt; Luftlöcher breit oval. Beine mässig kräftig, besonders die hintersten. Flügel gelb getrübt, breit und lang; Stigma gelbrot, gross; Areola dreiseitig, kurz gestielt. Hinterleib lederartig, gelblich dünn pubescent; Bohrer versteckt; Genitalklappen gross.

Hell gelbrot. Kopf, Gesicht und Clypeus ganz rein gelb; Mesonotum zum grössten Teil gelblich; Schildchen beim Weibchen verdunkelt. Antennen und Hinterleib ganz gelblichrot. Beine wie die Grundfarbe, die Hintertarsen weisslichgelb. Länge: ♀♂ 13–16 mm.

Fundort: Formosa (Arisan, Baibara, Kiuhabon, Naihonpo); 6 (1 ♀, 5 ♂) Exemplare gesammelt von Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. KIKUCHI und dem Autor.

T. N. : *Kiuhabon-amebachi*.

19. *Parabatus tarsatus* BRISCHKE

*Paniscus tarsatus* BRISCHKE, Schift. Nat. Ges. Danz. N. F., IV, p. 138, ♀♂ (1880); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 290 (1913).

*Parabatus tarsatus* BRIDGMAN, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 420, ♀♂ (1889);

SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1851 (1910).

*Paniscus (Parabatus) tarsatus* KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 130 (1899).

*Parabates tarsatus* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 76 (1901).

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa, Shimizu), Kurilen, Honshu (Nikko, Miye), Shikoku (Iyo), Korea (der Berg Kongó); gesammelt in 7 (3 ♀, 4 ♂) Exemplaren von E. GALLOIS, S. ARAKAWA, K. DOI, Y. MIWA, T. KURISUE und dem Autor. Schmarotzer von *Tephroclystia castigata* HB. und *T. virgaureata* DBLD.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Onaga-hime-amebachi*.

## 20. *Parabatus cristatus* THOMSON

*Parabatus cristatus* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1197, ♀♂ (1888); BRAUNS, Arch. Nat. Meck., XLVIII, p. 81 (1889); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1854 (1910); HABERMEHL, Konowia, I, p. 266, ♀♂ (1922).

*Parabates cristatus* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, 75 (1901).

*Paniscus cristatus* KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 136 (1899); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 293, ♀♂ (1913).

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa, Shimizu), Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Otaru, Rebun-Insel), Honshu (der Berg Daisen in der Präf. Tottori, Nikko, Aomori, Shizuoka), Korea (Onseiri); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. DOI, F. SCRIBA, T. KURISUE, S. ARAKAWA, H. KŌNO und dem Verfasser.

Sonstige Fundorte: Nord- und Mittel-Europa.

T. N.: *Suji-amebachi*.

Diese Art ist ziemlich häufig in Hokkaido und Honshu, und die Länge schwankt zwischen 12-23 mm.

### 20a. *Parabatus cristatus* THOMSON var. *japonicus* var. nov. (Taf. V, Fig. 1, ♀)

♀, ♂. Körper und Hinterleib viel kräftiger als die typische Art. Kopf und Thorax mit Ausnahme des Mesonotums blassgelb; Mesonotum besitzt drei rötlichbraune Längsflecken, von denen der mittlere nach hinten verkürzt ist; Schildchen und Metathorax grösstenteils rötlichbraun. Mandibeln an den Spitzen schwarz. Fühler rot, gegen das Ende hin verdunkelt. Beine hell gelbrot; Hüften und Trochantern blassgelb, nur die Hintertarsen weisslichgelb. Hinterleib vorwiegend dunkel gelbbraun, aber unten etwas heller; Petiolus an der Basis gelblich.

Kopf hinten nicht verengt; Ocellen gross, an die Augen stossend; Augen bis zur Mandibelbasis reichend; Gesicht matt, kaum punktiert, in der Mitte erhaben; der Vorderrand des Clypeus fast abgestutzt oder leicht ausgerandet; Mandibeln ziemlich dick. Fühler fast so lang wie der Körper, das 2te Geisselglied von der Schaftlänge, das erste

länger als das folgende. Thorax matt, lederartig; Schildchen fein punktiert, bis zum Ende seitlich scharf gerandet, etwas poliert. Metanotum in der Regel dicht fein querrissig, hinten mit kräftigen, gebogenen Querleisten an den Seiten; Luftlöcher länglichoval. Hinterleib robust, das erste und 2te Segment kräftig, nicht komprimiert; Genitalklappen gross und lang; Bohrer ziemlich weit vorragend, so lang wie das 2te Segment. Flügel gelblich hyalin; Stigma gelbbraun; Nerven braun; Areola fast dreieckig, kaum gestielt. Beine ziemlich dick und lang. Länge: ♀♂ 19-23 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Teshio, Garugawa, Otaru, Aoyama, Hakodate, Kamuikotan); Kurilen, Honshu (Aomori, Akita, Nikko); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. S. MATSUMURA, E. GALLOIS, S. HIRAYAMA, K. DOI und dem Autor.

Diese Varietät ist viel häufiger als die typische Art in Hokkaido.

20b. *Parabatus cristatus* THOMSON var. *kikuchii*  
var. nov. (Taf. V, Fig. 6, ♂)

♂. Der Form nach der Stammform sehr ähnlich, sie weicht aber in folgendem ab:

1. Parapsidenfurchen deutlich tief.
2. Metathorax hinten an den Seiten mit schwachen Querleisten.
3. Schildchen beiderseits scharf gerandet.
4. Gesicht, Clypeus und Kopf ganz rein gelb.
5. Gesicht und Mesonotum stark glänzend.

Länge: ♂ 15-17 mm.

Fundort: Formosa (Baibara, Kiuhabon); gesammelt in zahlreichen ♂ Exemplaren von K. KIKUCHI und R. SAITÔ.

21. *Parabatus latungula* THOMSON

*Parabatus latungula* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1196, ♀♂ (1888); SCHMEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1853 (1910); HABERMEHL, Konowia, I, p. 266, ♀♂ (1922).

*Paniscus (Parabatus) latungula* KOKUJEW, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 136 (1899).

*Parabates latungula* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 76 (1901).

*Paniscus latungula* SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 74 (1911).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Jōzankei), Honshu (Niigata); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, M. NAKAMURA und dem Verfasser.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Onashi-hime-amebachi*.

**Gattung *Amebachia* gen. nov.**

Kopf hinten ohne scharfe, den Hinterkopf abgrenzende Leiste, sondern hinten schwach abgerundet wie bei *Parabatus* THOMS.; Schläfen sehr schmal, nicht aufgetrieben. Augen deutlich gross, innen an der Basis des Fühlers stark ausgebuchtet; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Gesicht rundlich gewölbt; Clypeus am Vorderrande abgerundet; Mandibeln schlank, der obere Endzahn länger als der untere; die beiden Palpen lang. Fühler borstenförmig, fast so lang wie der Körper. Thorax schwach, ziemlich gedrunken; Mesonotum mit schwachen Parapsidenfurchen. Schildchen flach, an den Seiten schwach gerandet. Metathorax ziemlich lang, mit ovalen Luftlöchern, hinten ohne Querleiste. Flügel hyalin; Stigma normal; Areola vorhanden; Nervulus weit hinter der Gabel wie bei *Paniscus* SCHRANK. Beine schlank und lang. Klauen kurz gekämmt. Hinterleib stärker zusammengedrückt als bei *Parabatus* THOMS.; das erste Segment lang, dasselbe mit Luftlöchern vor der Mitte stehend. Bohrer vorragend. Männchen mit grossen Analklappen.

Genotype: *Amebachia baibarana* UCHIDA.

Diese Gattung hat viele Aehnlichkeit mit *Parabatus* THOMS., aber sie unterscheidet sich durch die folgenden Charaktere:

1. Kopf nach hinten und Schläfen gar nicht aufgetrieben; die letzteren viel schmaler als die Augen.
2. Thorax mässig schlank und gedrunken, besonders der Metathorax lang gestreckt.
3. Hinterleib deutlich stärker zusammengedrückt.
4. Das erste Hinterleibssegment lang und schlank.
5. Nervulus weit hinter der Gabel wie bei *Paniscus* SCHRANK.

**Übersicht der Arten**

- Mesonotum verdunkelt.....*baibarana* sp. nov.  
 —Mesonotum ganz hellgelb.....*coreana* sp. nov.

**22. *Amebachia baibarana* sp. nov.**

(Taf. VI, Fig. 18, ♂)

♀, ♂. Kopf nach hinten stark verengt, glatt und matt; Gesicht und Clypeus kaum oder spärlich fein punktiert, der letztere am Vorderrande leicht abgerundet und vom Gesicht nicht getrennt, der erstere in der Mitte schwach gewölbt; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Mandibeln dünn; Palpen schlank, fadenförmig.

Fühler schlank, etwas kürzer als der Körper, das 2te Geisselglied kaum länger als der Schaft. Thorax dünn, gelblich pubescent; Brustseiten ein wenig glänzend; Meso- und Metanotum ganz matt; Schildchen glatt, poliert, beiderseits bis zum Ende gerandet; Mesonotum lederartig fein punktiert; Parapsidenfurchen kaum bis zur Mitte des Mesonotums reichend; Metathorax hinten an den Seiten ohne Querleisten; Metanotum sehr fein querrissig; Metapleuren fein punktiert. Hinterleib glatt, spärlich fein behaart; Bohrer vorragend, so lang wie das 2te Segment. Flügel ganz hyalin; Areola klein und schief; Nervulus weit hinter der Gabel, der 2te rücklaufende Nerv interstitial; Ramellus fehlend; Stigma hell gelblich; Nerven dunkelbraun. Beine ziemlich schlank; Klauen deutlich gekämmt und von schwarzbrauner Färbung. Länge: ♀♂ 15 mm.

Schalgelb. Kopf und Gesicht wie die Grundfarbe; beim Männchen Gesicht in der Mitte rötlichgelb; Mandibeln mit Ausnahme der Zähne und die beiden Palpen gelbrot. Fühler ganz rot, gegen die Spitze hin ein wenig heller als die Basis; Mandibelzähne und der Raum zwischen den Nebenaugen schwarz. Meso- und Metanotum verdunkelt, beim Weibchen das erstere mit drei schwarzen Längsflecken. Beine gelbrot; die hintersten Hüften oben verdunkelt, deren Tarsen weisslichgelb. Hinterleib schmutziggelb, am Ende braun gefleckt.

Fundort: Formosa (Baibara, Kusukusu); 2 (1 ♀, 1 ♂) Exemplare wurden von Prof. S. ISSHIKI und K. KIKUCHI gesammelt.

T. N.: *Baibara-usuki-amebachi*.

### 23. *Amebachia coreana* sp. nov.

♂. Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Schläfen sehr schmal; Nebenaugen an die Augen fast stossend; Gesicht ziemlich dicht und Clypeus zerstreut fein punktiert; der Vorderrand des letzteren leicht abgerundet. Antennen schlank, von Körperlänge, das erste Geisselglied doppelt so lang wie der Schaft; Wangen fehlen. Mesonotum matt, spärlich fein punktiert; Parapsidenfurchen nur vorn deutlich; Schildchen bis zur Mitte seitlich schwach gerandet, poliert, fein punktiert; Metanotum fein querrissig, hinten an den Seiten in der Regel mit schwachen Querleisten, aber zuweilen fehlend; Pleuren ziemlich stark glänzend, glatt. Hinterleib stark komprimiert, das 2te und 3te Segment breiter als lang; Bohrer vorragend. Flügel hyalin; Stigma gelblich, durchscheinend; Nervulus weit hinter

der Gabel; Areola klein, dreieckig, schief. Beine normal.

Gelbrot. Gesicht, Clypeus, die beiden Palpen und Augenränder hellgelb; Antennen ganz gelblichrot; Stemmaticum und Spitze der Mandibeln schwarz. Thorax, Hinterleib und Beine wie die Grundfarbe. Länge: ♂ 11-12 mm.

Fundort: Korea (Shakôji, der Berg Kongô); gesammelt in 5 ♂ Exemplaren von T. KURISUE und dem Autor.

T. N.: *Chosen-usuki-amebachi*.

### TRIBUS OPHIONINI

#### Übersicht der Gattungen

1. Nervellus über der Mitte gebrochen ..... *Thyreodon* BRULLÉ  
—Nervellus in oder hinter der Mitte gebrochen.....2.
2. Nervellus in der Mitte gebrochen. Mandibeln vertikal. Clypeus vorn abgerundet ..... *Nipponophion* gen. nov.  
—Nervellus hinter der Mitte gebrochen .....3.
3. Mandibeln horizontal .....4.  
—Mandibeln vertikal .....8.
4. Basalabschnitt des Radius an der Basis nicht verdickt, ganz gerade ..... *Ophion* FABRICIUS  
—Basalabschnitt des Radius an der Basis verdickt und gekrümmt .....5.
5. Radialnerv an der Basis wellenförmig gebogen. Discocubitalzelle mit Hornflecken ..... *Dicamptus* SZÉPLIGETI  
—Radialnerv an der Basis einfach gebogen .....6.
6. Discocubitalnerv in der Mitte winklig gebrochen, mit deutlichem Ramellus. .... *Pleuroneurophion* ASHMEAD  
—Discocubitalnerv nicht winklig gebrochen, ohne Ramellus.....7.
7. Kopf nach hinten aufgetrieben. Schildchen an den Seiten ganz gerandet ..... *Eremotylus* FÖRSTER  
—Kopf nach hinten verschmälert. Schildchen nur an der Basis seitlich gerandet..... *Stauropodoctonus* FRAUNUS
8. Radialnerv an der Basis fast gerade oder kaum gebogen ..... *Henicospilus* STEPHENS  
—Radialnerv an der Basis doppelt gebogen ..... *Allocamptus* THOMSON

#### Gattung *Thyreodon* BRULLÉ

*Thyreodon* BRULLÉ, Hist. Nat. Ins., IV, p. 150 (1846).

*Coracophion* SHESTAKOV, Konowia, V, p. 260 (1926).

#### 24. *Thyreodon purpurascens* SMITH (Taf. VII, Fig. 9)

*Thyreodon purpurascens* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 395, ♀ (1874); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 185 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 25 (1905); MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 111, Pl. XLVII, Fig. 13, ♀ (1912); MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 19 (1912); SONAN, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIV, p. 96 (1924).

*Ophion metallicum* RADOSZKOWSKI, Horae Soc. Ent. Ross., XXI, p. 433 (1837);

DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 195 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 37 (1905).

*Coracophion manganicolor* SHESTAKOV, Konowia, V, p. 261, ♀ (1926).

Fundorte: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu und Korea; gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, T. OGASAWARA, G. TAKAGI, T. KURISUE, T. UYE, S. ISSHIKI, K. FUJII, S. ARAKAWA, S. HIRAYAMA, M. SUZUKI und dem Verfasser. Diese Art entwickelt sich aus der Puppe von *Ampelophaga rubiginosa* BREM. et GREY.

Sonstige Fundorte: Nord- und West-China und Ost-Sibirien.

T. N.: *Murasaki-usu-amebachi*.

### Gattung *Nipponophion* gen. nov.

Kopf nach hinten deutlich verschmälert; Nebenaugen und Augen sehr gross; die ersteren an die Augen stossend, die letzteren innen stark ausgerandet; der Vorderrand des Clypeus breit abgerundet; Mandibeln vertikal und ziemlich schlank. Fühler länger als der Körper. Parapsidenfurchen ganz fehlend; Schildchen etwas rundlich erhaben, nur an der Basis seitlich gerandet; Meso- und Metathorax durch einen tiefen und breiten Einschnitt getrennt; Metathorax in der Mitte mit kräftigem Querkiel; Spirakeln des Metathorax gross und linear. Hinterleib von der Seite stark zusammengedrückt, das erste Segment nur wenig länger als das folgende; Gastrocölen sehr lang gestreckt, etwas kürzer als die halbe Länge des 2ten Segmentes, Thyridien klein; das 3te Segment an der Basis gedrückt; Bohrer ganz versteckt. Beine lang; Klauen gekämmt. Flügel hyalin; Radius nur an der Basis verdickt und einfach gebogen; Discocubitalader bogenförmig; Cubitalquernerv so lang wie der Abschnitt des Cubitalnervs; Nervellus in der Regel in der Mitte oder etwas über der Mitte gebrochen; Discocubitalzelle ohne Chitinleck, an der Basis des Stigma mit kleinem durchsichtigem Teil; Stigma normal.

Genotype: *Nipponophion variegatus* UCHIDA.

Diese Gattung hat grosse Aehnlichkeit mit *Macrophion* SZÉPLIGETI aus Süd-Amerika, aber der Metathorax beiderseits an der Basis nicht eckig vorstehend, das Stigma im Vorderflügel normal und die Parapsidenfurchen ganz fehlend.

#### Übersicht der Arten.

Färbung schwarz, mit zahlreichen gelben Flecken .....*variegatus* sp. nov.

—Färbung gelbrot, mit zahlreichen schwarzen Flecken.....*coreanus* sp. nov.

#### 25. *Nipponophion variegatus* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 2, ♀)

♀, ♂. Grundfarbe schwarz, mit zahlreichen gelben grossen

Makel. Kopf, Gesicht und Clypeus gelb oder rötlichgelb, das Gesicht oben in der Mitte zuweilen schwärzlichbraun gefleckt; Mandibeln mit Ausnahme der Spitzen, Labrum und beide Palpen gelbrot; Stemmaticum, Mandibelnzähne, Hinterteil des Scheitels und die Stirn ganz schwarz. Antennen rotbraun, gegen die Basis schwarz; Schaft und Pedicellus unten etwas schwarzbraun. Thorax schwarz und matt; Schildchen, Tegulen, Schulter, Mesopleuren oben, Mesonotum vorn, Zwischenteil zwischen den Pro- und Mesopleuren, Meso- und Metathorax hinten gelbrot; Mesonotum beiderseits und hinten in der Mitte gelb gefleckt. Beine gelbrot, aber die Hinterschenkel und -schienen schwarz. Hinterleib zum grössten Teil schwarz; das erste Segment an der Basalhälfte, das 2te und 3te nur auf der Unterseite und das 4te ganz gelbrot. Flügel bräunlichgelb getrübt; Stigma braun; Nerven schwarz.

Kopf hinten verschmälert; Gesicht ziemlich dicht, Clypeus zerstreut punktiert, der letztere stark glänzend, vorn abgerundet; der erstere rundlich schwach konvex; Labrum vorstehend; Mandibeln dünn, mit 2 gleichen Zähnen; Palpen lang; Ocellen gross, an die Augen stossend. Antennen länger als der Körper, borstenförmig, das erste Geisselglied mehr als doppelt so lang wie der Schaft. Thorax robust, dicht gelblich pubescent; Mesonotum fein punktiert; Parapsidenfurchen kaum angedeutet; Schildchen rundlich erhaben, glänzend, nur an der Basis gerandet; Pro- und Mesopleuren kaum punktiert, etwas poliert; Metathorax mit kräftiger Querleiste in der Mitte, von derselben bis zur Basis des Metathorax glatt und der übrige Teil unregelmässig dicht grob gerunzelt; Metapleuren dicht punktiert; Luftlöcher gross, lang gestreckt. Beine schlank und lang, besonders die hintersten; Klauen dicht gekämmt. Nervellus in der Mitte oder etwas über der Mitte gebrochen; Nervulus deutlich antefurcal; Nervus parallelus über der Mitte der Brachialzelle entspringend. Hinterleib stark komprimiert; Bohrer fast versteckt; Gastrocölen lang; Genitalklappen nicht gross. Länge: ♀♂ 29-32 mm.

Fundorte: Hôkkaido (Moiwa, Maruyama, Jôzankei), Kurilen, Honshu (Fukushima, Miye, Nikko, Tokio); 7 (3 ♂, 4 ♀) Exemplare wurden von Prof. Dr. S. MATSUMURA, F. SCRIBA, K. DOI, K. TAMANUKI, M. TANAKA und dem Verfasser gesammelt. Parasit von *Actias artemis* BREM.

T. N.: *Madara-ô-amebachi*.

26. *Nipponophion coreanus* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 4, ♀)

♀. Kopf hinter den Augen ziemlich stark verengt, glatt; Gesicht dicht und Clypeus kaum punktiert; Nebenaugen gross, an die Augen stossend. Antennen länger als der Körper, mässig kräftig, borstenförmig; das erste Geisselglied mehr als doppelt so lang als der Schaft, das 2te so lang wie der Schaft. Körper robust, dicht fein gelb behaart; Mesonotum matt, dicht fein punktiert; Pro- und Mesopleuren etwas poliert, zerstreut punktiert; Parapsidenfurchen fast fehlend; Metathorax deutlich dicht grob punktiert, aber am Basaldrittel glatt, die Punktierung der Metapleuren dichter und gröber als die der Mesopleuren; Spirakeln desselben lang gestreckt. Hinterleib von der Seite stark zusammengedrückt; Thyridien lang und fast bis zur Mitte des 2ten Segmentes reichend. Bohrer ganz versteckt. Beine verhältnismässig schlank und lang, dicht gelb pubescent wie beim Körper; Klauen dicht gekämmt. Flügel gelblich hyalin; Stigma normal; Radialnerv an der Basis deutlich verdickt und einfach gebogen; Nervellus über der Mitte gebrochen; Nervulus deutlich antifurcal; Discocubitalnerv bogenförmig.

Färbung gelbrot. Stirn nahe der Fühlerbasis, Stemmaticum und Scheitel schwarz; die Spitzen der Mandibeln braun. Antennen rotbraun, gegen die Basis schwärzlich, Schaft und Pedicellus rotbraun, oben etwas verdunkelt. Mesonotum mit drei schwärzlichen Längsflecken, wovon der mittlere nach hinten verkürzt ist. Das erste Segment des Hinterleibs am Ende, das 2te und 3te auf der Rückenseite zum Teil, das 5te, 6te, 7te und 8te ganz schwarz. Beine wie die Grundfarbe, aber alle Schenkel an der Basis schmal schwarzbraun gesäumt, die Hinterschenkel auf der Innenseite verdunkelt. Flügel mit gelbrotem Stigma; Nerven schwarzbraun.

Länge: ♀ 28-31 mm.

Fundort: Korea (Shakôji); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren vom Autor; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Chosen-ô-amebachi*.

23a. *Nipponophion coreanus* UCHIDAvar. *infuscus* var. nov.

♀. Der Form und Zeichnung nach der Stammform sehr ähnlich, weicht aber in folgendem ab:

1. Antennen fast gelbrot, die Basis und der Schaft oben ein wenig verdunkelt.

2. Stirn nahe der Fühlerbasis nicht schwarz.

3. Die Hinterschenkel auf der Innenseite nicht verdunkelt.

4. Hinterleib grösstenteils gelbrot, aber am Ende und das 2te Segment auf dem Rücken etwas verdunkelt. Länge: ♀ 28–30 mm.

Fundorte: Shikoku (Iyo), Korea (Shakôji); gesammelt in 3 ♀ Exemplaren von S. ARAKAWA und dem Autor; das Männchen unbekannt.

### Gattung *Ophion* FABRICIUS

*Ophion* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 219 (1798).

#### Übersicht der Arten

1. Petiolus weisslichgelb .....2.  
–Petiolus nicht weisslichgelb .....5.
2. Thorax grösstenteils hell gelbrot.....*nikkonis* sp. nov.  
–Thorax grösstenteils oder wenigstens das Mesonotum schwarzbraun bis schwarz.....3.
3. Schildchen bis zur Mitte seitlich gerandet .....*hokkaidonis* sp. nov.  
–Schildchen an den Seiten nicht gerandet .....4.
4. Antennen schwärzlich. Thorax mit Ausnahme des Mesonotums bräunlich blassgelb .....*takaozanus* sp. nov.  
–Antennen gelbrot. Thorax grösstenteils schwärzlichbraun bis schwarz .....*sibiricus* SZÉPLIGETI var. *japonicus* var. nov.
5. Thorax mehr oder weniger schwarz.....6.  
–Thorax nicht schwarz.....7.
6. Hinterleibsende schwarz.....*okunii* sp. nov.  
–Hinterleibsende nicht schwarz .....*castaneus* sp. nov.
7. Der 2te rücklaufende Nerv mündet an der entgegengesetzten Spitze des Basalabschnitts der Radialader .....*orientalis* sp. nov.  
–Der 2te rücklaufende Nerv mündet vor der Spitze des Basalabschnitts der Radialader .....8.
8. Thorax, besonders an den Seiten, reichlich ockergelb gezeichnet .....9.  
–Thorax einfarbig gelbrot, nicht ockergelb gezeichnet .....10.
9. Thorax und Hinterleib nicht verdunkelt.....*obscurus* FABRICIUS  
–Thorax zum Teil und Hinterleib grösstenteils verdunkelt...*ainoicus* sp. nov.
10. Grosse Art von 15–25 mm. Petiolus schlank und lang .....*luteus* LINNÉ  
–Kleine Art von 10–13 mm. Petiolus kurz und dick ..*smithii* DALLA TORRE

#### 27. *Ophion nikkonis* sp. nov.

♂. Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit *O. hokkaidonis* UCH., sie weicht aber durch die folgenden Charaktere ab:

1. Kopf hinter den Augen stark verschmälert.
2. Fühler etwas länger als der Körper.

3. Schildchen und Meso- und Metapleuren stark punktiert.
4. Stigma hell gelbrot; Nerven bräunlich gelbrot.
5. Grundfarbe hell gelbrot, nur die Meso- und Metapleuren etwas verdunkelt.
6. Umgebung der Augen blassgelb.
7. Die Hintertarsen nicht heller als die Schienen.

Länge: ♂ 20 mm.

Fundort: Honshu (Nikko); nur ein ♂ Exemplar gesammelt am 10. August 1924 von F. SCRIBA; das Weibchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Nikko-nejiro-amebachi*.

28. *Ophion hokkaidonis* sp. nov.

♀, ♂. Kopf nach hinten etwas verschmälert, gerundet, glatt, glänzend; Gesicht dicht punktiert; Clypeus vom Gesicht deutlich getrennt; Mandibeln dick, mit 2 gleichen dicken Endzähnen; Wangen kurz; Ocellen gross, an die Augen stossend. Fühler so lang wie der Körper, ziemlich schlank, fadenförmig, am Ende etwas verdünnt. Thorax deutlich glänzend; Mesonotum kaum punktiert; Parapsiden bis zur Mitte deutlich; Schildchen bis zur Mitte seitlich gerandet, ziemlich schmal, glänzend und fast glatt; Mesopleuren fein punktiert; Mesonotum fast glatt oder spärlich fein punktiert; Metathorax hinten mit 2 schwachen Querleisten, die hintere in der Mitte gebrochen; Area superomedia undeutlich. Flügel hyalin, etwas gelblichgrau; Ramellus lang; Stigma gelbrot, aber die Umgebung des Stigma und die Nerven schwärzlichbraun; Nervulus interstitial; Nervellus etwas unter der Mitte gebrochen. Beine schlank; Klauen gekämmt. Hinterleib fast glatt und matt. Bohrer versteckt.

Grundfarbe schwarzbraun bis schwarz. Kopf gelbrot, höchst selten der Raum zwischen den Ocellen und die Stirn bräunlich. Fühler gelbrot. Mandibeln an den Spitzen schwarz. Thorax wie die Grundfarbe; Schildchen gelbrot; Metathorax zuweilen gelblichbraun; die Nähte des Thorax mehr oder weniger gelbrot. Beine gelbrot, die Hüften schwärzlich, die Hintertarsen sowie auch der Petiolus weisslichgelb. Hinterleib rötlichbraun, gegen das Ende etwas verdunkelt, das 2te Segment nur an der Basis schwarz.

Länge: ♀♂ 18-21 mm.

Fundorte: Sachalin (Konuma, Shimizu), Kurilen, Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Horobetsu, der Berg Daisetsu), Honshu (Kioto);

gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. S. MATSUMURA, M. SUZUKI, K. DOI, K. TAMANUKI und dem Verfasser.

T. N.: *Yezo-nejiro-amebachi*.

Der Form und Färbung nach *O. sibiricus* SZÉPL. wohl auch *O. albistylus* SZÉPL. sehr ähnlich, sie unterscheidet sich aber vom ersteren durch den schlanken Körper und das bis zur Mitte seitlich gerandete Schildchen, und vom letzteren durch die fein punktierten Mesopleuren, den ganz schwarz gefärbten Thorax und den schwach gelblichen Flügel.

29. *Ophion takaozumus* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 1, ♂)

♂. Kopf hinter den Augen ziemlich verengt und gerundet, glatt; Ocellen gross, an die Augen stossend; Gesicht und Clypeus punktiert, letzterer vom Gesicht deutlich getrennt, vorn abgerundet; Wangen sehr kurz. Thorax matt, sehr fein punktiert; Mesonotum schwach glänzend; Parapsidenfurchen vorn deutlich; Schildchen gross, dicht punktiert, nur an der Basis seitlich gerandet; Metathorax mit 2 starken Querleisten; Area superomedia deutlich ausgebildet. Hinterleib matt, kaum punktiert. Flügel hyalin, etwas bräunlich getrübt; Stigma und Nerven schwarzbraun; Ramellus lang; Nervulus antefurcal; Nervellus in der Mitte gebrochen. Beine ziemlich dick; Klauen gekämmt. Fühler borstenförmig, kräftig, das 2te Geisselglied so lang wie der Schaft.

Bräunlichgelb. Mandibelzähne, Stirn, der Raum zwischen den Ocellen, Hinterkopf, Mesonotum und Hinterleib mit Ausnahme des ersten Segmentendes schwarz; Gesicht oben in der Mitte rotbraun; Antennen schwärzlichbraun, aber gegen die Basis hin etwas gelblichbraun. Die Mittel- und Hinterschienen und deren Tarsen blassgelb. Das 2te und 3te Hinterleibssegment an der Basis schmal rotbraun gesäumt. Länge: ♂ 18-20 mm.

Fundort: Honshu (der Berg Takao); gesammelt am 26. Juli 1927 in zahlreichen ♂ Exemplaren von S. HIRAYAMA; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Takao-usuguro-amebachi*.

30. *Ophion sibiricus* SZÉPLIGETI  
var. *japonicus* var. nov.

♀, ♂. Der Form nach der typischen Art sehr ähnlich, die

Färbung aber ganz verschieden. Kopf ganz und Gesicht grösstenteils rein gelb, letzteres in der Mitte schmal und Stirn ganz gelbrot, beim Männchen zuweilen dunkel rotbraun; Mandibeln ausgenommen die Spitzen, Palpen und Antennen hell gelbrot. Thorax braun bis schwarz; Schildchen und die Nähte des Thorax mehr oder weniger sowie auch das Ende des Metathorax immer gelbrot; Tegulen gelb. Flügel gelblichbraun; Stigma gelbrot. Hinterleib gelbrot, selten dunkel rotbraun; Petiolus stets weisslichgelb. Beine meist gelbrot, in seltenen Fällen die Hinterhüften verdunkelt, noch seltener alle Schenkel verdunkelt. Länge: ♀♂ 19-20 mm.

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa, Kiminai, Toyohara, Shimizu), Hokkaido (Sapporo, Otaru, Garugawa, Asahigawa), Honshu (Nikko, Gifu, Kioto); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA, F. SCRIBA, M. YANAGIWARA, A. NOHIRA, S. TAKANO, Y. MIWA und dem Verfasser.

T. N.: *Moto-jiro-amebachi*.

31. *Ophion okunii* sp. nov. (Taf. V, Fig. 3, ♀)

♀. Kopf hinter den Augen rundlich schwach erweitert, glatt; Ocellen gross, an die Augen stossend; Gesicht und Clypeus dicht punktiert; der letztere beiderseits mit tiefer Furche, vorn leicht abgerundet; Labrum vorstehend; Mandibeln kräftig, mit 2 gleichen Zähnen versehen. Fühler kaum kürzer als der Körper, das erste Geisselglied  $1\frac{1}{2}$  mal so lang wie das 2te. Mesonotum etwas glänzend, sehr fein punktiert; Parapsidenfurchen kurz und tief; Schildchen punktiert, an den Seiten fast bis zur Mitte gerandet; Mesopleuren ziemlich stark glänzend, punktiert; Metathorax mit den beiden starken Querleisten; Area superomedia quadratisch. Hinterleib komprimiert, das erste Segment schlank, das 2te breit quergedrückt; Thyridien gross und tief; Bohrer versteckt. Klauen kurz gekämmt. Flügel gelblich hyalin; Stigma gelbrot; Nerven braun; Ramellus deutlich; Nervulus leicht und Nervellus deutlich antefurcal, der letztere über der Mitte gebrochen.

Grundfarbe schwarz bis schwarzbraun. Kopf grösstenteils, Fühler ganz, Mandibeln ausgenommen die Spitze, die beiden Palpen, Beine ganz, Schildchen, die Nähte des Thorax, Metathorax teilweise und Hinterleib mit Ausnahme des Endes gelbrot; Mandibelzähne, Mesonotum, Hinterleib am Ende, Mesopleuren und Metathorax grösstenteils schwarz oder schwarzbraun. Länge: ♀ 22 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); gesammelt in 5 ♀ Exemplaren von T. ÔKUNI und dem Verfasser; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Ôkuni-amebachi*.

Der Färbung und Form nach *O. ventricosus* GRAV. etwas ähnlich, aber der Nervellus antefurcal und über der Mitte gebrochen.

### 32. *Ophion castaneus* sp. nov.

♀. Kopf nach hinten zu stark verschmälert; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Gesicht und Clypeus fein punktiert; der letztere vorn leicht abgerundet, beiderseits tief ausgehöhlt; Mandibeln mässig kräftig. Fühler so lang wie der Körper, das erste Geisselglied 2 mal so lang wie das folgende. Körper ziemlich schlank, glatt und matt, gelblich fein pubescent; Mesonotum lederartig; Parapsidenfurchen kaum angedeutet; Schildchen etwas über der Mitte seitlich gerandet, stark glänzend; Metathorax mit 2 undeutlichen Querkielen, von denen der vordere an den Seiten und der hintere in der Mitte fehlt. Beine normal; Klauen gekämmt. Flügel gelblichgrau; Stigma gelbrot; Nerven schwarzbraun; Ramellus ziemlich lang; Nervellus in der Mitte gebrochen. Hinterleib schlank, stark komprimiert; Thyridien tief; Bohrer fast versteckt.

Färbung kastanienbraun. Kopf, Gesicht, Clypeus, Mandibeln, beide Palpen, Antennen ganz, Occiput und Stirn orangengelb; Thorax wie die Grundfarbe, aber das Mesonotum mehr oder weniger schwarzbraun; Metathorax, Schildchen und Hinterleib einfarbig bräunlichrot; Beine gelbrot, die Hintertarsen gelblich.

Länge: ♀ 17–19 mm.

Fundort: Formosa (Baibara, Horisha, Kiuhabon); gesammelt in 5 ♀ Exemplaren von R. SAITÔ und K. KIKUCHI; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Taiwan-kuri-iro-amebachi*.

### 33. *Ophion orientalis* sp. nov. (Taf. VII, Fig. 1)

♀, ♂. Kopf hinten rundlich verschmälert; Ocellen gross, an die Augen stossend; Gesicht schwach konvex, zerstreut punktiert; Clypeus am Vorderrande abgerundet, beiderseits tief gedrückt; Mandibeln dick; Wangen kurz. Antennen kaum kürzer als der Körper. Thorax glänzend, kaum punktiert; Schildchen nicht gerandet; Metathorax mit einer schwachen Querleiste; Area superomedia halb elliptisch, zuweilen hinten nicht geschlossen. Beine schlank; Klauen

kurz gekämmt. Flügel gelblich hyalin; Stigma gelbrot; Nerven braun; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen; Nervulus leicht antefurcal; die 2te rücklaufende Ader mündet an der gegenüberliegenden Spitze des Basalabschnitts des Radius. Hinterleib dicht fein gelb pubescent, komprimiert, am Ende verengt und etwas gespitzt; Bohrer fast versteckt; das 2te Segment an der Basis quergedrückt.

Gelbrot. Gesicht und Clypeus gelblichrot; Stemmaticum verdunkelt; Mandibelzähne schwarz; Schildchen gelblich; Mesonotum und -pleuren stets und das Ende des Hinterleibs selten bräunlich verdunkelt. Länge: ♀♂ 16–18 mm.

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa, Furumaki), Hokkaido (Moiwa), Korea (der Berg Kongô, Shakôji); gesammelt in 5 (4 ♀, 1 ♂) Exemplaren von T. KURISUE, S. TAKANO, K. TAMANUKI und dem Autor.

T. N.: *Saki-boso-amebachi*.

#### 34. *Ophion obscurus* FABRICIUS

*Ichneumon luteus* SCHRANK (nec LINNÉ), Enum. Ins. Austr., p. 371, ♀♂ (1781); OLIVIER, Encycl. Méth. Ins., p. 195 (1792).

*Ophion obscurus* FABRICIUS, Syst. Piez., p. 132 (1804); GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 689, ♀♂ (1829); RATZBURG, Ichn. d. Forst., I, p. 103 (1844); THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1191 (1888); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 197 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 30 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1443 (1908); MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 62 (1912); id., Brit. Ichn., V, p. 274, ♀♂ (1913); HABERMEHL, Konowia, I, p. 79, ♀♂ (1922).

*Anomalon obscurus* JURINE, Nouv. Méth. Hym., p. 116, ♀♂ (1807).

*Ichneumon polyguttator* THUNBERG, Bull. Ac. Petersburg, VII, p. 272 (1822).

*Ophion flavopictus* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 397, ♀ (1874).

Fundorte: Sachalin (Ôdomari), Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu, Korea und Formosa; gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, M. NAKAMURA, J. SHIBUYA, K. KIKUCHI, H. KAWAMURA, S. ISSHIKI, S. ISHIDA, S. ARAKAWA und dem Autor. Als Wirt wurde angegeben: *Dicraneura vinula felina* BUTL., *Acronicta leporia leporella* STGR., *A. lutea* BREM. et GREY. und *Agrotis c-nigrum* L.

Sonstige Fundorte: China, Amur und Europa.

T. N.: *Monki-amebachi*.

#### 35. *Ophion ainoicus* sp. nov.

♀, ♂. Kopf nach hinten zu etwas rundlich verschmälert, glatt, gelb pubescent; Ocellen gross, an die Augen stossend; Gesicht und Clypeus dicht punktiert; Mandibeln kräftig. Antennen so lang wie der Körper, das erste Geisselglied am längsten. Thorax ziemlich stark glänzend und glatt; Mesonotum und Schildchen lederartig fein

punktiert, das letztere an den Seiten nicht gerandet; Pleuren spärlich fein punktiert; Parapsidenfurchen vorn deutlich und tief. Die Flederung des Metathorax ist sehr veränderlich; oft zeigt sich nur die vordere Querleiste, zuweilen ist die hintere in der Mitte da durchbrochen, wo von der vorderen her 2 Längsleisten kommen, so dass sich hinten ein offenes Mittelfeld bildet; Flügel gelblich hyalin; Stigma ziemlich schmal, rötlichgelb; Nervulus antefurcal; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen; Discocubitalnerv mit deutlichem Ramellus. Beine verhältnismässig kurz, Schenkel etwas dick, besonders die hintersten; Klauen gekämmt. Bohrer ganz versteckt; das 2te und 3te Segment an der Basis gedrückt; Thyridien tief und klein.

Rötlich gelbbraun. Kopf, Gesicht und Clypeus ganz gelb; Stigmaticum dunkel rotbraun; Antennen, Mandibeln, Palpen und Beine wie die Grundfarbe; Thorax reichlich ockergelb gezeichnet; Mesonotum mit 3 dunkelbraunen Längsflecken, von denen der mittlere nach hinten verkürzt ist; Mesosternum ganz verdunkelt; Schildchen ockergelb; Hinterleib dunkelbraun, aber der Petiolus hellgelb

Länge: ♀♂ 13–17 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo, Aoyama, Otaru, Jōzankei); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren vom Verfasser.

T. N.: *Aino-kimadara-amebachi*.

Der Form und Zeichnung nach *O. obscurus* F. etwas ähnlich, weicht aber in folgendem ab: (1). Grundfarbe nicht gelbrot; Mesonotum und -sternum sowie auch der Hinterleib gelblich dunkelbraun. (2). Stigma im Vorderflügel wenig schmaler. (3). Beine etwas kürzer und dicker. (4). Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen.

### 36. *Ophion luteus* LINNÉ

*Ichneumon luteus* LINNÉ, Syst. Nat., Ed. 10, p. 566 (1758).

*Ichneumon vinulae* SCOPOLI, Ent. Carn., p. 286 (1783).

*Ichneumon fulvus* RETZIUS, Gen. Spec. Ins., p. 68 (1783).

*Ophion luteum* SCHRÖNENSTEIN, Verz. Halbk., p. 29 (1802).

*Ophion luteus* WALCKENAER, Faun. Paris, p. 72 (1802); FABRICIUS, Syst. Piez., p. 130 (1804); GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 692, ♀♂ (1829); RATZBURG, Ichn. Forst., I, p. 102 (1844); THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1190, ♀♂ (1888); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 193 (1901); SZÉPLIGÉTI, Gen. Ins., 34, p. 30 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1441 (1908); MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 62 (1912); id., Brit. Ichn., V, p. 144, ♀♂ (1913); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 365, ♀♂ (1913); HABERMEHL, Konowia, I, p. 79 (1922); MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsu-murana, I, p. 74, ♀♂ (1926).

*Ophion pungens* MATSUMURA (nec SMITH), Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 112, Pl. XLVIII, Fig. 1, ♀ (1912).

Fundorte: Nord- und Südsachalin, Hokkaido, Kurilen, Honshu, Shikoku, Kiu-shu, Okinawa, Formosa und Korea; gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, Dr. H. OKAMOTO, S. ARAKAWA, H. KAWAMURA, S. SAKAGUCHI, E. GALLOIS, H. TAKABAYASHI, S. HIRAYAMA, K. DOI und dem Autor. Verbreitet über ganz Japan und eine der häufigsten Arten von dieser Gattung. Sie schmarotzt in den folgenden Schmetterlingsarten: *Barathra brassicae* L., *Calymnia bifasciata pryeri* LEECH und *Psiloreta calida* BUTL.

Sonstige Fundorte: China, Indien und Europa.

T. N.: Ô-amebachi.

### 37. *Ophion smithii* DALLA TORRE

*Ophion unicolor* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 397, ♀ (1874).

*Ophion smithii* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 198 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 30 (1905).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Otaru, Jôzankei, Garugawa), Honshu (Hiogo); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren vom Autor.

T. N.: Kô-amebachi.

### Gattung *Dicamptus* SZÉPLIGETI

*Dicamptus* SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 28 (1905).

*Allocamptus* MORLEY (nec THOMSON), Rev. Ichn., I, p. 26 (1912).

#### Übersicht der Arten

Der Abschnitt der Cubitalader fast so lang wie die innere Cubitalader; das 3te Hinterleibssegment schwarz gefleckt. . . . . *nigropictus* MATSUMURA  
 —Der Abschnitt der Cubitalader 4 mal so lang wie die innere Cubitalader; das 3te Hinterleibssegment nicht schwarz gefleckt . . . . . *ishikii* sp. nov.

### 38. *Dicamptus nigropictus* MATSUMURA

*Ophion nigropictus* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 113, Pl. XLVIII, Fig. 2, ♀ (1912).

*Henicospilus nigropictus* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 71, ♀ (1926).

Fundorte: Honshu (der Berg Ibuki in der Prov. Kioto, Gifu), Okinawa, Formosa (Baibara, Kiuhabon, Tonpo), Korea (der Berg Kongô, Shakôji); gesammelt in 7 (2 ♂, 5 ♀) Exemplaren von H. KUROIWA, R. SAITÔ, K. KIKUCHI, T. KURISUE, M. EGUCHI, M. YANAGIWARA, U. NAWA und dem Autor.

T. N.: Kuro-mon-amebachi.

### 38a. *Dicamptus nigropictus* MATSUMURA

var. *fuscus* var. nov.

♂. Der Form und Zeichnung nach der Stammform sehr ähnlich, sie weicht aber in folgendem ab:

1. Grundfarbe dunkelbraun.
2. Discocubitalzelle mit nur einem gelben Chitinleck.

3. Mesonotum mit 3 schwärzlichen Längsflecken, wovon der mittlere fast bis zur Mitte reicht.

Fundort: Formosa (Baibara); 3 ♂ Exemplare wurden von R. SAITÔ und K. KIKUCHI erbeutet.

39. *Dicamptus issiki* sp. nov. (Taf. VII, Fig. 8)

♀. Diese ist kleiner und schlanker als die vorhergehende Art. Kopf hinten verschmälert, glatt; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Gesicht kaum punktiert, stark glänzend; Clypeus nur wenig gewölbt, vorn abgestutzt; Mandibeln mit 2 gleichen Zähnen; Palpen normal. Antennen schlank, länger als der Körper, das erste Geisselglied 2 mal so lang wie der Schaft, das 2te etwas länger als der Schaft. Thorax ziemlich stark glänzend; Mesonotum glatt; Schildchen an den Seiten fast bis zum Ende gerandet; Metathorax am Basaldrittel glatt und der übrige Teil unregelmässig dicht gerunzelt; Mesopleuren oben glatt, unten fein längsgerunzelt; Metapleuren quengerunzelt. Beine schlank. Flügel hyalin; Stigma und Nerven schwarzbraun; Discocubitalzelle mit einem grossen und langen Chitinfleck, welcher schwarzbraun gefärbt ist; Discocubitalader stark gebogen. Hinterleib sehr stark komprimiert; Thyridien schwach; Bohrer fast versteckt.

Gelbrot. Der Raum zwischen den Ocellen und das Hinterleibsende ganz schwarz. Stirn und Gesicht in der Mitte dunkel rotbraun. Länge: ♀ 15 mm.

Fundort: Honshu (Kii); nur ein ♀ Exemplar wurde von Prof. S. ISSHIKI gesammelt; das Männchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Isshiki-tsumaguro-amebachi*.

**Gattung *Pleuroneurophion* ASHMEAD**

*Pleuroneurophion* ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 86 (1900).

40. *Pleuroneurophion longicornis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 7, ♀)

♀. Kopf hinten verschmälert, glatt; Nebenaugen gross, an die Augen stossend; Augen innen ausgerandet; Gesicht und Clypeus ziemlich dicht punktiert, der letztere vorn abgerundet; Mandibeln mässig dick, mit 2 kräftigen Zähnen; Palpen fadenförmig, lang. Antennen schlank, länger als der Körper, das erste Geisselglied mehr als doppelt so lang wie der Schaft. Thorax glatt, filzig fein behaart; Mesonotum kaum punktiert; Parapsidenfurchen schwach und fast

bis zur Mitte des Mesonotums reichend; Schildchen zerstreut punktiert, an der Basis leicht gerandet; Pleuren glatt und glänzend; Metathorax an der Basalhälfte glatt, der übrige Teil fein längsgerunzelt, mit 2 schwachen Querleisten; Area superomedia viel länger als breit; Spirakel des Metathorax länglichelliptisch. Hinterleib von der Seite stark zusammengedrückt; Thyridien tief und nicht gross; Bohrer fast versteckt. Beine dünn; Klauen dicht gekämmt. Flügel graulich hyalin; Stigma und Nerven schwärzlichbraun; der Basalabschnitt des Radialnervs auffallend verdickt und gekrümmt; Nervulus interstitial; Discocubitalnerv mit deutlichem langem Ramellus; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen.

Schwarz. Kopf gelbrot; Scheitel, Occiput, Stirn, Gesicht oben in der Mitte und die Endzähne der Mandibeln schwarz; Palpen gelb. Antennen ganz gelbrot. Propleuren und -sternum sowie auch die Nähte des Thorax dunkel rotbraun. Beine und Hinterleib gelbrot, letzterer gegen die Spitze hin etwas bräunlich. Länge: ♀ 13 mm.

Fundort: Formosa (Funkiko); nur ein ♀ Exemplar wurde am 6. Mai 1926 von Prof. S. ISSHIKI gesammelt; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Higenaga-motobuto-amebachi*.

### Gattung *Eremotylus* FÖRSTER

*Eremotylus* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 150 (1868).

*Camptoneura* KRIECHBAUMER, Zeit. Hym.- u. Dipt., I, p. 23 (1901).

*Leptophion* CAMERON, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 227 (1901).

#### 41. *Eremotylus sibiricus* SZÉPLIGETI (Taf. VII, Fig. 15)

*Eremotylus sibiricus* SZÉPLIGETI, Ann. Mus. Nat. Hungar., p. 522, ♀ (1905).

Fundort: Hokkaido (Sapporo, Hattaribetsu); gesammelt in 2 (1 ♂, 1 ♀) Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA.

Sonstiger Fundort: Ost-Sibirien.

T. N.: *Tsumaguro-ô-amebachi*.

### Gattung *Stauropodoctonus* BRAUNS

*Stauropodoctonus* BRAUNS, Arch. Nat. Meck., XLIII, p. 93 (1889).

*Spilophion* CAMERON, Spol. Zeyl., p. 124 (1905).

*Eremotylus* SZÉPLIGETI (partim), Gen. Ins., 34, p. 35 (1905).

#### 42. *Stauropodoctonus orientalis* MORLEY

(Taf. VII, Fig. 12)

*Spilophion maculipennis* CAMERON, Spol. Zeyl., p. 125, Pl. B, Fig. 13, ♀ (1905).

*Stauropodoctonus orientalis* MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 18 (1912); id., Ind. Faun.

Hym., III, p. 376, ♀♂ (1913); SONAN, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIV, p. 93, ♀♂ (1924).

Fundort: Formosa (Tainan, Daitô, Tansui, Baibara, Tamaho); gesammelt in 7 (3 ♀, 4 ♂) Exemplaren von K. KIKUCHI, Dr. S. MATSUMURA und dem Autor.

Sonstiger Fundort: Indien.

T. N.: *Yase-amebachi*.

### Gattung *Henicospilus* STEPHENS

*Enicospilus* STEPHENS, Illustr. Brit. Ent. Man., VII, p. 126 (1835).

*Allocamptus* FÖRSTER (non THOMSON), Ver. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 150 (1868).

*Dispilus* KRIECHBAUMER, Berl. Ent. Zeitg., XXXIX, p. 309 (1894).

*Henicospilus* BRIDGMAN et FITCH, Entom., XVII, p. 177 (1894).

*Tripilus* KRIECHBAUMER, Zeit. Hym.-u. Dipt., J, p. 156 (1901).

*Pterospilus* KRIECHBAUMER, l. c., p. 156 (1901).

#### Übersicht der Arten.

1. Vorderflügel mit nur einem Hornfleck .....2.  
—Vorderflügel mit 2 oder 3 Hornflecken .....10.
2. Hornfleck dunkelbraun; Radialzelle an der Basis verdunkelt  
.....*fuscomaculatus* sp. nov.  
—Hornfleck gelbrot; Flügel fast hyalin .....3.
3. Basalabschnitt des Radius deutlich verdickt.....*mushanus* sp. nov.  
—Basalabschnitt des Radius nicht auffallend verdickt .....4.
4. Hornfleck fast dreieckig.....5.  
—Hornfleck nicht dreieckig .....7.
5. Mesonotum mit 3 dunkelbraunen Längsstriemen. Costa braun  
.....*tristrigatus* ENDERLEIN  
—Mesonotum einfarbig gelbrot. Costa nicht braun .....6.
6. Schildchen ganz glatt. Metanotum fein gerunzelt .....*shinkanus* sp. nov.  
—Schildchen ziemlich grob punktiert. Metanotum grob gerunzelt  
.....*yonezawanus* sp. nov.
7. Hornfleck klein und birnförmig.....*striatus* CAMERON  
—Hornfleck lang und linear.....8.
8. Metathorax hinten nicht quengerunzelt. Hinterhornfleck zuweilen vorhanden.....*lineatus* CAMERON  
—Metathorax hinten mehr oder weniger quengerunzelt. Hinterhornfleck fehlt ganz.....9.
9. Schildchen blassgelb. Innerer Cubitalnerv viel kürzer als der Abschnitt des Cubitalnervs .....*puhibundae* sp. nov.  
—Schildchen nicht blassgelb. Innerer Cubitalnerv etwas länger als oder so lang wie der Abschnitt des Cubitalnervs .....*maruyamanus* sp. nov.
10. Discoidalzelle mit 3 Hornflecken.....*triguttatus* sp. nov.  
—Discoidalzelle mit 2 Hornflecken .....11.
11. Discoidalader winklig gekrümmt, in der Mitte verdickt ..*flavocephalus* KIRBY  
—Discoidalader nicht winklig gekrümmt und verdickt .....12.
12. Basalabschnitt des Radius auffallend verdickt .....*giochiensis* sp. nov.  
—Basalabschnitt des Radius nicht auffallend verdickt .....13.

13. Flügel zum Teil schwärzlich verdunkelt .....14.  
 —Flügel fast hyalin .....15.
14. Stemmaticum schwarz. Thorax grösstenteils schwärzlich verdunkelt  
 .....*bifasciatus* sp. nov.  
 —Stemmaticum gelb. Mesonotum schwarz.....*nigribasalis* sp. nov.
15. Körper blassgelb.....16.  
 —Körper gelbrot oder schwarzbraun .....17.
16. Discoidalader gerade .....*tainanensis* sp. nov.  
 —Discoidalader etwas gebogen .....*kanshirensis* sp. nov.
17. Körper und Hinterleib schwarzbraun.....18.  
 —Körper und Hinterleib gelbrot.....19.
18. Schildchen grob quengerunzelt. Das 2te, 3te und 4te Hinterleibssegment  
 an der Basis schalgelb.....*semiopacus* MATSUMURA  
 —Schildchen glatt, rein gelb. Nur das 4te Hinterleibssegment beiderseits  
 hellgelb .....*taiwanus* sp. nov.
19. Hinterleibsende schwarz .....20.  
 —Hinterleibsende nicht schwarz .....22.
20. Hinterhornfleck linear. Metathorax hinten unregelmässig grob gerunzelt  
 .....*analisis* MATSUMURA et UCHIDA  
 —Hinterhornfleck rundlich und klein .....21.
21. Nervulus antefurcal. Metathorax hinten ziemlich grob gerunzelt  
 .....*reticulatus* CAMERON  
 —Nervulus interstitial .....22.
22. Metathorax hinten fein gerunzelt. Kopf nach hinten nicht aufgetrieben.  
 Hinterhornfleck klein und rundlich .....*ramidulus* LINNÉ  
 —Metathorax hinten fast glatt. Kopf hinten deutlich aufgetrieben. Hinter-  
 hornfleck sichelförmig und klein .....*yezoensis* sp. nov.
23. Thorax und Hinterleibsende dunkelbraun bis schwärzlich .....24.  
 —Thorax und Hinterleibsende gelbrot .....25.
24. Mesonotum vorn in der Mitte schwärzlich braun. Hinterhornfleck gross und  
 in der Mitte nach innen gekrümmt .....*formosensis* sp. nov.  
 —Mesonotum ganz schwarz. Hinterhornfleck klein und rundlich  
 .....*combustus* GRAVENHORST
25. Fühler kürzer als der Körper und kräftig .....*pungens* SMITH  
 —Fühler wenigstens so lang wie der Körper.....26.
26. Stigma und Nerven grösstenteils braun..*okinawensis* MATSUMURA et UCHIDA  
 —Stigma und Nerven nicht braun .....27.
27. Schildchen quengerunzelt.....28.  
 —Schildchen nicht quengerunzelt, sondern glatt oder punktiert.....29.
28. Metathorax hinten grob gerunzelt. Mesonotum zum Teil braun. Hinter-  
 hornfleck deutlich .....*riukiensis* MATSUMURA et UCHIDA  
 —Metanotum ganz rot. Hinterhornfleck undeutlich  
 .....*sakaguchi* MATSUMURA et UCHIDA
29. Mesopleuren deutlich dicht längsgerunzelt. Schildchen ganz glatt und  
 glänzend .....*emacescens* ENDERLEIN  
 —Mesopleuren nicht auffallend dicht längsgerunzelt .....30.
30. Metathorax hinten fein gerunzelt. Hinterhornfleck schlank. Schildchen  
 punktiert.....*merdarius* GRAVENHORST  
 —Metathorax hinten ziemlich grob gerunzelt.....31.

31. Mesopleuren ohne Längsrünzeln. Mesonotum in der Mitte rotbraun  
 ..... *laqueatus* ENDERLEIN  
 —Mesopleuren mit feinen Längsrünzeln ..... 32.  
 32. Mesonotum mit 3 Längstriemen..... *sauteri* ENDERLEIN  
 —Mesonotum ohne Längstriemen ..... *formosanus* ENDERLEIN

43. *Henicospilus mushanus* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 8, ♀)

♀. Eine grosse Art. Kopf nach hinten zu ziemlich schmal, glatt und ganz matt; Gesicht dicht fein punktiert; Clypeus kaum punktiert, vorn abgerundet; Mandibeln dünn, mit 2 ungleichen Zähnen, der obere ein wenig länger als der untere; Ocellen gross, an die Augen stossend. Antennen fast von Körperlänge, mässig dick. Thorax ganz matt; Mesonotum auffallend dicht fein punktiert; Schildchen beiderseits fast gerandet; Metathorax am Basalteile glatt, gewölbt, nach hinten schwach eingedrückt, grob quengerunzelt, in der Mitte zum Teil rauh. Bohrer fast versteckt. Klauen dicht und lang gekämmt. Flügel hyalin, der Vorderrand und das Stigma schwarz; Nerven braun, nur der Basalabschnitt des Radius gelbbraun, deutlich verdickt, kaum doppelt geschwungen; Chitinfleck gross und gelblich; Discocubitalader gebogen; Nervulus vor der Gabel; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen.

Licht ockergelb. Kopf und Gesicht ganz hellgelb. Antennen gelbrot, gegen die Basis rot. Beine und Hinterleib gelbrot, der letztere gegen das Ende verdunkelt. Länge: ♀ 28 mm.

Fundort: Formosa (Musha); gesammelt am 24. Juli 1925 in 2 ♀ Exemplaren vom Verfasser; das Männchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Itten-namigata-amebachi*.

44. *Henicospilus fuscomaculatus* sp. nov.

(Taf. VII, Fig. 5)

♀, ♂. Kopf glatt, kaum glänzend, nach hinten stark verengt; Ocellen gross; Gesicht und Clypeus glatt, etwas glänzend, fein gelb behaart, das erstere fast flach, der letztere vorn leicht abgerundet; Wangen sehr kurz. Fühler nur wenig länger als der Körper, das erste Geisselglied 2 mal so lang wie das folgende. Thorax matt, filzig fein pubescent; Mesonotum spärlich fein punktiert; Parapsidenfurchen kaum angedeutet; Schildchen an der Basalhälfte glatt, an der Spitzenhälfte grob gerunzelt, beiderseits gerandet; Propleuren glatt; Mesopleuren oben glatt, unten dicht längsrisig; Metathorax

an der Basis glatt, hinten sehr grob unregelmässig gerunzelt. Flügel fast hyalin; Stigma und Nerven dunkelbraun, das erstere an der Basis weisslichgelb; Discocubitalzelle mit nur einem grossen braunen Hornfleck, der Basalabschnitt des Radius in der Mitte deutlich verdickt; Radialzelle an der Basis mehr oder weniger schwärzlichbraun getrübt; Discocubitalnerv in der Mitte leicht gebogen; Nervulus interstitial; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen. Beine normal; Klauen dicht gekämmt. Bohrer ganz versteckt.

Gelbrot. Mandibelzähne braun. Klauen an den Spitzen schwarzbraun. Mesothorax zum grössten Teil und der Metathorax zuweilen an der Basis schwarzbraun bis schwarz; Mesopleuren grösstenteils gelbrot; das Mesonotum in seltenen Fällen gelbrot, mit 3 schwarzbraunen Längsflecken. Beine und Hinterleib wie die Grundfarbe.

Länge: ♀♂ 20–22 mm.

Fundorte: Honshu (Towada in der Präf. Aomori, Miye), Kiushu (der Berg Wakasugi in der Präf. Fukuoka), Shikoku (Tosa), Korea (Shakôji, der Berg Kongô), Formosa (Baibara); 9 (4 ♀, 5 ♂) Exemplare wurden von Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. YASUMATSU, T. KURISUE, S. ARAKAWA, Y. MIWA, M. YANAGIWARA und dem Verfasser gesammelt.

T. N.: *Kuro-hoshi-amebachi*.

#### 45. *Henicospilus shinkanus* sp. nov.

♀. Kopf hinten ein wenig verschmälert, glatt und glänzend; Scheitel breit; Nebenaugen gross, die Augen berührend; Augen innen stark ausgerandet; Gesicht und Clypeus glatt, das erstere in der Mitte spärlich fein längsrissig; Mandibeln dünn; Palpen borstenförmig. Fühler so lang wie der Körper. Thorax weisslich pubescent; Mesonotum und Schildchen glatt, dicht fein runzelig punktiert; Metathorax mit einem Querkiele, von demselben geht ein schwacher Längskiel bis zum Ende des Metathorax, an der Basis glatt und hinten dicht gerunzelt; Metapleuren runzelig punktiert. Flügel fast hyalin; Stigma und Nerven hell rötlichgelb; Hornfleck gross, fast dreieckig, Oberwinkel etwas gerundet; Discocubitalnerv schwach gebogen; Nervulus interstitial. Klauen gekämmt und von brauner Färbung. Hinterleib glatt, komprimiert; Bohrer versteckt.

Gelbrot. Kopf und Umgebung der Augen breit gelb; Petiolus an der Basis gelblich; Beine und Hinterleib licht mennigrot.

Länge: ♀ 18 mm.

Fundort: Formosa (Shinka); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren von S. TAKANO; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Shinka-amebachi*.

Der Form und Zeichnung nach *H. sakaguchii* MATSUMURA et UCHIDA sehr ähnlich, weicht von ihr aber in den folgenden Merkmalen ab: (1). Schildchen ganz glatt. (2). Mesopleuren dicht fein runzelig punktiert. (3). Metathorax an der Basis nicht runzelig. (4). Discocubitalzelle mit nur einem Hornfleck.

46. *Henicospilus yonezawanus* sp. nov. (Taf. VII, Fig.6)

♀, ♂. Kopf nach hinten stark verengt, glatt; Ocellen gross, an die Augen stossend; Gesicht oben in der Mitte mit einem kleinen Höcker, durchaus dicht punktiert; Clypeus glatt und glänzend, vorn abgerundet; Wangen kurz. Antennen von Körperlänge, das erste Geisselglied doppelt so lang wie der Schaft. Mesonotum fein punktiert, matt; Schildchen glatt und glänzend, an den Seiten bis zum Ende gerandet, die Punktierung des Schildchens gröber als die des Mesonotums; Metathorax an der Basis glatt, der hintere Teil fein runzelig; Pleuren fein runzelig punktiert. Flügel hyalin; Stigma und Nerven gelbbraun; Hornfleck fast dreieckig und gross, hellgelb; Nervulus weit vor der Gabel, der Basalabschnitt des Radius leicht verdickt. Beine schlank; Klauen bis zur Mitte kurz gekämmt. Bohrer fast versteckt.

Gelbrot. Kopf, Stirn, der Raum zwischen den Nebenaugen, Augenränder breit, Gesicht mit Ausnahme der Seiten und der Clypeus ganz gelb; Mandibeln an der Spitze rotbraun oder dunkelbraun. Länge: ♀♂ 20-21 mm.

Fundort: Honshu (Yamagata, Tohigi); gesammelt in 2 (1 ♀, 1 ♂) Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA.

T. N.: *Yonezawa-hoshi-amebachi*.

47. *Henicospilus striatus* CAMERON

*Henicospilus striatus* CAMERON, Manch. Mem., p. 103 (1899).

*Henicospilus striatus* SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 27 (1905); MORLEY, Rev. Ich., I, p. 46 (1912); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 392, ♀♂ (1913); SONAN, Taiwan No-ji ho, p. 151, ♀♂ (1925); MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 71, ♀ (1926).

Fundorte: Okinawa; Formosa (Taihoku, Arisan, Kagi, Takesaki); gesammelt in 5 (4 ♀, 1 ♂) Exemplaren von S. SAKAGUCHI, J. SONAN, M. KATÔ und S. HIRAYAMA. Schmarotzer von *Orygia postica* WK. (nach SONAN).

Sonstige Fundorte: Indien, China, Singapore und Sarawak.

T. N.: *Itten-amebachi*.

48. *Henicospilus lineatus* CAMERON

*Ophion lineatus* CAMERON, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 192, ♀♂ (1883); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 192 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34 p. 31 (1905).

*Henicospilus lineatus* MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 47 (1912).

Fundorte: Formosa (Kanshirei, Kuraru, Balbara), Korea (Fukkôji); gesammelt in 4 (3 ♀, 1 ♂) Exemplaren von K. KIKUCHI, G. TAKAGI und dem Verfasser

Sonstiger Fundort: Hawaii Inseln.

T. N.: *Suji-hoshi-amebachi*.

49. *Henicospilus pudibundae* sp. nov.

(Taf. VII, Fig. 4)

♀, ♂. Kopf nach hinten ganz verschmälert und schief, glatt; Gesicht kaum punktiert; Clypeus vorn abgerundet. Antennen etwas länger als der Körper. Mesonotum und Pleuren deutlich dicht punktiert, matt; Schildchen schwach gerandet, grob punktiert; Metathorax hinten in der Mitte breit und ziemlich tief ausgehöhlt; Metanotum zum grössten Teil regelmässig quengerunzelt. Hinterleib von der Seite stark zusammengedrückt, beim Männchen schmal. Flügel gelblich hyalin; Stigma und Nerven gelb; Chitinfleck schmal und undeutlich; Discocubitalader schwach gebogen; Nervulus weit vor der Gabel, antefurcal; Radius gegen die Basis etwas verdickt. Beine schlank; Klauen bis zur Mitte kurz gekämmt.

Rötlichgelb. Kopf ausgenommen der Hinterrand, der Raum zwischen der Fühlerbasis, Gesicht in der Mitte schmal, Clypeus vorn, Mandibeln mit Ausnahme der Spitzen, Mesonotum, Antennen, das erste und 2te Hinterleibssegment gelbrot. Kopf und Gesicht grösstenteils weisslichgelb; Mandibeln an den Spitzen braun, ein Fleck unter der Flügelwurzel und das Schildchen blassgelb. Hinterleib am Ende mehr oder weniger bräunlich. Länge: ♀♂ 20–22 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo), Honshu (Tokio), Korea (Onseiri); 4 (2 ♀, 2 ♂) Exemplare gesammelt von Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. TAMANUKI, T. KURISUE und dem Verfasser. Diese Art entwickelt sich aus der Puppe von *Dasychira pudibunda* L.

T. N.: *Ringo-dokuga-amebachi*.

Diese Art ähnelt *H. variegatus* SZÉPLIGETI, aber die Färbung und Zeichnung des Körpers sind ganz verschieden.

50. *Henicospilus maruyamanus* sp. nov.

(Taf. VII, Fig. 2)

♀, ♂. Kopf hinter den Augen schmal und schief, glatt; Gesicht punktiert; Clypeus glatt; Mandibeln mit 2 ungleichen Zähnen, von denen der untere kürzer ist als der obere. Fühler etwas länger als der Körper, das erste Geißelglied doppelt so lang wie das folgende. Thorax matt, dicht gelblich pubescent; Mesonotum und Schildchen ziemlich dicht grob punktiert, das letztere an der Spitze granuliert, beiderseits fast bis zum Ende gerandet; Pleuren auffallend dicht runzelig punktiert; Metathorax an der Basis glatt, der übrige Teil dicht runzelig, hinten in der Mitte kaum ausgehöhlt. Flügel fast hyalin; Nerven und Stigma gelbrot; Chitinfleck undeutlich und linear; Nervulus weit vor der Gabel; Nervellus deutlich hinter der Mitte gebrochen; Radius gegen die Basis verdickt, in der Mitte etwas gekrümmt; innerer Cubitalnerv etwas kürzer als der Abschnitt des Cubitalnervs. Klauen bis zum Ende lang gekämmt. Hinterleib lang und komprimiert.

Gelbrot. Kopf mit Ausnahme des Hinterteils, der Raum zwischen den Ocellen und die Augenränder gelb; Mandibeln an den Spitzen schwarzbraun; einige Endsegmente des Hinterleibs seitlich braun gefleckt oder fleckenartig verdunkelt. Länge: ♀♂ 23-25 mm.

Fundorte: Sachalin (Shisuka), Hokkaido (Sapporo); gesammelt in 3 (2 ♀, 1 ♂) Exemplaren von Y. MURASE und dem Autor.

T. N.: *Maruyama-hoshi-amebachi*.

Der Färbung und Form nach *H. repentinus* HOLMG. aus Europa etwas ähnlich, aber die Mandibelzähne ungleich; Hornfleck im Vorderflügel fast dreieckig, Kopf nach hinten stark verengt und innerer Cubitalnerv etwas länger als der Abschnitt des Cubitalnervs.

51.\* *Henicospilus tristrigatus* ENDERLEIN

*Henicospilus tristrigatus* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., LXXXII, p. 23, ♀ (1921).

Fundort: Formosa (Pilam).

T. N.: *Taiwan-misuji-amebachi*.

52. *Henicospilus sakaguchii* MATSUMURA et UCHIDA

*Henicospilus sakaguchii* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, 1, p. 73, ♂ (1926).

Fundort: Okinawa; 4 (2 ♀, 2 ♂) Exemplare wurden von S. SAKAGUCHI und

---

\* mir unbekannt.

S. TAKANO gesammelt. Schmarotzer von *Sesamia infelens* WK. (nach TAKANO).  
T. N.: *Sakaguchi-amebachi*.

53. *Henicospilus triguttatus* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 5, ♀)

♀. Eine grosse Art. Kopf nach hinten verengt und schief, glatt; Ocellen gross, erhöht und an die Augen stossend; Augen innen an der Fühlerbasis stark ausgerandet; Gesicht zerstreut fein punktiert; Clypeus glatt, am Vorderrande abgerundet; Mandibeln dünn, mit 2 ungleichen Zähnen, der untere wenig kürzer; Wangen kurz; Maxillar-Palpen lang, die 2 Basalglieder an der Spitze erweitert. Fühler von Körperlänge. Thorax ganz matt, weisslich fein pubescent, besonders Mesopleuren und -sternum; Mesonotum glatt; Schildchen bis zum Ende seitlich gerandet, punktiert, nur an der Spitze runzelig; Mesopleuren oben spärlich fein punktiert, unten grob längsgerunzelt; Metathorax an der Basis glatt, der übrige Teil dicht grob netzförmig gerunzelt. Hinterleib auffallend lang; Bohrer fast versteckt. Beine lang; Klauen ganz kurz gekämmt. Flügel hyalin, aber der Vorderflügel an der Basis und auch die Radialzelle nahe dem Stigma schwärzlich verdunkelt; Stigma und Nerven schwarzbraun; innere Cubitalader so lang wie der Abschnitt der Cubitalader; Nervulus vor der Gabel; Nervellus weit unter der Mitte gebrochen; Discocubitalzelle mit 3 Chitinflecken, wovon der vordere rundlich, der hintere lang und der mittlere undeutlich ist.

Gelbrot. Der Raum zwischen den Nebenaugen, Augenränder, Fühler gegen die Spitze hin und alle Beine rötlichgelb; Mesonotum zum grössten Teil, Mesosternum ganz und die folgenden Hinterleibssegmente vom 3ten bis letzten ausgedehnt schwarzbraun; das erste, 2te und 3te Segment an der Basis, Mesonotum vorn und die Hinterhüften rot. Länge: ♀ 34 mm.

Fundort: Formosa (Horisha); nur ein ♀ Exemplar wurde von Prof. Dr. S. MATSUMURA erbeutet; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Mitsu-hoshi-amebachi*.

54. *Henicospilus flavocephalus* KIRBY

*Henicospilus flavocephalus* KIRBY, Monog. Christ. Isl. Faun., p. 82 (1900); MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 45 (1912).

*Henicospilus similis* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 72, ♀ (1926).

Fundorte: Okinawa; Formosa (Tainan, Baibara); gesammelt in 5 (2 ♀, 3 ♂) Exemplaren von S. TAKANO, S. SAKAGUCHI und dem Verfasser.

Sonstige Fundorte: Singapore und Indien.

T. N.: *Kimune-amebachi*.

55. *Henicospilus bifasciatus* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 12, ♀)

♀. Kopf nach hinten stark verschmälert, schief und glatt; Gesicht und Clypeus glatt; Mandibeln dünn, mit 2 ungleichen Zähnen, von denen der untere etwas kürzer als der obere ist; Palpen fadenförmig und lang. Fühler schlank und viel länger als der Körper, das erste Geisselglied 2 mal so lang wie das folgende. Thorax nicht robust, ganz matt; Mesonotum glatt; Schildchen seitlich schwach gerandet; Mesopleuren oben glatt, unten grob längsgerunzelt; Metapleuren dicht grob quengerunzelt; Metanotum an der Basis glatt, hinten dicht unregelmässig runzelig. Hinterleib von der Seite stark zusammengedrückt. Beine normal; Klauen gekämmt. Flügel hyalin, der Vorderflügel mit 2 schwarzen Querbinden; Nerven schwarzbraun; Stigma, die beiden Hornflecke und die Basalhälfte des Radius blassgelb; der Abschnitt des Radius in der Mitte deutlich verdickt; der Vorderchitinleck fast dreieckig, aber die Hinterwinkel linienförmig verlängert, der hintere kommaförmig; der Abschnitt des Cubitalnervs mehr als 5 mal so lang wie der innere Cubitalnerv; Nervulus etwas vor der Gabel.

Kopf, Gesicht und Clypeus zum grössten Teil rein gelb; der Raum zwischen den Nebenaugen, Stirn an der Fühlerbasis, Mesonotum grösstenteils, Mesopleuren und -sternum, Metapleuren und Hinterleibsende schwärzlich. Antennen ganz gelbbrot. Beine und Hinterleib ockergelb, alle Trochantern und Schenkel gegen die Basis schalgelb; die sämtlichen Hüften, Schildchen, Metanotum und Prothorax schmutzig gelbbraun; Schulter und ein Fleck unter der Flügelwurzel rein gelb; die 2 Basalsegmente des Hinterleibs je am Hinterrande und das 3te nur an der Basis gelbbrot. Länge: ♀ 15 mm.

Fundort: Formosa (Baibara); nur ein ♀ Exemplar wurde am 20. Juli vom Autor aufgefunden; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Futasuji-hoshi-amebachi*.

Der Form und Zeichnung nach *Stauropodoctonus orientalis* MORL. etwas ähnlich, aber die Mandibeln vertikal.

56. *Henicospilus nigribasalis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 11, ♀)

♀. Grundfarbe schalgelb. Antennen ganz, Mandibeln mit

Ausnahme der Endzähne, Schienen, Tarsen, Schenkel an der Spitzenhälfte, die 2 Basalsegmente des Hinterleibs, Stigma, beide Hornflecke im Vorderflügel und der Basalabschnitt des Radius ockergelb; Mandibelzähne, Mesonotum, das 3te und 4te Hinterleibssegment auf der Unterseite und die folgenden Segmente vom 5ten bis letzten vollständig bräunlichschwarz. Flügel hyalin, nur an der Basis der beiden Flügel schwärzlich getrübt; Vorderrand, Basalnerv und Cubitalnerv gegen die Basis schwärzlich.

Kopf hinten stark verschmälert, glatt; Clypeus und Gesicht glatt, das letztere nach unten etwas verengt; Mandibeln dünn. Antennen kaum länger als der Körper, etwas kräftig. Thorax matt; Mesonotum fein punktiert; Schildchen flach, an den Seiten schwach gerandet, kaum punktiert; Pleuren auffallend dicht fein runzelig; Metathorax an der Basis glatt, hinten grob schräggerunzelt. Beine normal; Klauen kurz gekämmt. Der Basalabschnitt des Radius in der Mitte verdickt; der Vorderhornfleck fast dreieckig, der hintere kommaförmig und liegt nahe der Spitze des Basalabschnitts des Radialnervs; Discocubitader schwach wellig; Nervulus weit vor der Gabel; Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle entspringend; Discoidalzelle ziemlich schmal. Hinterleib schlank, das 2te und 3te Segment lang; Bohrer versteckt. Länge: ♀ 20 mm.

Fundort: Formosa (Baibara); gesammelt in einem ♀ Exemplare von K. KIKUCHI; das Männchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Moto-guro-hoshi-amebachi*.

#### 57. *Henicospilus semiopacus* MATSUMURA

*Henicospilus semiopacus* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 114, Pl. XLVIII, Fig. 3, ♀ (non ♂) (1912).

*Henicospilus hariotus* MORLEY (nom. lit.), Rev. Ichn., p. I, p. 44 (1912); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 387, Fig. 109, ♀♂ (1913).

Fundort: Formosa (Giochi, Tarowan, Baibara); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von Prof. Dr. S. MATSUMURA.

Sonstiger Fundort: Indien.

T. N.: *Sukimon-amebachi*.

#### 58. *Henicospilus formosensis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 10, ♀)

♀. Eine grosse Art. Kopf von oben gesehen etwas breiter als der Thorax, nach hinten verschmälert, glatt; Ocellen gross; Gesicht ziemlich dicht grob, Clypeus fein, punktiert; der letztere glänzend, vorn abgerundet; Mandibeln verhältnismässig dick, mit 2 ungleichen

Zähnen, der obere länger. Antennen kräftig, etwas länger als der Körper, das erste Geisselglied fast 2 mal so lang wie das folgende; Schaft so lang wie das 2te Geisselglied. Thorax ziemlich robust und glänzend; Mesonotum lederartig punktiert; Parapsidenfurchen ganz fehlend; Schildchen zerstreut punktiert, an den Seiten über die Mitte gerandet; Pleuren punktiert; Metathorax an der Basis glatt, hinten unregelmässig grob runzelig. Beine lang und kräftig; Klauen dicht und lang gekämmt. Bohrer fast versteckt. Flügel gelblich hyalin; Stigma braun; Nerven dunkelbraun; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen; Nervulus vor der Gabel.

Gelbbraun. Kopf, Gesicht und Clypeus gelblichbraun; Antennen ganz gelbrot; Mesonotum in der Mitte mit einem dunklen Längsfleck, welcher vom Vorderrande des Mesonotums bis zur Mitte reicht. Alle Beine hell gelbbraun; die 2 Basalsegmente des Hinterleibs braun, die übrigen vorwiegend schmutzigbraun. Länge: ♀ 27 mm.

Fundort: Formosa (Baibara); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von R. SAITÔ und K. KIKUCHI; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Taiwan-ô-hoshi-amebachi*.

### 59. *Henicospilus combustus* GRAVENHORST

*Ophion combustus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 701, ♀♂ (1829).

*Enicospilus combustus* STEPHENS, III, Brit. Ent. Suppl., p. 3 (1846); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1432 (1908).

*Henicospilus combustus* BRIDGMAN et FITH, Entom., p. 176, ♀♂ (1884); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 181 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 26 (1905); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 282, ♀♂ (1913).

Fundorte: Sachalin (Kawakami); Hokkaido (Sapporo, Teshio, Jôzankei, Aoyama); Kurilen; Honshu (Towada, Gifu, Iwashiro, der Berg Takao, Nikko); Korea (der Berg Kongô); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. DOI, S. HIRAYAMA, E. GALLOIS, T. KURISUE und dem Verfasser. Sie schmarotzt in der Larve von *Trachea tokiensis* BUTL.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Munaguro-hoshi-amebachi*.

### 59a. *Henicospilus combustus* GRAVENHORST var. *shikokuensis* var. nov.

♀, ♂. Der Form und Zeichnung nach der Stammform ähnlich, aber die Färbung ist ganz verschieden.

Mesonotum stets schwärzlichbraun bis schwarz; Hinterleib zum grössten Teil schwarzbraun. Länge: ♀♂ 23-25,5 mm.

Fundort: Honshu (Miye, der Berg Ibuki), Shikoku (Iyo);

5 (2 ♀, 3 ♂) Exemplare wurden von M. YANAGIWARA, S. ARAKAWA und K. FUJII erbeutet.

60. *Henicospilus analis* MATSUMURA et UCHIDA

*Henicospilus analis* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 72, ♀ (1926).

Fundort: Okinawa; gesammelt in 3 (1 ♂, 2 ♀) Exemplaren von H. KUROIWA und S. SAKAGUCHI.

T. N.: *Shiriguro-amebachi*.

Diese Art ähnelt *H. reticulatus* CAM., weicht aber durch den linienförmigen Hinterhornfleck in der Discocubitalzelle des Vorderflügels ab.

61. *Henicospilus ramidulus* LINNÉ

*Ichneumon ramidulus* LINNÉ, Syst. Nat., Ed. 10, I, p. 566 (1758); FABRICIUS, Ent. Syst., II, p. 178 (1793).

*Sphex truncata* PODA, Ins. Mus. Graec., p. 107 (1761).

*Ophion ramidulus* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 178 (1798); GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 699, ♀ (1829); RATZEBURG, Ichn. Forst., p. 79 (1844).

*Anomalon ramidulus* JURINE, Nouv. Meth. Class. Hym., p. 116 (1807).

*Henicospilus ramidulus* BRIDGMAN-FITCH, Entom., XVII, p. 177, ♀ (1884); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 183 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 26 (1905); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 28 (1913).

*Enicospilus ramidulus* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1188, ♀ (1888); SCHMIEDKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1434 (1908).

Fundorte: Nord-Sachalin (Alexandrowsk), Süd-Sachalin (Kawakami, Kiminai, Konuma, Shimizu), Kurilen, Hokkaido (Sapporo, Jōzankei), Honshu (Nagano), Korea (der Berg Kongō, Shakōji); gesammelt in zahlreichen ♀ Exemplaren von K. TAMANUKI, H. KŌNO, K. DOI, H. KURISUE und dem Autor. Parasit von *Catocala electa* BUTL.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Sakiguro-hoshi-amebachi*.

62. *Henicospilus tainanensis* sp. nov.

♂. Grundfarbe blassgelb. Labrum, Mandibeln (Endzähne schwarz), die beiden Palpen und Fühler gelbrot. Mesonotum mit 3 Längsstriemen, in der Mitte vorn rostbraun. Beine wie die Grundfarbe. Das 2te Hinterleibssegment ganz, das erste Segment an der Spitzenhälfte und das Ende des Hinterleibs gelbrot. Stigma und Nerven hellgelbrot. Costa braun.

Kopf hinten deutlich verengt. Fühler so lang wie der Körper, mässig kräftig. Schildchen glatt, an der Spitze längsgerunzelt, beiderseits schwach gerandet. Mesopleuren oben glatt, unten spärlich fein längsgerunzelt; Querkiel fast gerade, Teil davor fast glatt, Teil dahinter grob wellig quer bis schräg gerunzelt, aber in der Mitte mit immer kräftiger Längsleiste. Flügel hyalin, etwas grau; Vor-

derhornfleck gross, dreieckig, die Basis fast parallel zum Radius; Hinterhornfleck länglich und liegt nahe dem Radius; Nervulus fast interstitial; Discoidalader fast gerade, die Breite der Discoidalzelle an der Basis etwas schmaler als am Ende. Klauen kurz gekämmt.

Körperlänge: ♂ 20-22 mm.

Fundort: Formosa (Tainan, Shinka); gesammelt in 3 ♂ Exemplaren von S. TAKANO; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Tainan-hoshi-amebachi*.

### 63. *Henicospilus kanshirensis* sp. nov.

♂. Unterscheidet sich von *H. tainanensis* UCH. durch die folgenden Merkmale:

1. Körper grösser: 26 mm. Fühler etwas schlanker und länger.
2. Mesonotum gleichmässig blass gelbbraun.
3. Schildchen beiderseits stark gerandet.
4. Das 3te, 4te, 5te und 6te Hinterleibssegment auf der Rückenseite schwärzlich braun.
5. Nerven an der Basis rostbraun; Nervulus antefurcal.
6. Proximaler Hornfleck am Ende langgestreckt.
7. Discoidalader gebogen; die Breite der Discoidalzelle an der Basis viel schmaler als am Ende.

Fundort: Formosa (Kanshirei); gesammelt am 15. April 1908 von Prof. Dr. S. MATSUMURA; das Weibchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Kanshirei-hoshi-amebachi*.

### 64. *Henicospilus taiwanus* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 13, ♀)

♀. Unterscheidet sich von *H. semiopacus* MATS. durch die folgenden Merkmale:

1. Schildchen nicht quengerunzelt, sondern ganz glatt und stark glänzend.
2. Die 2 Hornflecke in der Discoidalzelle des Vorderflügels entfernt von einander, der hintere viel kleiner.
3. Metathorax an der Spitzenhälfte regelmässig schräggerunzelt.
4. Metanotum in der Mitte nicht schwarz gefleckt.
5. Das erste und 2te Hinterleibssegment ganz rot, ersteres am Ende zuweilen etwas verdunkelt. Länge: ♀ 20-22 mm.

Fundort: Formosa (Tarowan, Kiuhabon, Baibara); 3 ♀ Exemplare wurden von K. KIKUCHI und dem Verfasser erbeutet; das

Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Taiwan-sukimon-amebachi*.

65. *Henicospilus reticulatus* CAMERON

*Henicospilus reticulatus* CAMERON, Faun. Mald. Lacc. Arch., I, p. 51 (1902).

*Henicospilus reticulatus* MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 46 (1912); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 388, ♀♂ (1913).

Fundorte: Okinawa, Formosa (Baibara); gesammelt in 4 (1 ♂, 3 ♀) Exemplaren von S. SAKAGUCHI und dem Autor.

Sonstige Fundorte: Punjab, Burma, Sarawak, Celebes und Malayische Staaten.

T. N.: *Taiwan-sakiguro-hoshi-amebachi*.

66. *Henicospilus pungens* SMITH

*Ophion pungens* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 396, ♂ (1874) (non ♀); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 198 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 30 (1905).

*Henicospilus pungens* MORLEY, Rev. Ichn., I, p. 46 (1912); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 384, ♀♂ (1913).

Fundort: Honshu (Hiogo, Miye); gesammelt in nur 1 ♀ Exemplare von M. TANAKA.

Sonstige Fundorte: Singapore und Indien.

T. N.: *Hoshi-amebachi*.

67. *Henicospilus riukiensis* MATSUMURA et UCHIDA

*Henicospilus riukiensis* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 71, Pl. III, Fig. 20, ♂ (1926).

Fundort: Okinawa; gesammelt in einem ♂ Exemplare von S. SAKAGUCHI.

T. N.: *Riukiu-amebachi*.

68. *Henicospilus okinawensis* MATSUMURA et UCHIDA

*Henicospilus okinawensis* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 71, Pl. III, Fig. 19, ♀♂ (1926).

Fundort: Okinawa; gesammelt in 4 (2 ♀, 2 ♂) Exemplaren von S. SAKAGUCHI

T. N.: *Okinawa-futaten-amebachi*.

69. *Henicospilus yezoensis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 22, ♀)

♀, ♂. Körper schlank. Kopf hinten und Schläfen deutlich aufgetrieben, glatt; Gesicht glänzend, spärlich fein punktiert; Clypeus rundlich gewölbt, deutlich getrennt vom Gesicht; Labrum vorragend; Mandibeln dick. Thorax ziemlich glänzend, glatt; Schildchen beiderseits gerandet; Querkiel des Metathorax schwach und gerade, Teil davor glatt, Teil dahinter fast glatt oder spärlich fein gerunzelt. Beine schlank. Klauen gekämmt. Flügel mässig kurz, hyalin, graulich; Nerven und Stigma gelbrot; der proximale Hornfleck gross,

fast dreieckig, die äussere Ecke gespitzt, der distale Hornfleck klein und sichelförmig, ohne Schweif; Nervulus fast interstitial; Discoidalader schwach gebogen. Antennen schlank und so lang wie der Körper.

Grundfarbe gelbrot. Antennen gelblich rot, gegen das Ende bräunlich gelbrot. Externe Orbitæ des Männchens zum Teil gelblich. Thorax, Beine und Hinterleib von der Grundfarbe, nur am Ende des letzteren schwarz. Körperlänge: ♀♂ 14-17 mm.

Diese Spezies verwandt mit *H. ramidulus* GRAV., unterscheidet sich aber durch die folgenden Merkmale:

1. Kopf hinten und Schläfen deutlich aufgetrieben.
2. Hinterhornfleck sichelförmig; die äussere Ecke des Vorderflecks gespitzt.
3. Metathorax hinten glatt oder spärlich fein gerunzelt.
4. Augenränder und Gesichtseiten des Männchens nicht gelb.
5. Körper schlank; Flügel mässig kurz.

Fundort: Hokkaido (Sapporo, Jôzankei); 2 (1 ♀, 1 ♂) Exemplare wurden vom Autor gesammelt.

T. N.: *Yezo-tsumaguro-hoshi-amebachi*.

#### 70.\* *Henicospilus sauteri* ENDERLEIN

*Henicospilus Sauteri* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., 82, p. 24, ♀ (1921).

Fundort: Formosa (Pilam).

T. N.: *Sauter-hoshi-amebachi*.

#### 71. *Henicospilus emacescens* ENDERLEIN

*Henicospilus emacescens* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., 82, p. 25, ♂ (1921).

Fundort: Formosa (Pilam, Shinka); gesammelt in 2 ♂ Exemplaren von S. TAKANO.

T. N.: *Taiwan-tsuyaaka-hoshi-amebachi*.

#### 72.\* *Henicospilus formosanus* ENDERLEIN

*Henicospilus formosanus* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., 82, p. 25, ♀ (1921).

Fundort: Formosa (Pilam).

T. N.: *Taiwan-madara-hoshi-amebachi*.

#### 73.\* *Henicospilus laqueatus* ENDERLEIN

*Henicospilus laqueatus* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., 82, p. 26, ♂ (1921).

Fundort: Formosa (Pilam).

T. N.: *Himesuji-hoshi-amebachi*.

74. *Henicospilus gyochiensis* sp. nov.

(Taf. VII, Fig. 3)

♂. Kopf hinten stark verschmälert, ganz schief, glatt, glänzend; Stirn, Gesicht und Clypeus glatt, deutlich glänzend; Wangen fast fehlend; Mandibeln schlank, 2 zählig, der untere etwas kürzer. Fühler so lang wie der Körper. Mesonotum matt, lederartig; Schildchen punktiert, an den Seiten bis zur Spitze gerandet; Metathorax an der Basis glatt, nach hinten runzelig, am Ende mit einigen Querleisten; Meso- und Metapleuren dicht fein runzelig punktiert, aber die Propleuren fein längsgerunzelt. Beine schlank; Klauen dicht und lang gekämmt. Flügel hyalin; Stigma und der Vorder- rand des Flügels bis zum Stigma schwarz; Nerven bräunlich, der Basalabschnitt des Radius ganz gelb, stark verdickt und schwach wellenförmig gekrümmt; Discocubitalzelle mit 2 gelben und runden Hornflecken; Radius stark; Discocubitalader kaum gebogen; der innere Abschnitt der Cubitalader viel kürzer als die Cubitalader; Nervulus fast interstitial; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen.

Grundfarbe gelbrot. Kopf, Stirn, Gesicht und Clypeus ganz citronengelb; Mesopleuren, Mesonotum vorn beiderseits und Schildchen gelb, das letztere und der Hinterleib gegen das Ende hin braun getrübt; alle Beine und Petiolus rötlich gelb. Fühler wie die Grundfarbe, aber an der Basis und der Schaft oben rötlich braun.

Länge: ♂ 18 mm.

Fundort: Formosa (Gyochi nahe Horisha); nur ein ♂ Exemplar wurde von Prof. Dr. S. MATSUMURA gesammelt; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Futaten-namigata-amebachi*.

75. *Henicospilus merdarius* GRAVENHORST

*Ophion merdarius* GRAVENHORST, Ichn. Eur., 111, p. 698, ♀♂ (1829); RATZEBURG, Ichn. Forst., p. 101, ♀♂ (1844).

*Henicospilus merdarius* STEPHENS, Ill. Brit. Ent. Man., VII, p. 126 (1835); THOMSON, Opusc. Ent., p. 1488 (1888); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1433 (1908).

*Henicospilus merdarius* BRIDGMAN-FITCH, Entom., p. 177 (1884); DALLA TORRE, Cat. Hym., 111, p. 182 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 26 (1905); MORLEY, Rev. Ichn., 1, p. 46 (1912); id., Ind. Faun. Hym., 111, p. 389, ♀♂ (1913).

*Henicospilus flavicaput* MATSUMURA et UCHIDA (nec MORLEY), Ins. Matsumurana, 1, p. 72, ♀♂ (1926).

Fundorte: Sachalin (Kiminai, Ōsaka), Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Teshio), Honshu (Saitama, Nikko), Kiushu (der Berg Wakasugi in der Präf. Fukuoka),

Formosa (Musha, Baihara), Okinawa; gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA, H. KUROIWA, K. KIKUCHI, K. YASUMATSU und dem Verfasser. Schmarotzer von *Panolis griseovariegata* GEOG. und *Dianthoecia irregularis aberrans* EV.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Matsukiriga-hoshi-amebachi*.

### Gattung *Allocamptus* THOMSON

*Allocamptus* THOMSON, Opusc. Ent., XII, p. 1186 (1883).

*Cymatoneura* KRIECHBAUMER, Zeit. Hym.-Dipt., p. 22 (1901).

#### 76. *Allocamptus orientalis* sp. nov.

(Taf. VII, Fig. 7)

♀, ♂. Kopf nach hinten deutlich verschmälert, glatt, ziemlich dicht pubescent. Thorax matt; Mesonotum fast glatt; Pleuren dicht fein punktiert; Metathorax mit starker Querleiste, Teil davor spärlich glatt, Teil dahinter dicht quer bis schräg gerunzelt. Schildchen dicht grob punktiert und beiderseits bis zur Spitze gerandet. Flügel deutlich grau, hyalin; Costa schwärzlichbraun; Stigma gelbrot; Nerven rötlich gelb; Discoidalader unter dem Stigma deutlich gekrümmt und an dieser Stelle etwas verdickt; Nervulus antefurcal; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen. Klauen lang gekämmt. Antennen borstenförmig, etwas kürzer als der Körper.

Färbung rötlich gelb und matt. Kopf blassgelb. Antennen gelblich rot. Mesonotum dunkel gelbrot. Beine und die 2 Basalsegmente des Hinterleibs hell gelbrot. Hinterleib gegen das Ende bräunlich gelbrot bis dunkelbraun. Bohrer fast versteckt.

Körperlänge: ♀♂ 22–23 mm.

Fundorte: Okinawa, Formosa (Akô, Baihara); gesammelt in 3 (1 ♂, 2 ♀) Exemplaren von Prof. S. MATSUMURA, K. KIKUCHI und S. HIRAYAMA.

T. N.: *Namisuji-amebachi*.

Diese Art hat eine grosse Ähnlichkeit mit *A. sinuatus* MORL., ist aber in den folgenden Merkmalen ganz verschieden:

1. Stigma im Vorderflügel nicht schwarz.
2. Flügelbasis ohne schwarze Makel.
3. Hinterleib gegen das Ende nicht schwärzlich.
4. Körper kleiner. Antennen kürzer.

TRIBUS **NOTOTRACHINI**Gattung *Nototrachys* MARSHALL*Trachynatus* GRAVENHORST (non LATREILLE), Ichn. Eur., III, p. 713 (1829).*Nototrachys* MARSHALL, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 72 (1872).77. *Nototrachys folicator* FABRICIUSvar. *coreanus* var. nov.

(Taf. V, Fig. 26, ♂)

♀, ♂. Beim Männchen Kopf nach hinten etwas, beim Weibchen kaum aufgetrieben; Kopf spärlich pubescent, glatt; Stirn in der Mitte mit schwacher Längsleiste; Gesicht und Clypeus dicht fein punktiert, der letztere am Vorderrande breit abgerundet; Mandibeln lang und dick, mit 2 ungleichen Zähnen; Palpen dünn. Fühler fadenförmig, schlank und kurz, fast so lang wie halber Körper. Thorax stark gerunzelt, die Runzeln des Mesonotums feiner als die des übrigen Teils; Metathorax netzartig gerunzelt; Schildchen rundlich konvex, deutlich grob gerunzelt, an den Seiten fast bis zur Mitte gerandet; der Raum vor der Schildchengrube glatt und etwas glänzend; das Speculum der Mesopleuren ganz glatt und stark glänzend. Flügel fast hyalin; Stigma und Nerven schwarz; Nervulus interstitial; Nervellus nicht gebrochen. Beine schlank. Hinterleib lederartig, fein pubescent, das erste Segment so lang wie das 2te, das 3te kürzer als das vordere; Bohrer so lang wie das 2te Segment.

Schwarz. Beine grösstenteils und das 4te, 5te und 6te Hinterleibssegment auf der Unterseite gelbbraun. Antennen ganz schwarz. Die Hinterhüften, deren Trochantern und Schenkel schwärzlich.

Länge: ♀♂ 9-11 mm.

Fundort: Korea (Suigen, Shiotsu); gesammelt in 4 (2 ♀, 2 ♂) Exemplaren von S. ITÔ und K. SATÔ.

T. N.: *Amime-amebachi*.

Der Form und Zeichnung nach der Stammform sehr ähnlich, weicht aber durch den ganz schwarz gefärbten Kopf und Thorax ab:

77a. *Nototrachys folicator* FABRICIUSvar. *japonicus* var. nov.

♀, ♂. Der Färbung nach der vorigen Varietät sehr ähnlich, weicht aber wie folgt ab:

1. Die Vorder- und Mittelbeine mehr schwarz, die Hintertarsen

ausgenommen die 2 Endglieder gelblichweiss.

2. Kopf und Thorax ziemlich glänzend.
3. Mesonotum deutlich grob netzartig gerunzelt.
4. Körper viel stärker und grösser.

Länge: ♀ 17 mm; ♂ 13 mm.

Fundorte: Hokkaido (der Berg Moiwa), Honshu (Gifu); gesammelt in 2 (1 ♀, 1 ♂) Exemplaren von U. NAWA und dem Verfasser.

77b. *Nototrachys folicator* FABRICIUS  
var. *formosanus* var. nov.

♀. Unterscheidet sich von der Stammform durch die folgenden Merkmale:

1. Kopf und Thorax ganz schwarz.
2. Alle Hüften an der Basis schwarz; die Hinterbeine mit Ausnahme der Trochantern und die Spitzen der Hüften schwärzlichbraun.

3. Die 2 Basalsegmente des Hinterleibs am Hinterrande und der Petiolus gelbbraun. Länge: ♀ 11 mm.

Fundort: Formosa (Naihonpo); nur ein ♀ Exemplar wurde am 15. Juli 1925 vom Autor gesammelt; das Männchen unbekannt.

## TRIBUS ANOMALONINI

### Übersicht der Gattungen

1. Der erste rücklaufende Nerv mündet in der Mitte der ersten Cubitalzelle. Zähne der Mandibeln deutlich ungleich .....2.  
—Der erste rücklaufende Nerv mündet vor der Mitte der ersten Cubitalzelle. Zähne der Mandibeln fast gleich .....4.
2. Clypeus an der Spitze weit ausgebogen, in der Mitte tief ausgebuchtet, gleichsam zweilappig. Schildchen meist schwarz. Nervellus über der Mitte gebrochen.....*Schizoloma* WESMAEL  
—Clypeus an der Spitze fast abgestutzt oder breit abgerundet .....3.
3. Der hinterste Metatarsus etwa doppelt so lang wie das nächste Glied .....*Exochilum* WESMAEL  
—Der hinterste Metatarsus 4 mal so lang wie das folgende Glied, etwas länger als die übrigen 4 zusammen. Clypeus vorn breit abgerundet. Klauen rechtwinklig gekrümmt .....*Heteropelma* WESMAEL
4. Augen deutlich behaart. Mesonotum ohne deutliche Parapsidenfurchen, dicht runzelig punktiert. Nervellus nicht gebrochen..*Trichomma* WESMAEL  
—Augen nicht behaart .....5.
5. Der 2te rücklaufende Nerv interstitial .....*Acanthostoma* KRIECHBAUMER  
—Der 2te rücklaufende Nerv deutlich hinter dem Cubitalquernerv mündend. .6.
6. Die hintersten Sporen länger als die Breite des Schienenenkes. Nervus

- parallelus emittiert in oder hinter der Mitte der Brachialzelle. Nervellus gebrochen.....7.  
 —Die hintersten Sporen nicht länger als die Breite des Schienenendes. Nervus parallelus emittiert meist über der Mitte der Brachialzelle. Nervellus meist nicht gebrochen .....10.
7. Mesonotum glatt und ziemlich glänzend. Parapsidenfurchen tief, hinten gekerbt.....8.  
 —Mesonotum deutlich punktiert. Parapsidenfurchen schwach oder fehlend. .9.
8. Antennen von etwa  $\frac{2}{3}$  Körperlänge. Nervellus über der Mitte gebrochen. Ocellen klein .....*Habronyx* FÖRSTER  
 —Antennen fast so lang wie der Körper. Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen. Ocellen gross .....*Formosanomalon* gen. nov.
9. Mesonotum vorn quer niedergedrückt. Klauen mehr oder weniger deutlich gekämmt. Stirn mit scharfer Leiste oder Zahn.....*Aphanistes* FÖRSTER  
 —Mesonotum vorn nicht quer niedergedrückt. Klauen nicht gekämmt. Stirn ohne Leiste oder Zahn .....*Anomalon* JURINE
10. Nervellus gebrochen und einen deutlichen Nerv aussendend .....*Labrorychus* FÖRSTER  
 —Nervellus nicht gebrochen .....11.
11. Vorderrand des Clypeus in der Mitte mit feinem Zähnchen. Petiolus nahe dem Ende nicht verdickt .....*Agrypon* FÖRSTER  
 —Vorderrand des Clypeus breit gerundet. Petiolus nahe dem Ende knotig verdickt.....*Gongropelma* ENDERLEIN

Gattung *Schizoloma* WESMAEL

*Schizoloma* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 118 (1849).

*Schizopoma* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 148 (1868).

Übersicht der Arten

1. Beim Männchen der Kopf hinter den Augen nicht oder kaum erweitert .....*amicturnum* FABRICIUS  
 —Beim Männchen der Kopf hinter den Augen deutlich erweitert .....2.
2. Metathorax deutlich netzförmig gerunzelt. Hinterhauptsleiste breit und rundlich ausgerandet. Kleine Art .....*coreanum* sp. nov.  
 —Metathorax nicht netzartig gerunzelt. Hinterhauptsleiste in der Mitte winklig ausgerandet. Grosse Art .....*capitatum* DESVIGNES

78. *Schizoloma amictum* FABRICIUS

(Taf. VII, Fig. 16)

*Ichneumon amictum* FABRICIUS, Syst. Ent., p. 34 (1775).

*Ophion amictum* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 237 (1798).

*Anomalon amictum* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 650, ♀♂ (1829).

*Therion amictum* CHRIST, Brit. Ent., XVI, p. 733, ♂ (1839).

*Schizoloma amictum* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 120, ♀♂ (1849);  
 TOSQUINET, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIII, p. 4, ♂ (1889); (THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 1757, ♀♂ (1892); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 172 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 8 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1463 (1908).

*Schizoloma amicta* MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 67 1913; id., Ind. Faun. Hym., III, p. 404, ♀♂ 1913.

*Habronyx sachalinensis* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 117, Pl. LXVIII, Fig. 6, ♀ 1912.

*Exochilum sachalinense* MATSUMURA, Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., p. 37, ♀ 1925.

*Exochilum sachalinensis* MATSUMURA, Journ. Coll. Agr. Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 26, Pl. IV, Fig. 4, ♀ 1926.

Fundorte: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu, Korea und Formosa; gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. S. MATSUMURA, K. DOI, K. OGUMA, F. SCRIBA, K. TAMANUKI, S. ISSHIKI, S. ARAKAWA, K. FUJII, K. TAKEUCHI, C. TERANISHI und dem Autor. Diese ist sehr häufig in Japan und Schmarotzer von *Dendrolimus allolineatus* MATS. und *Dasychira pudibunda* L.

Sonstige Fundorte: Europa, Sibirien und Indien.

T. N.: *Karafuto-konbô-amebachi*.

78a. *Schizoloma amictum* FABRICIUS  
var. *nigricoxalis* var. nov.

♀. Diese Varietät unterscheidet sich von der Stammform durch die ganz schwarz gefärbten Hüften und die gegen die Basis oben schwärzlich gefärbten Antennen. Länge: ♀ 24-26 mm.

Fundorte: Sachalin (Shimizu), Honshu (Nikko); gesammelt in 4 ♀ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA und dem Verfasser.

78b. *Schizoloma amictum* FABRICIUS  
var. *intermedium* var. nov.

♀, ♂. Sie weicht von der typischen Art in den folgenden Charakteren ab:

1. Antennen an den Basalhälften schwärzlich.
2. Alle Hüften des Weibchens ganz schwarz; beim Männchen aber nur die Hinterhüften schwarz, mit je einem gelben Fleck auf der Unterseite.
3. Die Hinterschenkel des Männchens zum grössten Teil schwarz, aber beim Weibchen rot.
4. Das erste Hinterleibssegment schwarz, auch das Ende des Hinterleibs schwärzlich.

5. Beim Männchen Kopf hinten etwas erweitert.

Länge: ♀♂ 16-28 mm.

Fundorte: Honshu (Yamashiro, Ômi), Kiushu (Kumamoto, Fukuoka); 10 (4 ♀, 6 ♂) Exemplare wurden von H. KAWAMURA, K. YASUMATSU und S. ISSHIKI erbeutet.

79. *Schizoloma coreanum* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 13, ♂)

♀, ♂. Kopf des Männchens hinter den Augen stark erweitert wie bei *S. capitatum* DESV. Kopf dicht und Gesicht zerstreut grob punktiert, des letztere ziemlich stark glänzend; Schläfen poliert. Thorax dicht grob punktiert, die Mesopleuren aber in der Mitte zum Teil glatt und glänzend; Metathorax dicht netzförmig gerunzelt. Beine normal. Hinterleib schlank. Flügel gelblichbraun getrübt; Nerven und Stigma dunkelbraun; Nervulus fast postfurcal; Nervellus ein wenig über der Mitte gebrochen.

Schwarz. Gesicht, Clypeus, Wangen, Mandibeln, innere Augenränder, ein Teil des Scheitels und die äusseren Augenränder grösstenteils rein gelb. Fühler rot, der Schaft unten und gegen die Spitze hin gelblich. Beine rot, die Vorder- und Mittelhüften, deren Trochantern, die hintersten Tarsen mit Ausnahme des ersten Gliedes gelb, die Hinterschienen an den Spitzen schwarz. Hinterleib rot, das 2te Segment auf der Rückenseite schwarz gefleckt.

Fundort: Korea (Suigen, der Berg Kongô); gesammelt in 4 (1 ♀, 3 ♂) Exemplaren von T. KURISUE und K. SATÔ.

T. N.: *Chosen-ô-zu-amebachi*.

Diese Art hat eine grosse Ähnlichkeit mit *S. amictum* F., wohl auch mit *S. capitatum* DESV., unterscheidet sich jedoch von der ersteren durch den hinter den Augen stark erweiterten Kopf und von der letzteren durch den netzförmig gerunzelten Metathorax und die in der Mitte nicht winkling ausgerandete Hinterhauptsleiste.

80. *Schizoloma capitatum* DESVIGNES

*Schizoloma capitatum* DESVIGNES, Cat. Brit. Ichn., p. 104, ♂ (1856); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 8 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1463 (1908).

*Exochilum (Anomalon) capitatum* BRIDGMAN, Trans. Nnt. Soc. Lond., p. 344, ♂ (1886).

*Schizoloma bucephalum* BRAUNS, Arch. Nat. Meckl., p. 71, ♂ (1898).

*Exochilum capitatum* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 153 (1901).

*Schizoloma capitata* MORLEY, Brit. Ichn., V., p. 228, ♀♂ (1913); id., Rev. Ichn., II, p. 67 (1913); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 403, ♀♂ (1913).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Teshio). Honshu (Aomori, Echigo); gesammelt in 5 (1 ♀, 4 ♂) Exemplaren von Prof. S. MATSUMURA, I. NITOBE, M. NAKAMURA und dem Autor.

Sonstige Fundorte: Europa und Indien.

T. N.: *Ô-zuu-mebachi*.

### Gattung *Exochilum* WESMAEL

*Exochilum* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 121 (1849).

#### 81. *Exochilum circumflexum* LINNÉ

*Ichneumon circumflexus* LINNÉ, Syst. Nat., Ed. 10, p. 533 (1758); FABRICIUS, Syst. Ent., p. 341 (1775).

*Ophion circumflexum* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 233 (1793).

*Ichneumon ramidulus* CHRIST, Naturg. Ins., p. 357 (1791).

*Anomalon circumflexum* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 643, ♀♂ (1829).

*Exochilum circumflexum* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 122 (1849); THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 1759, ♀♂ (1892); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 153 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 8 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1464 (1908); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 76 (1913); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 410, ♀♂ (1913).

*Anomalon missouriense* CAMERON, Manch. Mem., p. 26 (1897).

*Anomalon japonicum* CAMERON, Entom. p. 93 (1906).

*Exochilum laricis* MATSUMURA, Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., p. 36, ♀ (1925); id., Jour. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 25, Pl. IV, Fig. 3, ♀ (1926).

Fundorte: Verbreitet durch fast ganz Japan. Diese Schmarotzt in der Larve von *Dendrolimus albolineatus* MATS.

Sonstige Fundorte: Europa, Nord-Afrika, Sibirien, Palästina, Indien und Assam, T. N.: *Matsu-yadori*.

#### 81a. *Exochilum circumflexum* LINNÉ

var. *dendrolimi* MATSUMURA

*Exochilum dendrolimi* MATSUMURA, Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., p. 36, ♀ (1925).

*Exochilum dendrolimusi* MATSUMURA, Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 25, Pl. IV, Fig. 2, ♂ (non ♀) (1926).

Fundorte: Sachalin (Konuma), Kurilen; gesammelt in 2 ♂ Exemplaren von K. TAMANUKI und S. HARADA; das Weibchen noch nicht bekannt. Sie schmarotzt in der Larve von *Dendrolimus albolineatus* MATS.

#### 81b. *Exochilum circumflexum* LINNÉ

var. *nipponicum* var. nov.

♀, ♂. Sie unterscheidet sich von der Stammform in den folgenden Merkmalen:

1. Das erste Segment des Hinterleibs in den beiden Geschlechtern mehr oder weniger schwarz gefleckt.
2. Beim Männchen alle Hüften ganz schwarz.
3. Beim Männchen Gesicht beiderseits schwarz.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Jōzankei), Honshu (Tōkio, Shizuoka, Gifu, Kioto, Ōsaka), Shikoku (Ehime); gesammelt in zahlreichen

♀♂ Exemplaren von S. ARAKAWA, C. TERANISHI, M. YANAGIWARA, M. OGATA und dem Verfasser.

81c. *Exochilum circumflexum* LINNÉ  
var. *nigroscutellata* HELLÉN

*Exochilum circumflexum* LINNÉ var. *nigroscutellata* HELLÉN, Act. Soc. Faun. et Flor. Fennica, 56, 6, p. 15, ♂ (1926).

Fundorte: Sachalin (Furumaki), Hokkaido (Otaru, Garugawa, Aoyama); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren vom Verfasser.

Sonstiger Fundort: Europa.

81d. *Exochilum circumflexum* LINNÉ  
var. *rufomaculatum* var. nov.  
(Taf. VI, Fig. 15, ♀)

♀, ♂. Sie weicht von der Stammform in den folgenden Charakteren ab:

1. Beim Männchen die Hüften an den Basalhälften rot.
2. Meso- und Metapleuren mit je einem grossen roten Fleck; die Suturen zwischen dem Meso- und Metathorax rot.
3. Beim Weibchen das Gesicht ganz gelb.
4. Hinterleib an der Spitze nicht ganz schwarz, aber auf der Rückenseite und beiderseits mit je einer schwarzen Linie.

Fundorte: Formosa (Horisha, Gyochi, Tarowan, Tamaho, Bai-bara), Shikoku (Matsuyama), Kiushu (Fukuoka); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, S. SAITÔ, K. KIKUCHI, K. FUJII, K. YASUMATSU und dem Verfasser.

Gattung *Heteropelma* WESMAEL

*Heteropelma* WESMAEL, Bull. Ac. Belg., XVI, p. 119 (1849).

Übersicht der Arten

Antennen viel kürzer als der Körper ..... *calcator* WESMAEL  
- Antennen so lang wie der Körper..... *fulvitarso* CAMERON

82. *Heteropelma calcator* WESMAEL

*Anomalon xanthops* GRAVENHORST (non SCHRANK), Ichn. Eur., III, p. 652, ♀ (non ♂) (1829).

*Heteropelma calcator* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 120, ♀ (1849); THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 1758, ♀♂ (1892); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 157 (1901), SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 7 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1461 (1908); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 69 (1913); id., Ind. Faun. Hym., III, p. 406, ♀♂ (1913).

*Heteropelma reticulatum* CAMERON, Manch. Mem., p. 110 (1899).

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa, Furumaki), Hokkaido (Garugawa), Honshu (Ômi), Korea (Onseiri); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, T. KURISUE, C. TERANISHI und dem Verfasser.

Sonstige Fundorte: Europa, Sikkim und Assam.

T. N.: *Yubinaga-amebachi*.

82a. *Heteropelma calcator* WESMAEL

var. *flaviscutellum* var. nov.

♀, ♂. Sie weicht von der typischen Art wie folgt ab:

1. Schildchen ganz gelb.

2. Hinterleib rot, nur das Ende leicht verdunkelt.

Länge: ♀♂ 16–18 mm.

Fundorte: Hokkaido (Jôzankei), Formosa (Koshun); gesammelt in 2 (1 ♂, 1 ♀) Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA und dem Autor.

82b. *Heteropelma calcator* WESMAEL var. *elongatum*

var. nov. (Taf. V, Fig. 16, ♀)

♀, ♂. Diese Varietät unterscheidet sich von der typischen Art in den folgenden Merkmalen:

1. Die Vorderhüften ganz gelb.

2. Die Mittel- und Hinterhüften ganz rot.

3. Die Länge des Körpers viel länger als die der typischen Art.

4. Antennen ganz rötlich.

Fundorte: Honshu (Ôsaka, Tôkio), Shikoku (Iyo), Kiushu (Fukuoka); gesammelt in 4 (1 ♂, 3 ♀) Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA, K. YASUMATSU und S. ARAKAWA.

83\*. *Heteropelma fulvitarse* CAMERON

*Heteropelma fulvitarse* CAMERON, Manch. Mem., p. 111, ♀ (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 157 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 7 (1905); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 70 (1913).

*Heteropelma fulvitas* MORLEY, Ind. Faun. Hym., III, p. 407, ♀♂ (1913).

Fundort: Formosa (Arisan).

Sonstige Fundorte: Assam und Burma.

T. N.: *Kiashi-yubinaga-amebachi*.

Gattung *Trichomma* WESMAEL

*Trichomma* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 119 (1849).

Übersicht der Arten

Körper und Fühler schwarz ..... *enecator* Rossi  
 – Körper blutrot. Kopf ganz gelb. Antennen gelbrot.. *cnaphalocrocis* sp. nov.

84. *Trichomma enecator* WESMAEL

*Ichneumon enecator* WESMAEL, Faun. Etr., II, p. 43 (1790).

*Anomalon enecator* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 641, ♀♂ (1829).

*Therion enecator* CURTIS, Brit. Ent., XVI, p. 736 (1839).

*Trichomma enecator* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 137, ♀♂ (1849); THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 1772, ♀ (1892); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 173 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Zeit. Hym.-Dipt., II, p. 364, ♀♂ (1902); KRIEGER, Zeit. Hym.-Dipt., IV, p. 165, ♀♂ (1904); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 6 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1467 (1908); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 64 (1913).

*Trichomma ruficoxis* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Rheinl., XVII, p. 149, ♀ (1860).

Fundort: Honshu (Yamaguchi); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von K. MIYOSHI; das Männchen noch nicht aufgefunden.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Onaga-hoso-amebachi*.

85. *Trichomma encephalocrocis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 20, ♀)

♀, ♂. Kopf stark glänzend und glatt, hinter den Augen kaum verschmälert; Gesicht nach unten deutlich verengt, glänzend, spärlich fein punktiert und filzig weiss pubescent; Clypeus glatt und glänzend, am Vorderrande in der Mitte mit schwachen Zähnchen; Wangen fehlend; Mandibeln dick, mit zwei gleichen kräftigen Zähnen. Antennen fadenförmig, so lang wie der Vorderflügel. Schildchen etwas erhöht, oben leicht eingedrückt, an den Seiten bis zum Ende gerandet, fein punktiert. Thorax ganz matt; Mittelbrustseiten dicht grob längsgerunzelt; Mesonotum dicht unregelmässig gerunzelt, aber beiderseits zum Teil dicht punktiert; Metathorax dicht netzförmig gerunzelt, in der Mitte längsgefurcht. Flügel hyalin; Stigma und Nerven gelbbraun; Nervulus interstitial und vertikal; Nervellus schief, nicht gebrochen. Hintertrochanter mehr als 2 mal so lang wie der Trochantellus, dessen Schenkel gegen die Spitzen verdickt. Hinterleib lang, stark komprimiert; Bohrer fast so lang wie das erste und 2te Segment zusammen.

Blutrot. Kopf, Gesicht, Mandibeln ausgenommen die Endzähne, Palpen, Schaft unten, Schildchen, Tegulae, Propleuren, ein Makel unter dem Flügel, alle Hüften, die Vorder- und Mitteltrochantern und der Hintertrochantellus rein gelb; Stirn und der Raum zwischen den Nebenaugen von der Grundfarbe, der letztere in seltenen Fällen schwärzlich; Fühler, Beine und Hinterleib gelbbrot, aber das erste Segment des letzteren oben und der Bohrer schwarz; die Hinterschienen zuweilen am Ende verdunkelt. Länge: ♀♂ 10-14 mm.

Fundort: Formosa (Tainan, Shinka, Akô, Giran, Taihoku); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, Dr. T. SHIRAKI und S. TAKANO. Sie ist Parasit in der Larve von *Cnaphalocrocis medinalis* GUEN.

T. N.: *Kobunomeiga-yadori*.

### Gattung *Acanthostoma* KRIECHBAUMER

*Acanthostoma* KRIECHBAUMER, Ber. Naturf. Ges. Leipzig, p. 129 (1894).

#### 86. *Acanthostoma insidiator* SMITH

(Taf. VII, Fig. 13)

*Anomalon insidiator* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 396, ♀ (1874); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 166 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 11 (1905).

*Acanthostoma japonicum* KRIECHBAUMER, Ber. Naturf. Ges. Leipzig, p. 130, ♀♂ (1894); SCHMIEDEKNECHT, Zeit. Hym.-Dipt., I, p. 6 (1901); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 160 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichth., p. 1499, ♀♂ (1908).

*Habronyx japonicum* SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 10, Pl. I, Fig. 6, ♀ (1905); MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 110, Pl. XLVII, Fig. 12, ♀ (1912); NAWA, Ins. World, Gifu, XVI, p. 494 (1912); id., Ins. World, Gifu, XIX, p. 149 (1915).

*Acanthostoma insidiator* SONAN, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIV, p. 98, ♀♂ (1924).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Jôzankei), Honsbu (Kanazawa, Tôkio, Gifu, Ôsaka, Yokohama, Tochigi, Miye, Saitama), Shikoku (Iyo), Kiushu (Ôita), Korea (Choanji); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, S. ARAKAWA, T. UYE, H. TAKABAYASHI, M. TANAKA, S. HIRAYAMA und dem Autor. Sie schmarotzt in den Larven von *Dictyoploca japonica* MOOR., *Anthaerea pernyi* GUER., *A. yamamai* GUER. und *Caligula boisdavalii* EDER.

T. N.: *Konbô-amebachi*.

### Gattung *Habronyx* FÖRSTER

*Habronyx* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XVII, p. 145 (1860).

#### 87. *Habronyx heros* WESMAEL

var. *matsukemushii* MATSUMURA

*Habronyx matsukemushii* MATSUMURA, Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., 37, ♀ (1925); id., Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univer., XVIII, p. 26, Pl. IV, Fig. 5, ♀ (1926).

Fundort: Kurilen; gesammelt in 3 (1 ♂, 2 ♀) Exemplaren von S. HARADA. Parasit von *Dendrolimus albolineatus* MATS.

### Gattung *Formosanomalon* gen. nov.

Kopf hinten ziemlich aufgetrieben, hinter den Augen aber ein wenig rundlich verschmälert; Stirn in der Mitte mit feiner Längs-

leiste; Ocellen sehr gross, aber nicht an die Augen stossend; Clypeus vorn in der Mitte mit kleinem Zähnchen; Augen gross, innen an der Fühlerbasis schwach ausgerandet; Mandibeln mit 2 gleichen Zähnen. Antennen so lang wie der Körper. Parapsidenfurchen deutlich tief, hinten gekerbt; Schildchen konvex, an den Seiten nicht gerandet. Nervulus hinter der Gabel und etwas postfurcal; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen, der erste rücklaufende Nerv hinter dem Cubitalquernerv mündend; Nervus parallelus emittiert aus der Mitte der Brachialzelle. Klauen an der Basis kurz gekämmt.

Genotype: *Formosanomalon baibarensis* UCHIDA.

Diese Gattung ähnelt *Habronyx* FÖRSTER, unterscheidet sich von ihr aber in den folgenden Merkmalen:

1. Nebenaugen deutlich gross.
2. Fühler so lang wie der Körper.
3. Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen.

88. *Formosanomalon baibarensis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 14, ♂)

♂. Kopf hinten etwas aufgetrieben, aber hinter den Augen rundlich verschmälert; Ocellen sehr gross; Augen innen an der Basis des Fühlers schwach ausgerandet; Stirn rauh; Gesicht dicht, Clypeus zerstreut punktiert; Mandibeln kräftig, mit 2 gleichen Zähnen. Pro- und Mesothorax glatt, mit schwachem Glanz; Parapsidenfurchen deutlich tief, hinten crenuliert; Schildchen ziemlich stark rundlich erhaben, glänzend, grob punktiert und an den Seiten nicht gerandet. Metathorax auffallend dicht grob netzförmig gerunzelt, hinten in der Mitte mit einer breiten, schwachen Längsfurche, seine Luftlöcher oval. Beine schlank; der Hintertrochanter fast so lang wie der Trochantellus. Flügel gelb getrübt; Stigma normal, rot; Nerven braun. Hinterleib komprimiert.

Schwarz. Schläfen, Schildchen, Postschildchen, die Suturen des Thorax und der Metathorax an der Spitze dunkelrot. Fühler, Beine und Hinterleib vorwiegend gelbrot; die Vorder- und Mittelschienen und alle Tarsen gelblich, die Hinterschienen an den Spitzen schwärzlich, das 2te Segment des Hinterleibs auf der Rückenseite schwarz. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Palpen und Schaft unten rein gelb, aber die Mandibelzähne ganz schwarz. Länge: ♂ 25 mm.

Fundort: Formosa (Baibara); gesammelt von R. SARTÔ und K. KIKUCHI; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Taiwan-medaka-amebachi*.

### Gattung *Aphanistes* FÖRSTER

*Aphanistes* FÖRSTER, Verh. Naturf. Preuss. Rheinl., XXV, p. 145 (1868).

#### Übersicht der Arten

1. Schildchen gelb ..... *jozankeanus* MATSUMURA  
—Schildchen schwarz ..... 2.
2. Metathorax grösstenteils rot, dicht grob netzförmig gerunzelt, der Länge nach ausgehöhlt, an der Basis in der Mitte mit 2 kurzen kräftigen Längskielen ..... *orientalis* sp. nov.  
—Metathorax grösstenteils schwarz, nur am Ende rot, dicht fein netzförmig gerunzelt, ohne Längskiel ..... 3.
3. Fühler ganz rot ..... *bellicosus* WESMAEL  
—Fühler an der Basis und der Schaft oben schwarz ..... *kankonis* sp. nov.

#### 89. *Aphanistes jozankeanus* MATSUMURA

*Habronyx jozankeanus* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 118, Pl. XLVIII, Fig. 8, ♀ (1912); id., Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., p. 33 (1925); id., Journ. Coll. Agr. Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 27, ♀ (1923).

Fundort: Hokkaido (Jōzankei, Sapporo, Moiwa, der Berg Daisetsu); gesammelt in 4 Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA und dem Verfasser. Schmarotzer von *Dendrolimus albolineatus* MATS.

T. N.: *Jōzan-konbo-amebachi*.

#### 89a. *Aphanistes jozankeanus* MATSUMURA

var. *nigricans* var. nov.

♀, ♂. Diese Varietät hat viele Ähnlichkeit mit der Stammform, unterscheidet sich aber von ihr durch das schwarze Schildchen.

Länge: ♀♂ 15–19 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo), Honshu (Shimauchi in der Präf. Nagano); gesammelt in 4 (2 ♀, 2 ♂) Exemplaren von H. KŌNO und dem Autor.

#### 90. *Aphanistes orientalis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 15, ♀)

♀. Kopf nach hinten verschmälert und hinter den Augen nicht erweitert, dicht grob punktiert; Stirn unregelmässig dicht grob quengerunzelt, in der Mitte mit scharfer Leiste, welche von oben betrachtet als spitzes Zähnchen vortritt; Gesicht dicht fein punktiert; Clypeus in der Mitte des Endrandes zahnartig zugespitzt; Mandibeln ziemlich kräftig, mit 2 gleichen Zähnen; Wangen kurz; Schläfen

breit, zerstreut punktiert. Antennen etwas länger als der Vorderflügel. Mesonotum bedeutend dicht grob punktiert; Parapsidenfurchen kaum angedeutet; Schildchen flach gewölbt, auf der Scheibe ziemlich stark ausgerandet, an den Seiten nicht gerandet; die Punktierung der Pro- und Mesopleuren dichter und feiner als die des Mesonotums; Metathorax netzförmig gerunzelt, der Länge nach ausgehöhlt, an der Basis in der Mitte mit 2 Längskielen. Flügel tief gelb getrübt; Stigma und Tegulae gelbrot; Nerven braun; Basalnerv weit hinter der Gabel, etwas antefurcal; Nervellus hinter der Mitte gebrochen. Beine lang, besonders die hintersten; Klauen gekämmt; die Hintertarsen etwas verdickt.

Schwarz und matt. Gesicht, Clypeus, Mandibeln mit Ausnahme der Zähne, die beiden Palpen, Schaft ganz, Schläfen zum grössten Teil, ein Fleck auf jeder Seite des Scheitels und die Vorderhüften und -trochantern rein gelb; Thorax ganz matt; Schulter, Hals oben, die Suturen des Thorax, Metapleuren ganz und Metathorax an der Spitze rot; die Vorder- und Mittelbeine rötlichgelb, die Hintertarsen gelb, die Mittelhüften, die Hinterschenkel und -schielen, sowie auch der Hinterleib rot, die Hinterhüften grösstenteils, deren Schienen am Ende und das 2te Hinterleibssegment auf dem Rücken schwarz; Bohrer deutlich vorragend, rein gelb. Antennen rot, einige Basalgeisselglieder nur oben schwarz.

Länge: ♀ 24–27 mm.

Fundorte: Sachalin (Kawakami), Hokkaido (Jôzankei), Korea (Shakôji); gesammelt in 5 ♀ Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA und dem Verfasser; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Sakiaka-konbô-amebachi*.

90a. *Aphanistes orientalis* UCHIDA

var. *asahidakeanus* var. nov.

♀. Sie unterscheidet sich von der typischen Art in den folgenden Merkmalen:

1. Schildchen ganz gelblich rot, oben schwach eingedrückt.
2. Metathorax und die Hinterhüften vollständig rot.

Länge: ♀ 25 mm.

Fundort: Hokkaido (der Berg Daisetsu); gesammelt am 5. August 1926 vom Autor; das Männchen noch nicht aufgefunden.

91. *Aphanistes bellicosus* WESMAEL

*Anomalon bellicosus* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., p. 124, ♀ (1849).

*Anomalon (Aphanistes) bellicosus* BRISCHKE, Schrift. Nat. Ges. Dan. N. F., IV, p. 135, ♀ (1880); THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 176, ♀ (1892).

*Aphanistes wesmaelii* BRISCHKE (non HOLMGREN), Schrift. Nat. Ges. Dan. N. F., IV, p. 135, ♀ (1880).

*Aphanistes bellicosus* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 155 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1474 (1903).

Fundorte: Nord-Sachalin (Niwo), Hokkaido (Moiwa, Tomakomai), Honshu (To-wada in der Präf. Aomori, Nikko); gesammelt in zahlreichen ♀ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, E. KINOSHITA, H. KÔNO, K. TAMANUKI und dem Verfasser.

Sonstige Fundorte: Europa und Asien.

T. N.: *Motoaka-konbô-amebachi*.

92. *Aphanistes kankonis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 23, ♀)

♀. Grundfarbe matt, schwarz. Scheitelpunkte neben den Augen, Gesicht, Clypeus, Mandibeln, die beiden Palpen, Schläfen zum Teil und die Vorderhüften rein gelb; Schaft und die Vorder- und Mittelbeine gelbrot; die Hinterbeine, Hinterleib und Metathorax am Ende rot; das 2te Segment des Hinterleibs auf der Rückenseite und die Hinterschienen am Ende schwarz. Antennen rot, an der Basis schwarz, gegen das Ende rötlichgelb. Hinterschienen rötlichgelb. Flügel dunkelgelb getrübt; Stigma und Tegulen gelbrot.

Kopf und Thorax deutlich dicht punktiert, ganz matt; Stirn gerunzelt, in der Mitte mit scharfer Leiste; Gesicht fein punktiert, etwas glänzend; der Vorderrand des Clypeus in der Mitte deutlich zugespitzt. Antennen kaum länger als der Vorderflügel. Parapsiden fehlt ganz; Schildchen auf der Scheibe eingedrückt, beiderseits nicht gerandet; Metathorax dicht gerunzelt, die Spirakeln desselben rundlich. Beine schlank, nur die Hintertarsen verdickt. Bohrer vorstehend.

Fundort: Formosa (Kankô, Tompo); gesammelt in 3 ♀ Exemplaren vom Autor; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Kankô-hoso-amebachi*.

Gattung *Anomalon* JURINE

*Anomalon* JURINE, Nouv. Méth. Class. Hym., p. 114 (1807).

## Übersicht der Arten

1. Kopf und Thorax auffallend dicht weiss behaart. Die Spirakeln des ersten Hinterleibssegmentes deutlich vorspringend.....*moivanum* sp. nov.

- Kopf und Thorax nicht auffallend behaart. Die Spirakeln des ersten Hinterleibssegmentes nicht vorspringend .....2.
- 2. Schildchen fach und an den Seiten schwach gerandet. *garugawense* sp. nov.  
-Schildchen konvex und an den Seiten deutlich gerandet.....3.
- 3. Schildchen rot .....*hirayamaeum* sp. nov.  
-Schildchen schwarz.....*yanagiwaraeum* sp. nov.

93. *Anomalon moiwanum* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 19, ♂)

♂. Kopf und Thorax dicht weiss pubescent, der erstere quer, hinten breit ausgerandet; Scheitel und Stirn dicht runzelig; Schläfen dicht grob punktiert; Gesicht und Clypeus dicht fein punktiert, das letztere vorn in der Mitte mit Zähnchen; Mandibeln kräftig. Fühler von halber Körperlänge, das erste Geisselglied etwas länger als das 2te und 3te zusammen. Mesothorax deutlich dicht grob punktiert, fast matt; Schildchen konvex, an den Seiten nur an der Basis gerandet, grob punktiert, ziemlich lang und braun behaart; Metathorax unregelmässig dicht gerunzelt. Flügel fast hyalin; Nerven und Stigma gelb; Cubitalquernerv interstitial; Nervulus etwas postfurcal; Nervellus hinter der Mitte gebrochen. Luftlöcher des ersten Hinterleibssegmentes deutlich vorspringend. Beine sehr schlank.

Matt und schwarz. Gesicht, Clypeus, Mandibeln mit Ausnahme der Endzähne, Palpen, die Unterseite des Schaftes, Pedicellus, Annelus und an der Basis des ersten Geisselgliedes rein gelb; Beine vorwiegend rot; die Vorderhüften ganz, die mittleren an den Spitzen, die Vorder- und Mitteltrochantern, deren Schenkel vorn, Schienen und Tarsen ganz gelblich, die Hintertrochantern und -tarsen gelbrot, deren Hüften auf der Unterseite zum Teil gelb, deren Tarsen an den Spitzen schwärzlich. Hinterleib grösstenteils rot; der Rücken des 2ten Segmentes zum Teil, das 6te zum grössten Teil, das 7te und die Genitalklappen ganz schwarz. Antennen rot, an der Basis schwarz und gegen die Spitzen zu verdunkelt. Länge: ♂ 15 mm.

Fundort: Hokkaido (Moiwa); gesammelt von Prof. Dr. S. MATSUMURA.

T. N.: *Moiwa-konbô-amebachi*.

Der Form und Färbung nach *A. ruficornis* SZÉPL. sehr ähnlich, aber die Hinterhüften und -trochantern nicht ganz schwarz und die Behaarung des Körpers dichter und weiss.

94. *Anomalon hirayamaeum* sp. nov.

♀. Kopf und Thorax ganz matt, dicht punktiert, aber der Metathorax netzförmig gerunzelt. Kopf hinten breit abgebuchtet; Schläfen breit; Gesicht dicht fein punktiert; Clypeus vorn in der Mitte mit Zähnen; Stirn gerunzelt. Antennen fast von der halben Körperlänge, mässig dick. Schildchen ziemlich stark rundlich erhaben, an den Seiten gerandet, die Punktierung desselben gröber als die des Thorax; Parapsidenfurchen fehlen. Flügel gelblich hyalin; Stigma und Nerven gelbrot; Nervulus weit hinter der Gabel, postfurcal; Nervellus in der Mitte gebrochen. Beine und Hinterleib normal.

Schwarz. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Palpen und Schaft unten gelb, die hinteren Augenränder von den Wangen bis zum Scheitel schmal rot gesäumt. Fühler rot, oben an der Basis schwarz, am Ende verdunkelt. Beine rot; die vorderen zum Teil gelb; die Hinterhüften an der Basis schwarz, deren Schienen am Ende verdunkelt. Schildchen ganz, Tegulen, die Suturen des Thorax und die Spitze des Metathorax rot. Hinterleib rot, der Rücken des 2ten Segmentes und die übrigen allerseits schwärzlich. Bohrer ziemlich weit vorragend, gelb. Länge: ♀ 18 mm.

Fundort: Honshu (Komaba); gesammelt am 4. November 1911 von S. HIRAYAMA.

T. N.: *Hirayama-kobane-amebachi*.

95. *Anomalon garugawense* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 5, ♀)

♀. Kopf hinter den Augen verengt, die Hinterhauptsleiste ausgerandet; Stirn dicht gerunzelt, mit erhabener Linie; der Vorder- rand des Clypeus in der Mitte in eine Spitze ausgezogen; Gesicht mit dichter und feiner Punktierung; Mandibeln kräftig. Antennen fast so lang wie der halbe Körper, mässig dick. Thorax etwas schmaler als der Kopf, mit dichter Punktierung; Metathorax genetzt. Schildchen flach, an den Seiten schwach gerandet. Die Hintertarsen nur wenig verdickt; Klauen kaum gekämmt. Flügel bräunlichgelb getrübt; Stigma und Tegulen gelblichrot. Rücklaufender Nerv hinter dem Cubitalquernev; Nervellus etwas hinter der Mitte gebrochen. Hinterleib glatt und glänzend. Legescheide gelbrot.

Schwarz und matt. Äussere Augenränder ganz rot; Gesicht,

Clypeus, Mandibeln mit Ausnahme der Spitzen und die beiden Palpen gelb. Fühler ganz gelbrot, Pedicellus oben schwärzlich. Beine rot; die Vorder- und Mittelschienen und alle Tarsen gelb, an der Basis des Hintermetatarsus rötlich, die Hinterschienen an den Spitzen schwarz. Thorax von der Grundfarbe, die Suturen und die Spitze des Metathorax schmutzigrot. Hinterleib rot; der Rücken des 2ten Segmentes nur in der Mitte und das 6te oben ganz schwärzlich.

Länge: ♀ 16 mm.

Fundort: Hokkaido (Garugawa, Teshio); gesammelt vom Autor; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Garugawa-kobane-amebachi*.

Der Form und Färbung nach *A. procerum* GRAV. aus Europa etwas ähnlich.

96. *Anomalon yanagiwaraeum* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 4, ♀)

♀. Kopf ein wenig breiter als der Thorax, hinter den Augen nicht verschmälert, sondern auffallend breit, Hinterhauptskante völlig abgerundet; Kopf dicht runzelig punktiert; Stirn flach, querrunzelig, in der Mitte mit schwacher erhabener Linie; Ocellen klein; Gesicht dicht punktiert und gelblich pubescent; Clypeus vorn in der Mitte zahnartig zugespitzt; Mandibeln kräftig, zweizählig. Fühler etwas länger als der halbe Körper. Mesonotum mit dichter grober Punktierung; Pro- und Mesopleuren dicht fein runzelig punktiert; Metathorax dicht genetzt, die Luftlöcher länglich elliptisch. Schildchen flach gewölbt, an den Seiten fast ganz gerandet. Hinterleib ziemlich glatt. Beine normal, die Hintertarsen etwas verdickt; Klauen nicht gekämmt. Flügel gelbbraun getrübt; Stigma und Nerven gelbrot; rücklaufender Nerv etwas hinter dem Cubitalquernerv; Nervellus hinter der Mitte gebrochen.

Schwarz. Kopf matt schwarz. Äussere Augentränder oben dunkelrot; Gesicht, Clypeus und Mandibeln mit Ausnahme der Spitzen gelbbraun; Palpen gelb. Fühler gelbrot, gegen die Spitze hin verdunkelt, der Schaft unten gelblichrot. Beine rot; alle Hüften blutrot, an der Basis aber schwärzlich verdunkelt, die Vorder- und Mittelschienen und alle Tarsen gelb, die Basis des hintersten Metatarsus aber rötlich und die Schienen an den Spitzen schwärzlich. Mesonotum glänzend. Hinterleib rot, der Rücken des 2ten Segmentes und die Endsegmente vom 5ten bis zum letzten schwärzlich.

Länge: ♀ 18 mm.

Fundort: Honshu (der Berg Ibuki in der Präf. Gifu); gesammelt am 13. Mai 1925 in nur einem ♀ Exemplare von M. YANAGIWARA; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Yanagiwara-kobane-amebachi*.

### Gattung *Labrorynchus* FÖRSTER

*Labrorynchus* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 146 (1868).

#### Übersicht der Arten

1. Kopf und Körper grösstenteils rot.....*nikunii* sp. nov.  
—Kopf und Körper grösstenteils schwarz .....
2. Parapsidenfurchen ganz fehlend. Mesopleuren grob punktiert, glänzend.  
Das 2te Hinterleibssegment ganz rot .....*nikkonis* sp. nov.  
—Parapsidenfurchen schwach angedeutet. Mesopleuren dicht gerunzelt. Das  
2te Hinterleibssegment auf dem Rücken schwarz gefleckt ..*yezonis* sp. nov.

#### 97. *Labrorynchus nikunii* sp. nov.

♀. Körper zum grössten Teil rot, dicht gelblich behaart. Kopf hinten nicht verengt, glatt; Stirn grob gerunzelt; Gesicht fein runzlig; Clypeus in der Mitte des Vorderrandes schwach zahnartig vorragend; Mandibeln dick, zweizähmig. Antennen von der halben Körperlänge. Thorax robust, breiter als der Kopf, deutlich dicht punktiert; Parapsidenfurchen fehlend; Schildchen rundlich konvex, grob runzlig; Metathorax grob netzartig gerunzelt, hinten kaum ausgehöhlt. Flügel gelb getrübt; Nerven und Stigma gelb; Nervellus in der Mitte gebrochen; Nervulus hinter der Gabel, etwas postfurcal. Beine schlank. Hinterleib lang, fast 3 mal so lang wie Kopf und Thorax zusammen; das 2te Segment länger als das erste, am Ende des letzteren deutlich erweitert. Bohrer vorragend.

Rot. Stemmaticum, Mandibelzähne, die Hinterschienen am Ende und das Hinterleibsende verdunkelt; Gesicht, Mandibeln, Wangen, Clypeus, die Vorder- und Mittelhüften, Trochantern, Schienen und Tarsen, Schildchen, Tegulen und Metathorax gelblichrot.

Länge: ♀ 18 mm.

Fundort: Honshu (Yamashiro); gesammelt von S. NIKUNI; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Nikuni-kobane-amebachi*.

98. *Labrorynchus nikkonis* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 17, ♂)

♂. Kopf hinten etwas aufgetrieben, kaum glänzend; Stirn grob, Scheitel fein, gerunzelt; Gesicht sehr fein runzelig; Schläfen zerstreut punktiert; Clypeus am Vorderrande in der Mitte deutlich zahnartig zugespitzt. Antennen länger als der Körper, das erste Geißelglied etwas länger als die 2 folgenden zusammen. Thorax matt; Mesonotum vorn und beiderseits punktiert, hinten in der Mitte dicht gerunzelt; Mesopleuren grob punktiert, glänzend; Schildchen stark rundlich erhaben, grob gerunzelt; Metathorax deutlich dicht netzförmig gerunzelt. Flügel hyalin; Stigma rot; Nerven gelbrot; Nervellus in der Mitte gebrochen. Beine normal, die Hintertarsen etwas verdickt. Hinterleib länglich, fast 3 mal so lang wie Kopf und Thorax zusammen.

Schwarz. Gesicht, Clypeus, Mandibeln zum Teil, Schaft unten, externe Augentränder zum Teil, ein Fleck auf jeder Seite des Scheitels, Schildchen an der Spitzenhälfte, die Vorder- und Mittelhüften, deren Trochantern, Schienen, Tarsen und die Hintertarsen gelb; Tegulen, Beine und Hinterleib rot, die Hinterschienen an den Spitzen und am Ende des Hinterleibs schwarz. Fühler rot, aber an der Basis oben schwärzlich. Länge: ♂ 18 mm.

Fundort: Honshu (Nikko); gesammelt von Prof. Dr. S. MATSUMURA; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Nikkô-kobane-amebachi*.

99. *Labrorynchus yezonis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 27, ♂)

♂. Kopf quer, nach hinten schwach aufgetrieben, hinter den Augen etwas rundlich verengt; Stirn und Scheitel runzelig; Schläfen spärlich punktiert; Gesicht und Clypeus fein runzelig, der letztere vorn abgerundet, das erstere filzig weiss pubescent. Fühler länger als die halbe Körperlänge. Mesonotum fein runzelig punktiert; Parapsidenfurchen schwach angedeutet; Schildchen stark konvex, grob gerunzelt; Mesopleuren deutlich dicht fein runzelig, matt; Metathorax grob unregelmässig gerunzelt und in der Mitte der Länge nach schwach ausgehöhlt. Beine normal, die Hintermetatarsen kaum verdickt.

Schwarz und matt. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Schaft unten,

ein Fleck beiderseits des Scheitels, die Vorderbeine mit Ausnahme der Schenkel rein gelb; Schildchen mit kleinem gelbem Makel. Beine und Hinterleib grösstenteils rot; die Hinterhüften zum Teil, am Rücken des 2ten Hinterleibssegments und am Ende des Hinterleibs schwarz. Die Suturen des Thorax dunkelrot. Fühler rot, oben und am Ende bräunlich, gegen die Basis schwärzlich. Länge: ♂ 12-14 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); gesammelt in 3 ♂ Exemplaren vom Verfasser; das Weibchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Yezo-kobane-amebachi*.

### Gattung *Agrypnon* FÖRSTER

*Agrypnon* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 151 (1868).

#### Übersicht der Arten

1. Fühler von Körperlänge oder länger als der Körper .....2.  
—Fühler kürzer als der Körper.....9.
2. Thorax grösstenteils rot, nur das Mesonotum schwarz .....3.  
—Thorax grösstenteils schwarz .....4.
3. Grosse und robuste Art. Gesicht ganz gelb. Mesopleuren dicht grob punktiert .....*suzukii* MATSUMURA  
—Kleine und schlanke Art. Gesicht gelblichrot. Mesopleuren dicht grob gerunzelt.....*nigrinotum* MATSUMURA et UCHIDA
4. Schildchen ganz und die Unterseite des Thorax gelb...*japonicum* sp. nov.  
—Schildchen und die Unterseite des Thorax nicht gelb .....5.
5. Fühler deutlich länger als der Körper .....*sapporensis* sp. nov.  
—Fühler fast von Körperlänge .....6.
6. Das Ende des Metathorax reicht bis zum Ende der Hinterhüfte. Parapsidenfurchen fehlen ganz. Fühler rostrot .....*gratiosum* ENDERLEIN  
—Das Ende des Metathorax reicht bis zur Mitte der Hinterhüfte. Parapsidenfurchen meist deutlich.....7.
7. Scheitel beiderseits neben den Augen mit einem grossen gelben Fleck. Mesonotum deutlich glänzend.....*varitarsum* WESMAEL  
—Scheitel beiderseits ohne gelben Fleck. Mesonotum matt .....8.
8. Kopf hinten etwas rundlich aufgetrieben. Mesonotum dicht punktiert .....  
.....*maruyamense* sp. nov.  
—Kopf hinten nicht rundlich. Mesonotum dicht gerunzelt...*kiushuense* sp. nov.
9. Die Hintertarsen deutlich verdickt.....*flavifrontatum* SMITH  
—Die Hintertarsen kaum verdickt .....10.
10. Das Ende des Metathorax fast bis zur Spitze der Hinterhüfte reichend. Mesonotum dicht gerunzelt .....11.  
—Das Ende des Metathorax fast bis zur Mitte der Hinterhüfte reichend. Mesonotum dicht fein runzelig punktiert .....13.
11. Radius an der Basis gekrümmt; der 2te rücklaufende Nerv weit hinter dem Cubitalquernerv.....*oyeyamense* sp. nov.  
—Radius an der Basis fast gerade; der 2te rücklaufende Nerv etwas hinter dem Cubitalquernerv.....12.

12. Flügel bräunlichgelb getrübt. Kopf hinter den Augen verschmälert. Augenträger schwarz ..... *tamahonum* sp. nov.  
 —Flügel fast hyalin. Kopf hinter den Augen sehr breit. Augenträger breit gelb gefärbt ..... *elongatum* sp. nov.
13. Mesonotum grob punktiert, glänzend. Antennen schwärzlich  
 ..... *flaveolatum* GRAVENHORST  
 —Mesonotum deutlich fein runzelig punktiert, matt. Antennen rot  
 ..... *daisetsuzanum* sp. nov.

100. *Agrypnon suzukii* MATSUMURA

*Anomalon suzukii* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 120, Pl. XLVIII, Fig. 10, ♀ (1912).

Fundorte: Honshu (Iwate, Miye, Kioto), Kiushu (Kagoshima); 4 (2 ♀, 2 ♂) Exemplare wurden von M. SUZUKI, T. OGASAWARA, M. YANAGIWARA und Prof. Dr. S. MATSUMURA gesammelt.

T. N.: *Suzuki-kobane-amebachi*.

Diese Art steht *A. insigne* Tosq. aus Ost-Sibirien sehr nahe, aber die Färbung der Mesopleuren und des 2ten Hinterleibssegmentes ist ganz verschieden.

100a. *Agrypnon suzukii* MATSUMURA

var. *nigromaculatum* var. nov.

♀, ♂. Unterscheidet sich von der typischen Art durch den schwarz gefleckten Mesothorax.

Fundorte: Honshu (Gifu), Formosa (Tamaho); gesammelt in 3 (1 ♀, 2 ♂) Exemplaren von M. YANAGIWARA und dem Verfasser.

Der Form nach *A. insigne* Tosq. var. *hilare* Tosq. sehr ähnlich.

101. *Agrypnon kiushuense* sp. nov.

♂. Kopf hinter den Augen verschmälert; Schläfen sehr schmal, gerunzelt; Stirn grob gerunzelt; Gesicht und Clypeus fast glatt, das erstere nach unten ein wenig verengt, in der Mitte mit einem Längskiel. Fühler von Körperlänge. Mesonotum dicht grob gerunzelt, aber zum Teil dicht fein punktiert; Parapsidenfurchen undeutlich; Mesopleuren und Metathorax dicht grob genetzt; Schildchen dicht gerunzelt, oben schwach ausgerandet. Die hintersten Beine kräftig, deren Trochantern deutlich länger als die Trochantellen, die Tarsen verdickt. Flügel bräunlich hyalin; Nerven schwarz; Stigma dunkelbraun.

Grundfarbe schwarz und matt. Gesicht, Clypeus, Mandibeln und die beiden Palpen gelb. Antennen dunkel rotbraun, Schaft unten gelb, oben gelbrot. Die Vorder- und Mittelbeine gelbrot, deren Hüften rein gelb, die Hinterbeine rot, deren Schienen am Ende schwärzlich, Tarsen gelb. Hinterleib rot, das 2te Segment auf

der Rückenseite und am Ende des Hinterleibs verdunkelt.

Körperlänge: ♂ 15 mm.

Fundort: Kiushu (der Berg Wakasugi in der Präf. Fukuoka); nur ein ♂ Exemplar gesammelt am 2. Oktober 1927 von K. YASUMATSU; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Kiushu-kobane-amebachi*.

102. *Agrypnon maruyamense* sp. nov.

Diese Art verwandt mit *A. varitarsum* WESM., aber der Scheitel beiderseits neben den Augen ohne gelben Fleck; das Mesonotum durchaus dicht fein punktiert und die Hinterschienen am Ende nicht schwarz gefleckt.

♀. Kopf etwas rundlich aufgetrieben, punktiert, ziemlich glänzend; Gesicht dicht fein punktiert und weiss pubescent. Fühler schlank, etwas länger als der Körper, das erste Geisselglied so lang wie die 3 folgenden zusammen. Mesonotum dicht punktiert, matt; Parapsiden deutlich; Propleuren längsgerunzelt; Mesopleuren runzelig punktiert; Metathorax netzartig gerunzelt; Schildchen oben schwach ausgerandet, dicht gerunzelt. Flügel hyalin. Beine schlank. Hinterleib schlank, das 2te Segment länger als das erste. Bohrer so lang wie das 3te Segment.

Färbung schwarz und matt. Gesicht, Clypeus und Mandibeln mit Ausnahme der Spitzen rein gelb; Schläfen gelblichrot. Beine rot, die vorderen gelblich, deren Hüften und Trochantern gelb. Hinterleib rot, auf der Rückenseite und am Ende verdunkelt. Tegulen rot; Stigma gelblichbraun; Nerven braun. Antennen rot, gegen die Spitzen bräunlich. Körperlänge: ♀ 12 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); gesammelt am 15. September 1927, nur ein Weibchen, vom Verfasser; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Maruyama-kobane-amebachi*.

103. *Agrypnon nigrinotum* MATSUMURA et UCHIDA

*Agrypnon nigrinotum* MATSUMURA et UCHIDA, Ins. Matsumurana, I, p. 73, Pl. III, Fig. 17, ♂ (1926).

Fundorte: Kiushu (Kagoshima), Okinawa; gesammelt in 4 (1 ♀, 3 ♂) Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA und S. SAKAGUCHI.

T. N.: *Seguro-amebachi*.

104. *Agrypnon japonicum* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 21, ♀)

♀, ♂. Kopf hinten etwas aufgetrieben, punktiert; Schläfen

breit; Stirn runzelig punktiert, mit erhabener Linie; Gesicht auffallend dicht punktiert und weiss pubescent, nach unten ein wenig verschmälert; Clypeus vorn in der Mitte mit Zähnchen. Fühler deutlich länger als der Körper, das erste Geisselglied in der Mitte schwach gekrümmt und länger als die 2 folgenden zusammen. Mesonotum vorn gewölbt, dicht grob punktiert und glänzend; die Punktierung der Mesopleuren zerstreut fein; Schildchen dicht punktiert, flach, aber oben schwach eingedrückt. Metathorax dicht netzartig gerunzelt, an der Basis glatt. Flügel hyalin; Stigma und Nerven dunkelbraun; Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus nach aussen schwach gekrümmt. Die Hinterhüften dick und kurz, Trochanter deutlich länger als der Trochantellus, die Tarsen nicht verdickt. Hinterleib schlank und lang; Petiolus linear; Legescheide vorragend.

Schwarz. Schläfen grösstenteils, Gesicht, Clypeus, Schaft unten, Palpen, Mandibeln mit Ausnahme der Spitze, alle Hüften, Trochantern, die Suturen des Thorax, Schildchen, Metathorax am Ende, Sternum und Pleuren unten rein gelb; beim Männchen ausgenommen der Metathorax schwarz. Fühler unten dunkelrot, oben dunkelbraun, an der Basis und gegen die Spitze hin schwarz, der Schaft oben rot. Beine gelbrot, die vorderen gelblich. Hinterleib rot, nur am Ende schwarz. Länge: ♀♂ 11–14 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo), Honshu (Nikko); gesammelt in 7 (5 ♀, 2 ♂) Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA, K. TAMANUKI und dem Autor.

T. N.: *Higenaga-kobane-amebachi*.

#### 105. *Agrypnon sapporensis* sp. nov.

♂. Antennen viel länger als der Körper, das erste Geisselglied deutlich länger als das 2te und 3te zusammen. Kopf quer, von oben gesehen etwas kubisch; Scheitel aufgetrieben; Schläfen breit; Stirn runzelig; Gesicht dicht fein punktiert und nach unten etwas verengt; Clypeus vorn in der Mitte mit einem Zähnchen. Thorax schlank, ganz matt, etwas schmaler als der Kopf; Mesonotum dicht unregelmässig gerunzelt; Mesopleuren unten zerstreut punktiert, glänzend. Schildchen gerunzelt, flach. Metathorax netzförmig gerunzelt, am Ende deutlich verlängert. Flügel hyalin; Nerven und Stigma braun; Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle; Nervellus gerade. Die Hinterbeine etwas kräftig, deren Tarsen

kaum verdickt. Hinterleib schlank, lang und ziemlich glatt.

Schwarz und matt. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Palpen, Scheitel beiderseits, Schaft ganz, Wangen, die Vorder- und Mittelhüften, deren Trochantern rötlichgelb, alle Tarsen rein gelb. Antennen, Beine und Hinterleib gelbrot, die ersteren gegen die Spitzen schwach verdunkelt, die Hinterschienen am Ende und das 2te Segment des Hinterleibs auf der Rückenseite, sowie auch das Hinterleibsende schwärzlich. Länge: ♂ 13 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); nur ein ♂ Exemplar wurde von Dr. S. MATSUMURA gesammelt; das Weibchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Sapporo-kobane-amebachi*.

#### 106.\* *Aгрыpon gratiosum* ENDERLEIN

*Aгрыpon gratiosum* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., p. 13, ♀ (1921).

Fundort: Formosa (Pilam).

T. N.: *Taiwan-hime-kobane-amebachi*.

#### 107. *Aгрыpon varitarsum* WESMAEL

*Anomalon varitarsis* WESMAEL, Bull. Ac. Sc. Belg., XVI, p. 131, ♀ (1849).

*Anomalon varitarse* HOLMGREN, Svensk. Vet.-Akad. Handl., II, p. 29, ♀ (1858).

*Aгрыpon varitarsis* THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 1769, ♀ (1892).

*Aгрыpon varitarsum* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 177 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 16 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1512, ♀ (1908); MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 91 (1913).

*Aгрыpon varitarsum* MORELY, Ind. Faun. Hym., III, p. 426, ♀ (1913).

Fundort: Hokkaido (Sapporo); gesammelt in zahlreichen ♀ Exemplaren vom Autor.

Sonstige Fundorte: Europa und Indien

T. N.: *Kobane-amebachi*.

#### 108. *Aгрыpon flavifrontatum* SMITH

*Anomalon flavifrons* SMITH, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 395, ♀ (1874); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 11 (1905).

*Anomalon flavifrontatum* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 156 (1901).

*Aгрыpon flavifrons* MORLEY, Rev. Ichn., II, p. 90 (1913).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo), Honshu (Iwate, Hiogo); gesammelt in zahlreichen ♀ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, T. OGASAWARA und dem Autor. Parasit von *Episyrphus balteatus* DEG.

T. N.: *Maeki-usu-amebachi*.

#### 109. *Aгрыpon oyeyamense* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 18, ♀)

♀. Antennen kaum kürzer als der Körper. Kopf hinten nicht aufgetrieben; Stirn und Scheitel dicht runzelig; Schläfen zerstreut

punktiert, gelblich braun pubescent; Gesicht nach unten verengt, gelb behaart; Clypeus vorn in der Mitte mit Zähnechen; Mandibeln kräftig und lang. Mesonotum deutlich unregelmässig dicht runzelig, ganz matt; Propleuren grob längsgerunzelt; Mesopleuren glänzend, gerunzelt. Schildchen flach gewölbt, auf der Scheibe eingedrückt, an den Seiten gerandet, grob quengerunzelt. Metathorax deutlich verlängert und netzartig gerunzelt. Flügel graulich getrübt; Stigma und Nerven braun; Radius nahe dem Flügelmal gekrümmt. Die Hinterbeine nicht kräftig, deren Tarsen kaum verdickt. Postpetiolus am Ende verschmälert.

Schwarz. Kopf etwas glänzend; Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Palpen, Schläfen unten, die Scheitelflecke und die Vorderhüften und -trochantern rein gelb; Antennen rot, gegen die Spitzen gelbrot, an der Basis verdunkelt; der Schaft unten rot, oben schwärzlich. Beine und Hinterleib rot, die Hinterschienen am Ende schwarzbraun, deren Tarsen gelbrot; das 2te Segment des Hinterleibs auf dem Rücken, sowie auch das Endsegment schwärzlich.

Länge: ♀ 16 mm.

Fundort: Honshu (Oyeyama in der Präf. Kioto); nur ein ♀ Exemplar wurde am 24. Juli 1924 von E. KINOSHITA gefunden; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Oyeyama-kobane-amebachi*.

#### 110. *Agrypnon tamahonum* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 22, ♀)

♀. Antennen etwas kürzer als der Körper und ziemlich kräftig. Kopf hinter den Augen verschmälert, stark runzelig punktiert; Schläfen schmal; Gesicht schwach punktiert, flach, glänzend, weisslich dünn pubescent; Clypeus am Vorderrande in der Mitte mit kleinem Zahn. Mesonotum auffallend dicht unregelmässig runzelig, hinten in der Mitte querrunzelig. Schildchen auf der Scheibe nicht eingedrückt, grob gerunzelt. Mesopleuren runzelig punktiert, etwas glänzend; Metathorax deutlich verlängert, netzförmig gerunzelt. Flügel bräunlichgelb getrübt; Stigma gelbrot; Nerven braun; der 2te rücklaufende Nerv nahe dem Cubitalquernerv mündend. Bohrer weit vorragend.

Schwarz. Scheitelflecke, Gesicht, Clypeus, Wangen, Mandibeln, Palpen, Schaft unten, die Vorderhüften und -trochantern und die Hintertarsen ockergelb, die letzteren an der Basis rötlichgelb und das Endglied rot. Fühler, Beine und Hinterleib vorwiegend dunkel-

rot, der erstere gegen die Basis, der Schaft oben und die Hinterschienen am Ende schwarz; der Rücken des 2ten Hinterleibssegmentes schwärzlich. Legescheide gelb. Länge: ♀ 18–20 mm.

Fundort: Formosa (Tamaho); 2 ♀ Exemplare wurden am 11. Juli 1925 vom Autor gesammelt; das Männchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Tamaho-kobane-amebachi*.

111. *Agrypnon daisetsuzanum* sp. nov.  
(Taf. V, Fig. 24, ♂)

♀, ♂. Kopf hinter den Augen aufgetrieben, die Hinterhauptskante ausgerandet; Stirn und Scheitel dicht runzelig punktiert; Schläfen glänzend, fein punktiert; Gesicht fein punktiert, glänzend; Clypeus vorn abgerundet. Fühler viel kürzer als der Körper, schlank, das erste Geißelglied fast so lang wie die 2 folgenden zusammen. Mesonotum dicht fein punktiert, ganz matt; Schildchen fein quengerunzelt, auf der Scheibe stark eingedrückt; Mesopleuren dicht runzelig; Metathorax genetzt. Die Hintertarsen etwas verdickt. Hinterleib lang. Flügel bräunlichgelb getrübt; Stigma und Nerven braun.

Schwarz und matt. Antennen gelbrot, gegen die Spitzen gelblich, an der Basis und der Schaft oben schwarz. Gesicht, Schaft unten, Clypeus, Mandibeln, Scheitelpunkte, Schläfen unten, die Vorder- und Mittelhüften, deren Trochantern unten und die Hintertarsen rein gelb; beim Weibchen die Schläfen oben rot. Beine und Hinterleib zum grössten Teil rot, die Hinterschienen am Ende verdunkelt; beim Männchen die Hinterhüften rein gelb; das 2te Hinterleibssegment auf der Rückenseite schwärzlich. Länge: ♀♂ 15–17 mm.

Fundorte: Sachalin (Motodomari), Hokkaido (der Berg Daisetsu); 3 (1 ♀, 2 ♂) Exemplare wurden von S. ISSHIKI, J. ADACHI und dem Verfasser gesammelt.

T. N.: *Daisetsu-kobane-amebachi*.

112. *Agrypnon flaveolatum* GRAVENHORST

*Ophion flaveolatum* GRAVENHORST, Verh. Übers. Zool. Syst., p. 268 (1807).

*Anomalon flaveolatum* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 664, ♀♂ (1829).

*Agrypnon flaveolatum* FÜRSTER, Verh. Nat. Preuss. Rheinl., XVII, p. 152 (1860); THOMSON, Opusc. Ent., XVI, p. 1771, ♀♂ (1892); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 175 (1901); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 34, p. 16 (1905); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1513 (1908).

Fundorte: Sachalin (Nairo), Hokkaido (Sapporo), Korea (Giseifu); gesammelt in 10 (8 ♀, 2 ♂) Exemplaren von T. KURISUE, T. OKUNI, Y. MURASE und dem Verfasser.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Kobane-amebachi*.

113. *Agrypon elongatum* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 12, ♀)

♀. Kopf hinter den Augen verschmälert, glatt, mit einzelnen kleinen Punkten; Scheitel und Stirn aufgetrieben, dicht gerunzelt; Ocellen klein; Augen gross, innen an der Basis der Antennen schwach ausgerandet; Gesicht dicht weiss pubescent, rauh; Clypeus vorn in der Mitte mit feinem Zähnchen; Mandibeln dick, mit 2 ungleichen Zähnen, der untere kürzer. Antennen kürzer als der Körper, schlank. Thorax mit dichter Pubescenz, dicht fein runzelig punktiert; Schildchen und Metathorax dicht netzförmig gerunzelt, das erstere flach, der letztere am Ende stark verlängert. Beine normal, der Hintertrochanter deutlich länger als der Trochantellus. Hinterleib fast 3 mal so lang wie Kopf und Thorax zusammen, das erste und 2te Segment linear, die übrigen deutlich komprimiert. Flügel kurz, hyalin; Stigma und Nerven rötlichbraun; Nervus parallelus deutlich über der Mitte der Brachialzelle.

Schwarz und ganz matt. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Augenränder breit und die beiden Palpen gelb; Schläfen poliert. Antennen rot, gegen die Spitzen rotbraun; Pedicellus schwarz. Beine rot, die Vorderhüften und -trochantern gelb, die Vorder- und Mittelbeine zum Teil rötlichgelb, die Hinterschienen am Ende und deren Trochantern oben verdunkelt, deren Tarsen gelb. Hinterleib rot, das 2te Segment und das Ende des Hinterleibs schmutzigrot. Legescheide gelbrot. Länge: ♀ 14 mm.

Fundort: Honshu (Mie); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von M. YANAGIWARA; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Hosonaga-kobane-amebachi*.

Gattung *Gongropelma* ENDERLEIN

*Gongropelma* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., LXXXII, p. 13 (1921).

Übersicht der Arten

1. Fühler gelbrot. Der rücklaufende Nerv weit hinter dem Cubitalquernerv ..... *tainense* sp. nov.  
—Fühler schwärzlich oder verdunkelt ..... 2.
2. Fühler rotbraun, die beiden ersten Geisselglieder unten gelb. Legescheide

schwarz ..... *formosanum* ENDERLEIN  
 —Fühler schwärzlich verdunkelt. Legescheide gelbbrot .... *kikuchii* sp. nov.

114. *Gongropelma tainense* sp. nov.

♀. Kopf hinter den Augen verschmälert; Scheitel etwas aufgetrieben; Schläfen glatt; Stirn runzelig; Gesicht und Clypeus spärlich fein punktiert, poliert, fein pubescent, der letztere am Vorderrande abgerundet. Antennen fast von Körperlänge, das erste Geisselglied in der Mitte deutlich gekrümmt, kaum länger als die 2 folgenden zusammen. Mesonotum dicht gerunzelt und hinten beiderseits punktiert; Schildchen runzelig, auf der Scheibe ausgerandet; Mesopleuren grob längsgerunzelt; Metathorax dicht runzelig, die Spitze desselben reicht bis zur Spitze der Hinterhüften. Die Hinterbeine dick, deren Tarsen nicht verdickt. Hinterleib schlank, zwischen Petiolus und Postpetiolus verdickt. Flügel hyalin; Nerven und Stigma rotbraun.

Schwarz. Gesicht, Clypeus, Wangen, Schaft unten, Scheitel beiderseits, Mandibeln, Palpen und die Vorderbeine gelb; Beine und Hinterleib rot, die Hinterschienen am Ende, der Rücken des 2ten Hinterleibssegmentes und das Hinterleibsende schwärzlich. Antennen rot, am Ende verdunkelt. Länge: ♀ 11 mm.

Fundort: Formosa (Tainan); nur ein ♀ Exemplar wurde von S. TAKANO erbeutet; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Tainan-kobane-amebachi*.

115.\* *Gongropelma formosanum* ENDERLEIN

*Gongropelma formosanum* ENDERLEIN, Stett. Ent. Zeit., LXXXII, p. 13, ♀ (1921).

Fundort: Formosa (Takao).

T. N.: *Taiwan-kuro-hoso-kobane-amebachi*.

116. *Gongropelma kikuchii* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 11, ♀)

♀. Kopf hinten verschmälert, dicht gerunzelt, mit etwas kurzer gelblichbrauner Pubescenz; Stirn und Scheitel deutlich gerunzelt; Gesicht flach, mit dichter und feiner Punktierung; Clypeus vorn breit abgerundet; Mandibeln zweizähmig. Fühler kürzer als der Körper. Thorax auffallend dicht unregelmässig gerunzelt, ebenso das Schildchen; Metathorax grob genetzt. Die Hintertarsen nicht verdickt. Flügel gelblichbräun getrübt; Stigma ockergelb; Ader gelbbraun; der 2te rücklaufende Nerv etwas hinter dem Cubitalquer-

nerv. Hinterleib lang, das erste Segment nahe am Ende knotig verdickt.

Matt, schwarz. Scheitelflecke, Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Wangen und Palpen gelb. Fühler oben fast schwarzbraun, unten gegen die Basis rötlichbraun; Schaft unten gelb. Beine vorwiegend rot, die Vorder- und Mittelhüften, deren Trochantern und alle Tarsen gelb, das Endglied des Hintertarsus schwarzbraun, deren Schienen an den Spitzenhälften schwarz. Hinterleib dunkelrot, nur das 2te Segment auf dem Rücken schwarz. Legescheide und die 3 Endsegmente auf der Unterseite gelb. Länge: ♀ 17 mm.

Fundort: Formosa (Yakanron, Horisha); 2 ♀ Exemplare wurden von Dr. S. MATSUMURA und K. KIKUCHI gesammelt; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Kikuchi-kobane-amebachi*.

## TRIBUS MESOCHORINI

### Übersicht der Gattungen

1. Scheitel auffallend verengt. Ocellen gross, fast die Augen berührend  
 ..... *Plesiophthalmus* FÖRSTER  
 —Scheitel nicht auffallend verengt. Ocellen klein, von den Augen weit abstehend ..... 2.
2. Nervellus gebrochen. Das erste Hinterleibssegment mit einer scharfen, von den Luftlöchern nach der Spitze hinziehenden Seitenleiste. Nervus parallelus in der Mitte des Aussennervs der Brachialzelle entspringend  
 ..... *Astiphromma* FÖRSTER  
 —Nervellus nicht gebrochen. Das erste Hinterleibssegment ohne scharfe Seitenleiste. Nervus parallelus oberhalb der Mitte des Aussennervs der Brachialzelle entspringend.....*Mesochorus* GRAVENHORST

### Gattung *Plesiophthalmus* FÖRSTER

*Plesiophthalmus* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 170 (1868).

*Cidaphus* BRAUNS (non FÖRSTER), Arch. Nat. Meck., XLIII, p. 77 (1889).

### Übersicht der Arten

- Kopf schwarz. Gesicht runzelig punktiert ....*melanocephalus* HABERMEHL  
 —Kopf rot. Gesicht uneben, stark punktiert .....*alaris* GRAVENHORST

### 117. *Plesiophthalmus melanocephalus* HABERMEHL

*Plesiophthalmus melanocephalus* HABERMEHL, Deut. Ent. Zeit., p. 566, ♂ (1909); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1941 (1910); HABERMEHL, Konowia, I, p. 270 (1922).

Fundort: Hokkaido (Jōzankei, der Berg Daisetsu); gesammelt in 3 (1 ♀, 2 ♂) Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA und dem Autor.

Sonstiger Fundort: Europa.  
T. N.: *Futao-amebachi*.

118. *Plesiophthalmus alarius* GRAVENHORST  
(Taf. VII, Fig. 11)

*Mesochorus alarius* GRAVENHORST, Ichn. Eur., II, p. 977, ♂ (1829).  
*Cidaphus alarius* BRAUNS, Arch. Nat. Meck., XLIII, p. 77, ♀♂ (1839); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 81 (1901).  
*Plesiophthalmus alarius* SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1940 (1910).  
Fundorte: Sachalin (Shimizu), Hokkaido (Sapporo, Jōzankei); gesammelt in 3 (2 ♀, 1 ♂) Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA und dem Verfasser.  
Sonstiger Fundort: Europa.  
T. N.: *Ô-futao-amebachi*.

Gattung *Astiphromma* FÖRSTER

*Astiphromma* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 170 (1868).  
*Astiphrommus* THOMSON, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 327 (1835).

Übersicht der Arten

Kopf nach hinten stark verschmälert. Areola im Vorderflügel gross und viereckig. Grosse Art ..... *jezoense* sp. nov.  
—Kopf nach hinten nicht verschmälert, sondern etwas aufgetrieben. Areola im Vorderflügel klein. Kleine Art ..... *geniculatum* sp. nov.

119. *Astiphromma jezoense* sp. nov.  
(Taf. V, Fig. 25, ♀)

♀, ♂, Kopf hinten auffallend verschmälert, glatt; Gesicht und Clypeus dicht grob, Schläfen fein punktiert, das erstere in der Mitte schwach gewölbt; Clypeus vorn breit abgerundet; Mandibeln dick, mit 2 gleichen Zähnen. Fühler länger als der Körper, dünn, das erste Geisselglied viel länger als das folgende, das 2te fast so lang wie das 3te. Thorax glänzend, gelblich pubescent; Mesonotum fein punktiert; Parapsidenfurchen schwach angedeutet; Pleuren und Metathorax ganz glatt, die Felderung des letzteren vollständig gebildet, Area superomedia schmal und lang, nach vorn offen; Costula kräftig; Schildchen flach, glatt, schwach glänzend, an der Basis gerandet. Flügel graulich, hyalin; Stigma schmal, blassgelb; Nerven gelbbraun; Radialzelle schmal; Areola vierseitig, deutlich gross, kurz gestielt; Nervulus weit hinter der Gabel; Discocubitalnerv gebogen; Nervellus postfurcal, weit unter der Mitte gebrochen. Beine ziemlich kräftig; Klauen lang und dicht gekämmt. Hinterleib länger als Thorax und Kopf zusammen, glatt, schwach glänzend; Gastrocölen deutlich;

das 2te Segment auf der Rückenseite breit eingedrückt; Bohrer so lang wie das 3te Segment. Beim Männchen mit 2 langen, griffelförmigen Fortsätzen am Hinterleibsende.

Färbung gelbrot. Gesicht, Schläfen unten, Wangen, Clypeus, und Mandibeln ausgenommen die Endzähne gelb. Thorax ziemlich stark glänzend, besonders die Pleuren und der Metathorax; Mesonotum zuweilen bräunlich verdunkelt. Die Vorder- und Mittelbeine und die Hintertarsen gelblich; Klauen schwarzbraun.

Länge: ♀♂ 9-14 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Otaru, Jōzankei, Garugawa, der Berg Daisetsu, Obihiro), Honshu (Nikko); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA, E. GALLOIS und dem Verfasser.

T. N.: *Yejo-futao-amebachi*.

120. *Astiphromma geniculatum* sp. nov.

(Taf. V, Fig. 27, ♂)

♀, ♂. Kopf hinten etwas aufgetrieben, kaum punktiert, ganz matt; Gesicht und Clypeus dicht fein punktiert, aber letzterer vorn glatt und glänzend; Mandibeln mit zwei ungleichen Zähnen, der untere dicker und länger. Fühler länger als der Körper, das erste Geißelglied nur wenig länger als das folgende, das 2te so lang wie das folgende. Thorax spärlich fein oder kaum punktiert, ganz matt; Parapsidenfurchen schwach; Schildchen flach gewölbt, an den Seiten nur an der Basis gerandet; Metathoracalfelder vollständig gebildet; Area superomedia deutlich länger als breit; Costula stark angedeutet; Luftlöcher klein und rund. Flügel hyalin; Stigma auffallend breit, kurz; Radialzelle breit, fast dreieckig; Areola klein, viereckig, kurz gestielt; Discocubitalnerv deutlich gebogen; Nervulus weit hinter der Gabel; Nervellus in der Mitte gebrochen. Beine schlank; Klauen gekämmt. Hinterleib nur ein wenig länger als oder so lang wie Kopf und Thorax zusammen, ganz matt, lederartig, fein pubescent; Bohrer so lang wie das 4te Segment; die griffelförmigen Fortsätze am Hinterleibsende des Männchens kurz und dick.

Grundfarbe rötlichgelb. Der Raum zwischen den Ocellen und die Endzähne der Mandibeln schwarz. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Palpen, die Vorder- und Mittelbeine und die Hintertarsen weisslichgelb. Stigma im Vorderflügel blassgelb; Nerven gelbbraun.

Länge: ♀♂ 7-11 mm.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Moiwa), Kurilen, Honshu (Nagano); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von J. SHIBUYA, K. DOI, H. KÔNO und dem Verfasser.

T. N.: *Ko-futao-amebachi*.

### Gattung *Mesochorus* GRAVENHORST

*Mesochorus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., II, p. 960 (1829).

#### Übersicht der Arten

1. Nervulus weit hinter der Gabel ..... *iwatensis* sp. nov.  
—Nervulus interstitial ..... 2.
2. Kleine Art. Körper und Hinterleib zum grössten Teil schwarz  
..... *kuwayamae* MATSUMURA  
—Grosse Art. Körper und Hinterleib gelblich rot ..... *fulgurans* CURTIS

#### 121. *Mesochorus iwatensis* sp. nov.

♀. Kopf quer, glatt, hinten rundlich verengt; Scheitel breit; Ocellen klein; Augen gross. Fühler kürzer als der Körper, fadenförmig. Mesonotum glänzend, vorn konvex, lederartig punktiert; Parapsidenfurchen kurz und tief; Schildchen glatt, schwach konvex, stark glänzend; Metathorax am Ende deutlich verlängert, der Felder undeutlich; Area superomedia glatt, glänzend, länger als breit. Hinterleib komprimiert, poliert; Bohrer kurz vorragend. Flügel hyalin; Areola gross, nicht gestielt; Stigma und Nerven gelbbraun, das erstere kurz und breit; Nervulus interstitial; Nervellus nicht gebrochen.

Gelbrot. Antennen dunkelbräunlich; Hinterkopfsleiste, Mesonotum vorn und beiderseits dunkel rotbraun; Metathorax oben schwarz. Beine ganz gelb. Hinterleib gelblichbraun, an der Basis schwärzlich.

Länge: ♀ 5 mm.

Fundort: Honshu (Iwate); nur ein ♀ Exemplar wurde von T. OGASAWARA gesammelt; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Iwate-futao-amebachi*.

#### 122. *Mesochorus kuwayamae* MATSUMURA

*Mesochorus kuwayamae* MATSUMURA, Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., p. 38 (1925); id., Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 27, ♂ (non ♀) (1926).

Fundort: Sachalin (Ozawa); gesammelt in nur einem ♂ Exemplare von S. KUWAYAMA; das Weibchen unbekannt. Schmarotzer von *Dendrolimus albolineatus* MATS.

T. N.: *Kuwayama-futao-amebachi*.

123. *Mesochorus fulgurans* CURTIS

*Mesochorus fulgurans* CURTIS, Brit. Ent., X, p. 464 (1833); THOMSON, Ann. Soc. Ent. Fr., V, p. 336, ♀ (1835); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1976, ♀ (1910); MORLEY, Brit. Ichn., V, p. 318, ♀ (1913).

*Mesochorus laricis* HARTIG, Jahresber. Forstsch. Forstw., I, p. 273, ♀ (1838); RATZEBURG, Ichn. Forst., I, p. 149, ♀ (1844).

Fundort: Honshu (Aomori); nur ein ♀ Exemplar wurde am 27. Juli 1927 von H. Kôno gesammelt; das Männchen noch nicht aufgefunden.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Towada-futao-amebachi*.

TRIBUS BANCHINI

Übersicht der Gattungen

1. Klauen mehr oder weniger gekämmt ..... 2.  
— Klauen nicht gekämmt ..... 4.
2. Clypeus lang; Wangen länger als die Breite der Mandibelbasis. Schildchen endet nicht in einem Dorn ..... *Tegona* MORLEY  
— Clypeus nicht auffallend lang; Wangen kürzer als die Breite der Mandibelbasis. Schildchen endet in einem Dorn ..... 3.
3. Areola im Vorderflügel pentagonal. Hinterleib am Ende zugespitzt ..... *Nawaia* ASHMEAD  
— Areola im Vorderflügel viereckig. Hinterleib stark komprimiert ..... *Banchus* FABRICIUS
4. Discocubitalnerv nicht winklig gebrochen, ohne Ramellus. Das 8te Rücken-segment des Hinterleibs dreieckig zusammengedrückt, hinten zugespitzt, oben mit einem elliptischen Längsschlitz ..... *Xenoschesis* FÖRSTER  
— Discocubitalnerv winklig gebrochen, mit deutlichem Ramellus ..... 5.
5. Stirn ohne Höcker ..... *Exetastes* GRAVENHORST  
— Stirn mit einem Höcker ..... *Allexetastes* KOKUJEW

Gattung *Tegona* MORLEY

*Tegona* MORLEY, Ind. Faun. Hym., III, p. 251 (1913).

124. *Tegona bimaculata* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 3, ♀)

♀. Kopf von vorn gesehen fast dreieckig, nach hinten verengt; Scheitel, Stirn, Schläfen und Gesicht deutlich dicht punktiert; Clypeus spärlich fein, aber an der Basis zerstreut punktiert; Wangen sehr lang; Mandibeln lang und dick, mit zwei gleichen Zähnen; Nebenaugen klein; Augen gross. Fühler schlank; fadenförmig, so lang wie der Körper, das erste Geißelglied länger als das 2te und 3te zusammen, der Schaft deutlich dick und kurz. Thorax dicht punktiert, matt; Schildchen ziemlich stark erhaben, dicht punktiert;

Metathorax schwach glänzend, dicht weiss pubescent, in der Mitte mit schwacher Längsfurche, die Punktierung des Metathorax gröber und stärker als die des Mesonotums; Luftlöcher linear. Hinterleib schlank, glatt, etwas poliert; Gastrocölen gross, nicht tief; Bohrer kurz vorragend. Flügel fast hyalin; Stigma gelb; Nerven gelbbraun; Areola viereckig, kurz gestielt; Discocubitalnerv mit kurzem Ramellus; Nervulus etwas hinter der Gabel; Nervellus deutlich über der Mitte gebrochen. Beine schlank und lang; Klauen gekämmt.

Färbung schwarz und matt. Antennen grösstenteils gelbrot; Gesicht beiderseits, Clypeus, Palpen und Mandibeln zum Teil gelb. Beine vorwiegend gelbrot, alle Hüften ausgenommen die Spitzen schwarz, die Trochantern und Schenkel auf der Oberseite schwarz bis schwarzbraun; die Hintertarsen mit Ausnahme der Basis hell rötlichgelb. Hinterleib fast hellrot, das erste Segment an der Basis und am Ende, auch das 2te an der Basis gelb, das erstere in der Mitte, sowie auch das letztere auf der Seite ausgedehnt verdunkelt. Länge: ♀ 14 mm.

Fundort: Hokkaido (der Berg Daisetsu); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare vom Autor; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Kao-naga-amebachi*.

### Gattung *Nawaia* ASHMEAD

*Nawaia* ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXX, p. 184 (1906).

#### 125. *Nawaia japonica* ASHMEAD

(Taf. VII, Fig. 10)

*Nawaia japonica* ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXX, p. 185, Pl. XIV, Fig. 2, ♀ (1906); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1922 (1910).

Fundort: Honshu (Gifu, Komaba, Sanjōgatake in der Präf. Nara); gesammelt in 3 (2 ♀, 1 ♂) Exemplaren von S. ISSHIKI und S. HIRAYAMA.

T. N.: *Nawa-toge-amebachi*.

### Gattung *Banchus* FABRICIUS

*Banchus* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 229 und 233 (1798).

#### Übersicht der Arten

Schildchen mit langem Dorn. Hinterleib ganz schwarz  
 ..... *monileatus* GRAVENHORST  
 —Schildchen nur mit Höcker. Hinterleib in der Mitte breit gelbrot  
 ..... *falcatorius* FABRICIUS

126. *Banchus monileatus* GRAVENHORST

*Banchus monileatus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 393, ♀♂ (1829); THOMSON, Opusc. Ent., XXII, p. 2413, ♀♂ (1897); MORLEY, Brit. Ichn., III, p. 286 (1907); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1932 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 87 (1911); HABERMEHL, Konowia, I, p. 270 (1922).

*Banchus hastator* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 1059 (1829).

*Corynephanes monileatus* DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 68 (1901).

Fundort: Honshu (Kioto, der Berg Yatsugatake und Tsubakuradake in der Präf. Nagano); gesammelt in 3 (1 ♀, 2 ♂) Exemplaren von A. NOHIRA und H. KONO.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Kuro-toge-amebachi*.

127. *Banchus falcatorius* FABRICIUS

(Taf. VII, Fig. 14)

*Ichneumon falcatorius* FABRICIUS, Syst. Ent., p. 332, ♂ (1775).

*Ichneumon venator* FABRICIUS, l. c., p. 337, ♀ (1775).

*Banchus venator* FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 223, ♀ (1798).

*Banchus falcatorius* FABRICIUS, l. c., p. 234, ♂ (1798); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 63 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1930 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 87, Pl. II, Fig. 23 & 24 (1911); HABERMEHL, Konowia, I, p. 269 (1922).

*Banchus pictus* PANZER, Faun. Ins. Germ., VI, p. 71, ♂ (1799).

*Banchus falcator* FABRICIUS, Syst. Piez., p. 128, ♂ (1804); GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 385, ♀♂ (1829); THOMSON, Opusc. Ent., XXII, p. 2412, ♀♂ (1897); MORLEY, Brit. Ichn., III, p. 287, ♀♂ (1907); id., Rev. Ichn., IV, p. 138 (1915).

*Banchus farrani* CURTIS, Brit. Ent., XIII, p. 588, ♀ (1836).

*Corynephanes sachalinensis* MATSUMURA, Journ. Coll. Agr., Tohoku Imp. Univ., IV, p. 92, ♂ (non ♀) (1911).

*Banchus sachalinensis* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 146, Pl. II, Fig. 8, ♂ (non ♀) (1912).

Fundort: Sachalin (Mereya); 5 ♂ Exemplare wurden von Dr. K. OGUMA gesammelt; das Weibchen noch nicht aufgefunden.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Karafuto-katamon-himebachi*.

Gattung *Xenoschesis* FÖRSTER

*Xenoschesis* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 158 (1868).

Übersicht der Arten

Beine gelbrot. Flügel gelblich, hyalin.....*fulvipes* GRAVENHORST  
 — Beine ganz schwarz. Flügel fast hyalin .....*crassicornis* sp. nov.

128. *Xenoschesis fulvipes* GRAVENHORST

*Xenoschesis fulvipes* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 401, ♀ (1829).

*Notopygus fulvipes* HOLMGREN, Svensk. Vet.-Akad. Handl., I, p. 378, ♀ (1856); THOMSON, Opusc. Ent., IX, p. 925, ♀♂ (1886).

*Polycinetus fulvipes* THOMSON, Opusc. Ent., XIX, p. 1983, ♀♂ (1895).

*Xenoschesis fulvipes* SCHMIEDEKNECHT, Hym. Mittel., p. 604 (1907); id., Opusc. Ichn., p. 1920 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 85 (1911).

Fundort: Hokkaido (Sapporo); nur ein ♀ Exemplar wurde vom Autor erbeutet; das Männchen noch nicht aufgefunden.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Kiashi-togari-amebachi*.

129. *Xenoschesis crassicornis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 20, ♀)

♀. Schwarz; Clypeus nur am Vorderrande und die Mandibeln in der Mitte rötlich. Flügel fast hyalin; Stigma und Nerven ganz schwarz. Die Vorderschienen und -tarsen, deren Schenkel an den Spitzen und die Knie der Mittelbeine trübrot. Bohrer an der Spitze rötlichgelb.

Kopf kaum punktiert, schwärzlich pubescent, hinter den Augen ein wenig rundlich verschmälert; Gesicht dicht punktiert, in der Mitte schwach gewölbt; Clypeus grob quergerunzelt; Mandibeln dick, mit zwei gleichen Zähnen. Antennen kräftig, ganz schwarz. Thorax stark glänzend, fein punktiert; Schildchen konvex, punktiert, an der Basis seitlich gerandet; Parapsidenfurchen kaum angedeutet; Mesonotum vorn in der Mitte konvex; Metathorax hinten abfallend, glatt; Area posteromedia durch deutliche Leiste ringsum abgegrenzt wie bei der vorigen Art. Hinterleib glatt und poliert, das erste Segment in der Mitte mit einer schwachen Längsfurche, zerstreut punktiert; Gastrocölen gross, nicht tief; Bohrer ziemlich weit vorragend. Beine mässig dick; Klauen nicht gekämmt. Nervulus etwas hinter der Gabel; Areola klein, gestielt; Nervellus etwas über der Mitte gebrochen. Länge: ♀ 15 mm.

Fundort: Korea (Suigen); gesammelt von K. SATÔ; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Chosen-higebuto-togari-amebachi*.

**Gattung *Exctastes* GRAVENHORST**

*Exctastes* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 395 (1829).

**Übersicht der Arten**

1. Hinterleib mehr oder weniger rot.....2.  
—Hinterleib grösstenteils schwarz.....5.
2. Schildchen stark rundlich erhaben. Antennen in der Mitte breit weisslichgelb geringelt .....*ichneumoniformis* GRAVENHORST  
—Schildchen flach .....3.

3. Beim ♀ Hinterleib ganz rot ..... *karafutonis* sp. nov.  
 —Beim ♀ Hinterleib nicht ganz rot .....4.
4. Hinterleib bei beiden Geschlechtern in der Mitte rot. Mesonotum des Männchens ganz schwarz ..... *robustus* GRAVENHORST  
 —Hinterleib beim ♀ ganz schwarz. Mesonotum des Männchens beiderseits gelb gefleckt ..... *cinctipes* RETZIUS
5. Alle Schenkel gelbbrot .....6.  
 —Alle Schenkel schwarz .....7.
6. Fühler und Schienen dick. Schildchen und Mesonotum ganz schwarz. Körper matt..... *fornicator* FABRICII'S  
 —Fühler und Schienen schlank. Schildchen ganz gelb; Mesonotum vorn beiderseits mit einem gelben Fleck. Körper glänzend..... *miniatus* sp. nov.
7. Mandibelbasis so lang wie oder etwas länger als die Wange ..... *longigenus* sp. nov.  
 —Mandibelbasis kürzer als die Wange .....8.
8. Fühler ohne weissen Ring ..... *longipes* sp. nov.  
 —Fühler mit weissem Ring .....9.
9. Schildchen weiss gezeichnet. Bohrer weit vorragend, so lang wie das 2te Hinterleibssegment .... *fukuchiyamensis* sp. nov.  
 —Schildchen ganz schwarz. Bohrer kurz ..... *ishikawensis* sp. nov.

130. *Exetastes ichneumoniformis* GRAVENHORST

*Exetastes ichneumoniformis* GRAVENHORST, Ichn. Eur., 111, p. 410, ♀♂ (1829); KRIECHBAUMER, Ent. Nachr., XXV, p. 303, ♀♂ (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., 111, p. 72 (1901); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1892, ♀♂ (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 83 (1911).

*Exetastes scutellaris* MATSUMURA, Thous. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 124, Pl. XLIX, Fig. 4, ♂ (non ♀) (1912).

Fundort: Hokkaido (Sapporo); nur ein ♂ Exemplar gesammelt von Dr. S. MATSUMURA; das Weibchen noch nicht aufgefunden.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Higenaga-himebachi*.

131. *Exetastes karafutonis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 24, ♀)

♀. Eine schlanke und kleine Art. Grundfarbe schwarz. Kopf, Gesicht, Fühler, Thorax, alle Hüften und Trochantern schwarz; Fühler in der Mitte breit weiss geringelt. Schildchen zum grössten Teil und die Oberseite des Halses weiss. Clypeus mit rotem Vorderende. Beine und Hinterleib vorwiegend rot; die hintersten Schienen gegen die Spitzen etwas verdunkelt; das erste Segment des Hinterleibs an der Basis schwarz, das 2te schmutzig; das erste und letzte Glied des Hintertarsus dunkelbraun, das 3te und 4te weisslich. Nerven und Stigma braun.

Kopf nach hinten verengt, glatt und matt; Scheitel, Stirn,

Gesicht, Wangen und Clypeus dicht fein punktiert, matt; Gesicht in der Mitte schwach konvex. Fühler dünn, fadenförmig, an den Enden zugespitzt. Thorax dicht punktiert, etwas glänzend; Metathorax oben dicht unregelmässig gerunzelt. Beine nicht schlank; Klauen einfach. Schildchen flach, glänzend, punktiert. Hinterleib stark glänzend und glatt; Bohrer weit vorragend, etwas länger als das erste Segment. Flügel gelblich getrübt; Areola fast sitzend; Nervulus interstitial. Länge: ♀ 9 mm.

Fundort: Sachalin (Kiminai); nur ein ♀ Exemplar wurde vom Verfasser erbeutet; das Männchen noch nicht gefunden.

T. N.: *Karafuto-hime-kuro-amebachi*.

### 132. *Exetastes robustus* GRAVENHORST

*Exetastes robustus* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 422, ♀♂ (1829); THOMSON, Opusc. Ent., XXVI, p. 2417, ♀ (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 73 (1901); SCHMEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1899, ♀♂ (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 83 (1911); HABERMEHL, Konowia, I, p. 268 (1922).

Fundort: Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Kamuikotan, Teshio); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren vom Autor.

Sonstiger Fundort: Europa.

T. N.: *Moto-akakuro-amebachi*.

### 133. *Exetastes cinctipes* RETZIUS

*Ichneumon cinctipes* RETZIUS, Gen. et Spec. Insect., p. 68 (1783).

*Ichneumon junci* FOURCROY, Ent. Paris, II, p. 413 (1785).

*Ichneumon osculatorius* FABRICIUS, Mant. Insect., I, p. 151, ♂ (1787).

*Ichneumon clavator* FABRICIUS, Ent. Syst., II, p. 151, ♀ (1793); GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 405, ♀ (1829).

*Ophion tarsator* FABRICIUS, Syst. Piez., p. 134, ♀ (1804).

*Exetastes osculatorius* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 413, ♂ (1829).

*Exetastes cinctipes* THOMSON, Opusc. Ent., XXII, p. 2414, ♀♂ (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 69 (1901); MORLEY, Brit. Ichn., III, p. 291, ♀♂ (1907); SCHMEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1888 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 82 (1911); MORLEY, Ind. Faun. Hym., III, p. 244, ♀♂ (1913); id., Rev. Ichn., IV, p. 144 (1915); HABERMEHL, Konowia, I, p. 269 (1922).

Fundorte: Sachalin (Konuma), Hokkaido (Sapporo, Garugawa, Teshio), Honshu (Akita, Echigo); zahlreiche ♀♂ Exemplare wurden von Dr. S. MATSUMURA, M. NAKAMURA, K. TAMANUKI und dem Verfasser gesammelt. Diese Art schmarotzt in der Larve von *Barathra brassicae* L.

Sonstige Fundorte: Europa, Sibirien und Indien.

T. N.: *Yotō-yadori-kuro-amebachi*.

### 134. *Exetastes fornicator* FABRICIUS

*Ichneumon fornicator* FABRICIUS, Spec. Ins., I, p. 432, ♀ (1781).

*Banchus fornicator* FABRICIUS, Suppl. Ent., Syst., p. 233, ♀ (1798).

*Exetastes fornicator* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 402, ♀♂ (1829); THOMSON, Opusc. Ent., XXII, p. 2415, ♀♂ (1899); DALLA TORRE, Cat. Hym., III, p. 71 (1901); MORLEY, Brit. Ichn., III, p. 303, ♀♂ (1907); SCHMIEDEKNECHT, Opusc. Ichn., p. 1891 (1910); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 83, Pl. II, Fig. 22 (1911); MORLEY, Ind. Faun. Hym., III, p. 250, ♀♂ (1913); id., Rev. Ichn., IV, p. 146 (1915); HABERMUEHL, Konowia, I, p. 269 (1922).

*Tryphon fornicator* ZETTERSTEDT, Ins. Lapp., p. 386 (1840).

Fundort: Korea (Suigen); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von K. SATÔ; das Männchen unbekannt.

Sonstige Fundorte: Europa und Indien.

T. N.: *Chosen-akaashi-kuro-amebachi*.

135. *Exetastes miniatus* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 2, ♀)

♀. Grundfarbe schwarz und schwach glänzend. Kopf nach hinten rundlich verschmälert; Scheitel etwas aufgetrieben; Gesicht, Stirn, Schläfen und Clypeus dicht fein punktiert, ganz matt; Clypeus etwas verlängert; Mandibeln mit 2 Zähnen, wovon der untere kräftiger als der obere ist; Wangen so lang wie die Breite der Mandibelbasis. Fühler schlank, fadenförmig, gegen das Ende zugespitzt, etwas kürzer als der Körper. Mesonotum mit starker Punktierung, etwas glänzend; Schildchen flach gewölbt, punktiert; Metathorax oben runzelig punktiert, mit langen Luftlöchern. Hinterleib ganz glatt, deutlich glänzend; das erste Segment mehr als 2 mal so lang wie die Breite des Endes, das 2te und 3te quer; Bohrer kurz vorragend. Flügel gelblich hyalin; Nerven und Stigma gelbrot; Areola viereckig; Ramellus deutlich; Nervulus antefurcal. Beine verhältnismässig kräftig, besonders die hintersten; Klauen einfach.

Schwarz. Clypeus grösstenteils rötlichbraun; Fühler schwarz, unten etwas bräunlich. Alle Schenkel, die Vorder- und Mittelschienen und deren Tarsen mennigrot, die Hinterschenkel nur an den Spitzen, Schienen und Tarsen schwarzbraun, deren Schienenendsporen rotbraun. Die folgenden Hinterleibssegmente vom 3ten bis letzten am Hinterrande schmal gelbbraun gesäumt; Bohrer braun. Schildchen rein gelb, auch das Mesonotum vorn beiderseits mit gelbem Längsfleck. Länge: ♀ 14 mm.

Fundort: Kiushu (Kumamoto); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von H. KAWAMURA; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Aka-ashi-kuro-amebachi*.

136. *Exetastes longigenus* sp. nov.

♀. Kopf nach hinten rundlich verschmälert, kaum punktiert; Stirn und Gesicht deutlich dicht, Clypeus zerstreut grob punktiert, der letztere ziemlich lang, das Gesicht in der Mitte gewölbt; Mandibeln kräftig; Wangen so lang wie die Breite der Mandibelbasis. Fühler schlank, borstenförmig, fast so lang wie der Körper; Schaft kurz und dick, das erste Geißelglied mehr als 2 mal so lang wie die 2 folgenden zusammen. Thorax stark punktiert, aber das Mesonotum in der Mitte runzelig; Schildchen ziemlich hoch erhaben. Hinterleib deutlich glänzend, ganz glatt; das 2te Segment an der Basis schwach quengerunzelt; Bohrer kürzer als das 2te Segment. Flügel bräunlich hyalin; Areola viereckig, sitzend; Ramellus deutlich; Nervulus etwas antefurcal. Beine lang; Klauen nicht gekämmt; die Hinterschienenendsporen lang.

Schwarz und matt. Fühler ganz schwarz. Die Vorder- und Mittelschienen, deren Tarsen dunkelbraun. Schildchen an der Spitze gelb gefleckt. Stigma im Vorderflügel braun; Nerven dunkelbraun.

Länge: ♀ 13-16 mm.

Fundorte: Sachalin (Kiminai), Hokkaido (Jôzankei); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA und dem Autor; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Hoho-naga-kuro-amebachi*.

137. *Exetastes fukuchiyamanus* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 21, ♀)

♀. Grundfarbe matt schwarz. Kopf hinten verengt, spärlich fein punktiert, ganz schwarz und matt; Scheitel, Stirn und Gesicht mit feiner Punktierung, das letztere in der Mitte konvex; Clypeus breiter als lang; Mandibeln dick; Wangen kurz. Fühler von Körperlänge, borstenförmig, schwarz, in der Mitte weiss gefleckt.

Thorax von der Grundfarbe; Mesonotum dicht fein punktiert, die Punktierung der Pleuren gröber und stärker als die des Mesonotums; Metanotum ungefeldert, dicht gerunzelt; Schildchen konvex, grob punktiert, an den Seiten gerandet, an der Spitze weiss. Hinterleib gegen das Ende stark komprimiert und glänzend, aber die 3 Basalsegmente ganz matt, von denen das erste viel länger als breit ist; Gastrocölen gross. Bohrer weit vorragend, fast so lang wie das 2te Segment. Flügel fast hyalin; Stigma und Costa ganz schwarz;

Nerven schwarzbraun; Areola sitzend, viereckig; Nervulus etwas hinter der Gabel; Ramellus kurz. Beine lang, besonders die hintersten; schwarz, nur die Vorderschienen vorn gelbbraun, das 2te Glied an der Spitzenhälfte des Hintertarsus, das 3te und 4te ganz weiss, das erste so lang wie die 3 folgenden zusammen. Klauen nicht gekämmt.

Körperlänge: ♀ 14 mm.

Fundort: Honshu (Fukuchiyama in der Präf. Kioto); gesammelt von K. FUKUDA; das Männchen noch nicht aufgefunden.

T. N.: *Fukuchiyama-kuro-amebachi*.

Diese Art steht *E. illyricus* STROHL aus Europa sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr durch die Skulptur des Kopfs und Thorax, wohl auch den kurzen Ramellus und das weisse Schildchen.

138. *Exetastes ishikawensis* sp. nov.

♀. Kopf nach hinten etwas rundlich verschmälert, fein punktiert; Gesicht und Stirn deutlich dicht punktiert, spärlich fein dunkelgrau pubescent; Mandibeln dick, grob punktiert. Fühler schlank, fast von Körperlänge, gegen das Ende deutlich verdünnt. Thorax fein punktiert wie bei dem Kopf; Parapsidenfurchen fehlen ganz; Schildchen rundlich gewölbt, etwas glänzend; Mesonotum auffallend dicht gerunzelt. Flügel fast hyalin; Nerven schwärzlich; Stigma dunkelbraun; Ramellus kurz; Areola gross; Nervulus etwas hinter der Gabel. Beine normal. Hinterleib ganz glatt, stark glänzend. Bohrer kurz vorragend.

Färbung schwarz und matt. Fühler schwarz, in der Mitte weiss geringelt. Beine schwarz, die Vorderschenkel an den Spitzen und deren Schienen an der Basis gelblich, das 2te, 3te und 4te Hintertarsenglied zum grössten Teil dunkelgelb; die Hinterschienen an der Basis schwärzlichbraun. Hinterleib schwarz, deutlich glänzend, das 2te und 3te Segment am Hinterrande schmal rot gesäumt.

Körperlänge: ♀ 14 mm.

Fundort: Honshu (Ishikawa); nur ein ♀ Exemplar wurde von S. TAKANO gesammelt; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Ishikawa-kuro-amebachi*.

139. *Exetastes longipes* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 10, ♀)

♀. Gesicht und Stirn dicht, Schläfen und Scheitel spärlich fein punktiert, das erstere in der Mitte etwas gewölbt. Fühler

dünn, borstenförmig, so lang wie der Körper. Mesonotum matt, dicht punktiert; Pleuren glänzend, stark punktiert; Schildchen grob punktiert, konvex; Metanotum deutlich dicht gerunzelt. Hinterleib glänzend, glatt, das erste Segment gegen die Basis sehr fein runzelig, beiderseits dicht grob punktiert; Bohrer lang vorragend, fast so lang wie das 2te Segment. Flügel gelb getrübt; Stigma und Nerven gelbrot; Areola sitzend; Ramellus kurz und kräftig; Nervulus interstitial. Beine lang und schlank, besonders die hintersten; Klauen einfach.

Schwarz und matt. Fühler gegen das Ende schwarzbraun. Die Vorder- und Mittelschenkel vorn an den Spitzen, deren Schienen und Tarsen vorn gelbbraun. Schildchen an der Spitze oder grössenteils gelb.

♂. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, beide Palpen und Schildchen ganz rein gelb. Die Vorder- und Mittelbeine ganz gelb.

Körperlänge: ♀♂ 15 mm.

Fundorte: Honshu (Hiogo, Ôsaka, Miye, Echigo), Shikoku (Iyo) 7 (4 ♀, 3 ♂) Exemplare wurden von C. TERANISHI, M. YANAGIWARA, M. NAKAMURA und K. FUKUDA gesammelt.

T. N.: *Ashinaga-kuro-amebachi*.

#### \*Gattung *Allexetastes* KOKUJEW

*Allexetastes* KOKUJEW, Rev. Russ. Ent., p. 106 (1904).

140.\* *Allexetastes coreanus* KOKUJEW

*Allexetastes coreanus* KOKUJEW, Rev. Russ. Ent., p. 107, ♂ (1904); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 80 (1911).

Fundort: Corea.

141.\* *Allexetastes komarovi* KOKUJEW

*Allexetastes Komarovi* KOKUJEW, Rev. Russ. Ent., p. 106, ♀♂ (1904); SZÉPLIGETI, Gen. Ins., 114, p. 80 (1911).

Fundort: Korea.

### TRIBUS CAMPOPLEGINI

#### Übersicht der Gattungen

1. Luftlöcher des Metathorax linear .....2.  
— Luftlöcher des Metathorax rund oder rundlich oval .....4.
2. Metathorax von der Basis an abschüssig und zwischen den Hüften stark verlängert. Das 2te Segment des Hinterleibs fast so lang wie das erste .....  
..... *Nothanomaloides* gen. nov.  
— Metathorax nicht verlängert .....3.
3. Flügel ohne Areola .....*Zacharops* VIEBECK

- Flügel mit Areola .....*Campoplex* GRAVENHORST
4. Clypeus in der Mitte des Endrandes mit spitzem Zähnchen  
.....*Sagarites* HOLMGREN
- Clypeus in der Mitte des Endrandes ohne Zähnchen .....5.
5. Augen innen stark ausgerandet. Hinterleib nach hinten meist keulenförmig .....6.
- Augen innen nicht oder unmerklich ausgerandet. Hinterleib nicht keulenförmig .....9.
6. Flügel ohne Areola. Petiolus breit und kurz; das 2te Hinterleibssegment deprimiert. Die Hinterschienenendsporen fast so lang wie die Metatarsen .....*Melalophacharops* gen. nov.
- Flügel mit Areola. Petiolus schlank; das 2te Hinterleibssegment komprimiert. Die Hinterschienenendsporen kürzer als die Metatarsen .....7.
7. Metathorax deutlich gefeldert, Area superomedia durch die Leisten vollständig geschlossen .....*Rhythmotus* FÖRSTER
- Metathorax nicht gefeldert, Area superomedia undeutlich .....8.
8. Hinterleib nach hinten keulenförmig. Bohrer ganz versteckt  
.....*Casinaria* HOLMGREN
- Hinterleib nach hinten zusammengedrückt. Bohrer vorragend  
.....*Trophocampa* SCHMIEDEKNECHT
9. Flügel ohne Areola .....*Diocetes* FÖRSTER
- Flügel mit Areola .....*Limmerium* ASHMEAD

**Gattung *Nothanomaloides* gen. nov.**

Kopf nach hinten deutlich verengt und schief; Augen innen schwach ausgerandet; Ocellen klein; Clypeus normal. Fühler ziemlich dick, fast so lang wie der halbe Körper. Metathorax zwischen den Hüften stark verlängert, mit elliptischen Luftlöchern. Hinterleib lang, stark komprimiert, das 2te Segment so lang wie das erste. Bohrer fast versteckt. Beine normal. Flügel mit Areola; Nervellus nicht gebrochen. Schildchen schwach konvex, nur an der Basis seitlich gerandet.

Genotype: *Nothanomaloides matsuyamensis* UCHIDA.

Diese Gattung steht *Nothanomalon* SZÉPLIGETI sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die folgenden Merkmale:

1. Schenkel nicht auffallend dünn.
2. Das 2te Hinterleibssegment nicht länger als das erste.
3. Schildchen an den Seiten nicht gerandet und etwas rundlich konvex.

142. *Nothanomaloides matsuyamensis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 23, ♀)

♀. Kopf hinten deutlich verschmälert, schief, dicht pubescent,

glatt; Ocellen klein; Stirn und Scheitel fein rünzelig; Augen innen an der Fühlerbasis schwach ausgerandet; Gesicht und Clypeus auffallend dicht gerünzelt, der letztere vorn abgerundet; Mandibeln dick, mit 2 gleichen Zähnen. Fühler dick und kurz, das erste Geisselglied so lang wie die 2 folgenden zusammen. Thorax dicht rünzelig, ganz matt, weisslich pubescent wie beim Kopf; Schildchen etwas konvex; an der Basis gerandet; Metathorax am Ende verlängert, in der Mitte längsgefurcht. Hinterleib stark komprimiert, schmal und lang, fast 2 mal so lang wie Kopf und Thorax zusammen; das erste Segment linear, aber am Ende verdickt; Thyridien länglich; Bohrer fast versteckt. Beine normal; Klauen nicht gekämmt. Flügel fast hyalin; Areola gestielt; Nervellus etwas hinter der Gabel; Nervellus nicht gebrochen.

Schwarz und matt. Fühler unten an der Basis und die Mandibeln an den Spitzen rotbraun. Palpen, die beiden Vorder- und Mittelschienen und deren Tarsen weisslichgelb, die Vorderschenkel und die Mitteltarsen an den Spitzen gelbbraun, die Hinterschienen und -tarsen schwarzbraun, deren Schienenendsporen weisslichgelb; das 3te und 4te Hinterleibssegment, mit Ausnahme der Bauchseite, das 2te auf der Unterseite und das 5te an der Basis gelbbrot; Bohrer gelbbraun. Stigma und Nerven schwarzbraun; Tegulen gelbbraun.

Länge: ♀ 11 mm.

Fundort: Shikoku (Matsuyama); gesammelt in nur einem ♀ Exemplare von K. FUJII; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Matsuyama-usu-amebachi*.

### Gattung *Zacharops* VIERECK

*Zacharops* VIERECK, Proc. U. S. Nat. Mus., XLII, p. 949 (1912).

#### 143. *Zacharops narangæ* CUSHMAN

*Zacharops narangæ* CUSHMAN, Phil. Journ. Scien., XX, 5, p. 593 (1922); SONAN, Taiwan Nôji-Hô, 129, p. 149 (1925).

Fundort: Formosa (Taihoku, Shinka, Tainan, Horisha); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Dr. T. SHIRAKI, S. TAKANO, I. NITÔBE und dem Verfasser. Parasit von *Naranga aenescens* MOOR.

T. N.: *Hônen-tawara-bachi*.

### Gattung *Campoplex* GRAVENHORST

*Campoplex* GRAVENHORST, Ichn. Eur., III, p. 453 (1829).

Übersicht der Arten

1. Bohrer so lang wie der Hinterleib ..... *hakonensis* ASHMEAD  
—Bohrer viel kürzer als der Hinterleib ..... 2.
2. Areola im Vorderflügel nicht gestielt ..... 3.  
—Areola im Vorderflügel mehr oder weniger gestielt ..... 4.
3. Hinterleib grösstenteils rot ..... *subrubrus* sp. nov.  
—Hinterleib nur in der Mitte rot. *subrubrus* UCHIDA var. *jozanus* var. nov.
4. Der 2te rücklaufende Nerv mündet vor der Mitte der Areola. Legescheide etwas länger als das erste Hinterleibssegment ..... *longicaudus* sp. nov.  
—Der 2te rücklaufende Nerv mündet in der Mitte der Areola. Legescheide kürzer als das erste Hinterleibssegment ..... 5.
5. Postpetiolus ein wenig breiter als der Petiolus ..... 6.  
—Postpetiolus deutlich breiter als der Petiolus ..... 8.
6. Die Hinterschienen zum grössten Teil gelb ..... *matsumuræ* nom. nov.  
—Die Hinterschienen grösstenteils schwarz ..... 7.
7. Nur das 3te Hinterleibssegment rot ..... *sachalinensis* sp. nov.  
—Das 3te und 4te Hinterleibssegment rot ..... *yezoensis* sp. nov.
8. Metathorax lang, hinten nicht eingedrückt ..... *bicoloripes* ASHMEAD  
—Metathorax kurz, der Länge nach deutlich eingedrückt  
..... *daisetsuzanus* sp. nov.

144.\* *Campoplex hakonensis* ASHMEAD

*Campoplex hakonensis* ASHMEAD, Proc. U.S. Nat. Mus., XXX, p. 184, ♀ (1906).

Fundort: Honshu (Hakone).

T. N.: *Usu-amebachi*.

145. *Campoplex subrubrus* sp. nov.

♂, ♀. Kopf hinten verschmälert, deutlich schief; Schläfen breit, zerstreut punktiert; Stirn und Gesicht dicht punktiert und pubescent, die erstere in der Mitte schwach eingedrückt, mit schwacher Längslinie; Clypeus vorn abgestutzt; Mandibeln dick, mit 2 gleichen Zähnen. Fühler kräftig, fast von Körperlänge. Mesonotum ganz matt, dicht punktiert; Pleuren schwach glänzend, zerstreut punktiert; Schildchen rundlich konvex, nur an der Basis gerandet; Metathorax dicht fein runzelig punktiert, hinten schwach längsgefurcht. Hinterleib stark komprimiert; Nervulus weit hinter der Gabel; Nervellus in der Mitte gebrochen. Beine normal; Klauen kaum gekämmt.

Schwarz. Mandibeln zum Teil, die Vorderschenkel vorn, deren Schienen und Tarsen und die Mittelschienen und -tarsen gelbbraun, die Hinterschienen und -tarsen schwarzbraun; das 2te Hinterleibssegment am Ende, das 3te ganz und das 4te an der Basalhälfte rot.

Länge: ♀ 12 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren vom Verfasser; das Männchen noch nicht bekannt.

T. N.: *Onaga-usu-amebachi*.

147. *Campoplex sachalinensis* sp. nov.

♀. Kopf hinten rundlich verengt; Stirn und Gesicht stark punktiert und dicht weiss pubescent; Clypeus vorn abgestutzt; Mandibeln normal. Antennen fast von Körperlänge. Thorax matt, dicht punktiert; Schildchen konvex; Metathorax dicht fein runzelig, kurz, hinten abfallend. Flügel hyalin; Stigma schwarz; Nerven schwarzbraun; Areola kurz gestielt; Nervellus weit unter der Mitte gekrümmt. Hinterleib von der Seite zusammengedrückt, glatt und matt; Postpetiolus stark komprimiert; Legescheide kurz vorragend. Beine verhältnismässig kurz, schlank; Klauen gekämmt.

Schwarz. Die Vorderschenkel vorn, Schienen und Tarsen ganz gelbbraun, die Mittelschienen schwarzbraun; Hinterleib ausgedehnt schwarz, nur das 3te Segment vorwiegend hellrot, das 2te am Hinterende schmal rot gesäumt. Länge: ♀ 11 mm.

Fundorte: Sachalin (Ichinosawa), Hokkaido (Sapporo); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren von T. TAMANUKI und dem Verfasser; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Karafuto-usu-amebachi*.

148. *Campoplex yezoensis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 9, ♂)

♀, ♂. Kopf nach hinten verschmälert; Stirn fein runzelig; Gesicht mit dichter Punktierung und weisser Pubescenz; Mandibeln dick. Antennen fast von Körperlänge. Thorax matt; Mesonotum punktiert; Pleuren runzelig punktiert, schwach glänzend; Schildchen rundlich erhaben, zerstreut punktiert; Metathorax runzelig, der Länge nach eingedrückt, der Eindruck mit feinen Querrunzeln.

Flügel gelblich, hyalin; Stigma schwarzbraun; Areola kurz gestielt, Nervellus unter der Mitte gebrochen. Klauen nicht gekämmt. Hinterleib von der Seite zusammengedrückt, glatt; das erste Segment linear; Bohrer so lang wie das 3te Segment.

Schwarz. Mandibeln in der Mitte und das Labrum gelb; die Vorderschenkel vorn, Schienen und Tarsen ganz, die Mittelschienen vorn gelbbraun, die Mitteltarsen schwarzbraun. Hinterleib schwarz; das 2te Segment am Endrande, das 3te und 4te ganz und das 5te

am Basalrande rot. Länge: ♀♂ 11–13 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo, Garugawa, Otaru, Teshio); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren vom Autor.

T. N.: *Yezo-usu-amebachi*.

149. *Campoplex bicoloripes* ASHMEAD

*Campoplex bicoloripes* ASHMEAD, Proc. U.S. Nat. Mus., XXX, p. 184, ♂ (1906).

Fundort: Honshu (der Berg Takao in der Präf. Tōkiō); nur ein ♂ Exemplar wurde von C. TERANISHI gefunden; das Weibchen unbekannt.

T. N.: *Ō-usu-amebachi*.

150. *Campoplex daisetsuzanus* sp. nov.

♀. Stirn kaum gerunzelt; Gesicht dicht punktiert und weiss behaart; Clypeus am Vorderrande abgestutzt; Mandibeln normal. Antennen ziemlich kräftig, fast so lang wie der Körper. Thorax punktiert; Schildchen konvex, runzelig punktiert, nur an der Basis gerandet; Metathorax kurz, hinten breit und tief eingedrückt. Flügel fast hyalin; Areola gestielt; Nervellus weit hinter der Mitte gebrochen; Stigma und Nerven schwarzbraun. Beine kurz, ziemlich dick. Postpetiolus deutlich breiter als der Petiolus. Legescheide etwas vorragend.

Schwarz. Mandibeln grösstenteils rein gelb; die beiden Palpen, die Vorderschenkel vorn, Schienen und Tarsen ganz, die Mittelschienen zum Teil rötlichgelb; die Mittelschenkel vorn an den Spitzen, Tarsen ganz und die Hinterschienen in der Mitte dunkelbraun. Das 2te Segment des Hinterleibs am Endrande, das 3te und 4te grösstenteils rot. Länge: ♀ 12 mm.

Fundort: Hokkaido (der Berg Daisetsu); gesammelt in 3 ♀ Exemplaren vom Verfasser; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Daisetsu-usu-amebachi*.

151. *Campoplex matsumurae* nom. nov.

*Mesochorus japonicus* MATSUMURA, THOUS. Ins. Jap. Suppl., IV, p. 117, Pl. XLVIII, Fig. 7, ♀ (1912).

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, Jōzankei, Obihiro), Honshu (Aomori, Saitama, Nikko); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, S. HIRAYAMA und dem Autor.

T. N.: *Yokohira-himebachi*.

152.\* *Campoplex japonicus* CAMERON

*Campoplex japonicus* CAMERON, Entom., XXXIX, p. 99, (1906).

Fundort: Honshu (Kōbe).

153.\* *Campoplex albimanus* WALKER

*Campoplex albimanus* WALKER, Cist. Ent., XI, p. 306 (1874).

Fundort: Honshu (genauer Fundort nicht angegeben).

T. N.: *Shiroashi-usu-amebachi*.

Gattung *Sagarites* HOLMGREN

*Sagarites* HOLMGREN, Oefvers. Svensk. Vet.- Akad. Förh., XV, p. 325 (1858).

154.\* *Sagarites ventralis* WALKER

*Sagarites ventralis* WALKER, Cist. Ent., XI, p. 307 (1874).

Fundort: Honshu.

T. N.: *Kiguchi-usu-amebachi*.

Gattung *Trophocampa* SCHMIEDEKNECHT

*Trophocampa* SCHMIEDEKNECHT, Hym. Mitteleur., p. 598 (1907).

155. *Trophocampa teshionis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 6, ♂)

♀, ♂. Kopf hinter den Augen deutlich schief, verengt; Stirn zerstreut und Gesicht dicht punktiert; Clypeus vorn abgestutzt; Mandibeln kräftig, mit 2 gleichen Zähnen; Nebenaugen klein; Augen gross, innen an der Basis des Fühlers stark ausgerandet. Thorax robust und breiter als der Kopf, dicht runzelig punktiert; Schildchen konvex, an der Basis seitlich gerandet; Metathorax auffallend kurz, der Länge nach eingedrückt, hinten deutlich abfallend; Felder ganz fehlend; Luftlöcher linear. Hinterleib komprimiert; Postpetiolus deutlich breiter als der Petiolus; Thyridien gross, nicht tief; Bohrer kurz vorragend. Flügel fast hyalin; Stigma schmal, schwarzbraun; Areola sehr klein, deutlich lang gestielt; Discocubitalnerv in der Mitte stark gebogen oder selten winklig gekrümmt; Nervulus hinter der Gabel; Nervellus nicht gebrochen, in seltenen Fällen weit hinter der Mitte gekrümmt. Beine verhältnismässig kurz und dick; Klauen gekämmt. Fühler ziemlich kräftig, fast von Körperlänge.

Färbung schwarz und matt. Mandibeln zum grössten Teil dunkelbraun; die Vorderschenkel mit Ausnahme der Basis, deren Schienen und Tarsen, die Mittelschienen und -tarsen gelbbraun, die Hinterschienen an der Basalhälfte schwarzbraun; das 2te und 3te Hinterleibssegment rot, das erstere auf der Rückenseite an der Basis und das letztere am Hinterrande verdunkelt.

Länge: ♀♂ 10–12 mm.

Fundort: Hokkaido (Teshio, Sapporo, Jôzankei, Garugawa, Asahigawa); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren vom Verfasser.

T. N.: *Enaga-usu-amebachi*.

**Gattung *Rhythmonotus* FÖRSTER**

*Rhythmonotus* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 151 (1863).

156. *Rhythmonotus takagii* MATSUMURA

*Casitaria atrata* TAKAGI (nec MORLEY), Chosen Ringyo-Shikenjo Hôkoku, II, p. 38, Pl. IV, Fig. 1, ♀ (1925).

*Casitaria takagii* MATSUMURA, Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., XVIII, p. 28, ♀ (1926).

Fundorte: Honshu (Misaki), Korea (Suigen, Keijô); gesammelt in zahlreichen ♀♂ Exemplaren von Dr. S. MATSUMURA, G. TAKAGI, K. SATÔ und S. ITÔ. Sie schmarotzt in der Larve von *Dendrolimus spectabilis* BUTL.

T. N.: *Matsukemushi-yadori-amebachi*.

**Gattung *Casitaria* HOLMGREN**

*Casitaria* HOLMGREN, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh., XV, p. 325 (1858).

157. *Casitaria albibasalis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 25, ♀)

♀. Kopf kurz, quer, hinten ganz schief, stark verengt; Stirn und Gesicht dicht runzelig punktiert, die erstere kaum eingedrückt, das letztere flach; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, am Vorderende abgerundet; Mandibeln kräftig, mit 2 gleichen Zähnen. Augen innen neben der Fühlerbasis ziemlich tief ausgerandet. Fühler fadenförmig, etwas kürzer als der Körper. Mesonotum ohne Parapsidenfurchen, dicht fein runzelig punktiert, matt; Schildchen kaum gewölbt; Metathorax ziemlich lang, in der Mitte mit schwacher Längsfurche, deutlich dicht fein gerunzelt; Luftlöcher rundlich. Hinterleib glatt; Bohrer fast versteckt. Flügel hyalin; Stigma und Nerven dunkelbraun; Areola kurz gestielt, den rücklaufenden Nerv fast in der Mitte aufnehmend; Basalnerv schräg; Endabschnitt des Radius nur wenig länger als der Basalabschnitt; Nervellus nicht gebrochen. Schienenendsporen sehr lang.

Schwarz und ganz matt. Mandibel zum grössten Teil, die beiden Palpen, Trochantern, die Vorder- und Mittelschienen, Tarsen und Schenkel an der Spitze und Basis, sowie auch die Hinterschenkel, -schienen und -tarsen an der Basis und alle Schienenendsporen weiss, die Hintertrochantern an der Basis verdunkelt; alle Schenkel

grösstenteils gelbrot, nur die hintersten an den Spitzen schwärzlich, deren Schienen in der Mitte gelblichweiss, am Ende schwärzlich. Hinterleib grösstenteils schwarz, das 2te Segment am Ende, das 3te ausgenommen die Basis, das 4te grösstenteils und das 5te mit Ausnahme der Rückenseite rot. Länge: ♀ 6-7 mm.

Fundorte: Honshu (Iwate), Korea (Suigen); 2 ♀ Exemplare wurden von T. OGASAWARA und T. KURISUE erbeutet; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Sakibuto-usu-amebachi*.

#### Gattung *Melalophacharops* gen. nov.

Kopf deutlich schmaler als der Thorax, hinten ganz schief; Schläfen nicht aufgetrieben; Clypeus vorn abgestutzt, nicht vom Gesicht getrennt; Ocellen klein; Augen gross, innen an der Fühlerbasis ziemlich tief ausgerandet. Fühler verhältnismässig kräftig, etwas kürzer als der Körper. Thorax robust; Parapsidenfurchen ganz fehlend; Schildchen schwach konvex, an den Seiten nicht gerandet; Metathorax deutlich kurz, hinten abfallend, die Felderung unvollständig; Luftlöcher des Metathorax länglich oval. Das erste Hinterleibssegment am Ende deutlich deprimiert; Petiolus abgeplattet, breiter als hoch, das 2te und 3te Segment an der Basalhälfte deprimiert, das letztere an der Spitzenhälfte und die übrigen Segmente schwach seitlich zusammengedrückt; Bohrer fast versteckt. Areola im Vorderflügel ganz fehlend; Nervellus nicht gebrochen. Beine kurz und ziemlich dick, besonders die hintersten; Schienenendsporen sehr lang, kaum kürzer als der Metatarsus wie bei der Gattung *Echthronomas* FÖRST.; Klauen dicht gekämmt.

Genotype: *Melalophacharops tamanukii* UCHIDA.

Sie ähnelt auf den ersten Blick *Zacharops* VIERECK und *Echthronomas* FÖRST., unterscheidet sich aber von der ersteren durch das deprimierte 2te Segment und von der letzteren durch den Flügel, in welchem die Areola ganz fehlt.

#### 158. *Melalophacharops tamanukii* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 7, ♀)

♀, ♂. Kopf von oben gesehen deutlich dünn und etwas schmaler als der Thorax, hinten ganz schief; Schläfen nicht aufgetrieben, glatt; Scheitel, Stirn und Gesicht dicht punktiert, das letztere weiss pubescent; Clypeus nicht vom Gesicht getrennt, am

Vorderrande abgestutzt; Mandibeln kräftig, mit 2 kleinen gleichen Zähnen; Palpen kurz; Ocellen klein; Augen innen tief ausgerandet. Fühler dick, etwas kürzer als die Körperlänge. Thorax robust; Mesonotum dicht runzelig punktiert, matt; Pleuren schwach glänzend, zum Teil fein längsgerunzelt; Schildchen etwas konvex, nur an der Basis seitlich gerandet, dicht grob runzelig punktiert; Metathorax kurz; Felder nicht vollständig; Costula kräftig; Luftlöcher länglich oval. Hinterleib glatt, das erste Segment abgeplattet; Luftlöcher hinter der Mitte liegend; das 2te ganz und das 3te an der Basalhälfte deprimiert, die übrigen schwach komprimiert; Thyridien rundlich; Bohrer fast versteckt. Flügel hyalin; Stigma und Nerven schwarz; Radialzelle schmal und lang; Areola fehlt ganz; Nervulus fast interstitial; Nervellus nicht gebrochen; alle Nerven im Hinterflügel gegen die Spitzen erloschen. Beine kurz und dick; Schienensporen lang, kaum kürzer als der Metatarsus; Klauen gekämmt.

Schwarz. Mandibeln grösstenteils gelbbraun, an den Spitzen braun; die beiden Palpen weisslichgelb; die Vorder- und Mitteltrochantern und Flügelwurzel rein gelb, aber die Mitteltrochantern an der Basis dunkelbraun; die Vorder- und Mittelbeine gelbrot, deren Schienen auf der Hinterseite schwärzlich, die Hinterschienen und -schenkel am Ende rotbraun, deren Tarsen schwarzbraun; Tegulen schmutziggelb. Hinterleib etwas glänzend, vorwiegend schwarz bis schwarzbraun, aber das erste Segment am Hinterrande stets braun gesäumt. Länge: ♀♂ 7-7.5 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); 7 (2 ♂, 5 ♀) Exemplare gesammelt von S. TAKANO, K. TAMANUKI und dem Verfasser. Sie entwickelt sich aus der Puppe von *Melalopha anastomosis* L.

T. N.: *Seguro-shachihoko-amebachi*.

### Gattung *Diocetes* FÖRSTER

*Diocetes* FÖRSTER, Verh. Naturh. Preuss. Rheinl., XXV, p. 153 (1868).

#### Übersicht der Arten

Hinterleib mit Ausnahme der Basis rot ..... *vulgaris* MORLEY  
 —Hinterleib zum grössten Teil schwarz ..... *lineatus* ISHIDA

#### 159. *Diocetes vulgaris* MORLEY

*Diocetes vulgaris* MORLEY, Ind. Faun. Hym., 111, p. 472, ♀♂ (1913).

Fundort: Formosa (Hoppono, Kankô); 2 ♀ Exemplare gesammelt von Prof. S.

MATSUMURA.

Sonstiger Fundort: Indien.

T. N.: *Taiwan-akahara-chibi-amebachi*.160. *Diocetes lineatus* ISHIDA

*Anomalon lineatum* ISHIDA, Kansho Meichu Chosa Hôkoku, 1, p. 102; 11, Pl. XV, Fig. 1, ♀ (1916); SONAN, Taiwan Nôji-Hô, p. 610 (1922).

Fundort: Formosa (Shinka); 5 (3 ♂, 2 ♀) Exemplare wurden von S. TAKANO gesammelt. Diese ist Parasit von *Eucosma schistaceana* SNELL.

T. N.: *Kurohoso-yadori-amebachi*.Gattung *Limnerium* ASHMEAD

*Limneria* HOLMGREN (nec ADAMS), Oefvers. Sv. Vet.-Ak. Förh., p. 326 (1858).

*Limneria* THOMSON (non HOLMGREN), Opusc. Ent., XI, p. 1103 (1887).

*Limnerium* ASHMEAD, Canad. Ent., XXXII, p. 368 (1900).

*Eulimneria* SCHMIEDEKNECHT, Hym. Mitteleur., p. 184 (1909).

## Übersicht der Arten

Das 2te Hinterleibssegment am Endrande rot; die Vorderhüften nicht ganz gelblichweiss ..... *exartemæ* sp. nov.

– Hinterleib ganz schwarz; die Vorder- und Mittelhüften gelblichweiss

..... *ishiyamanum* sp. nov.

161. *Limnerium exartemæ* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 8, ♀)

♀. Kopf hinten deutlich schief, glatt, graulichweiss pubescent; Stirn spärlich und Gesicht dicht fein gerunzelt; Clypeus vorn breit abgerundet; Mandibeln mit 2 kleinen Zähnen. Antennen kürzer als Körper, mässig dick. Augen innen schwach ausgerandet. Thorax weisslich behaart wie beim Kopf; Mesonotum dicht fein punktiert, matt; Pleuren glänzend, punktiert; Speculum gross und stark glänzend; Schildchen rundlich konvex; Metathorax kurz, der Länge nach deutlich ausgehöhlt; Metanotum fein quengerunzelt; Metapleuren fein punktiert; Luftlöcher rund. Hinterleib glatt, von der Seite schwach zusammengedrückt, das erste Segment am Ende sehr breit, das 2te länger als breit; Bohrer fast so lang wie die halbe Hinterleibslänge. Flügel hyalin; Nerven und Stigma dunkelbraun; Areola gestielt; Nervulus etwas postfurcal; Nervellus nicht gebrochen, schief. Beine ziemlich kurz und dick.

Schwarz und matt. Tegulen, Flügelwurzel, Mandibeln in der Mitte breit, die beiden Palpen, die vier Vordertrochantern, die Hintertrochantern nur an den Spitzen, deren Schienen an der Basis und Mitte, alle Schienensporen, die 4 Hintertarsenglieder nur

an der Basis gelblichweiss; die Vorderhüften schwarz, aber unten mit weissem Fleck, die mittleren unten ganz gelblichrot, die hintersten von der Grundfarbe; alle Schenkel, die Vorder- und Mittelschienen, Tarsen und die Hintertrochantern oben hellrot, die Hinterschienen am Ende etwas verdunkelt. Hinterleib ausgedehnt schwarz, nur das 2te Segment am Hinterrande dunkelrot.

Länge: ♀ 7 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); gesammelt in 2 ♀ Exemplaren von K. TAMANUKI, das Männchen unbekannt. Diese Art entwickelt sich aus der Puppe von *Exartema mori* MATS.

T. N.: *Kuwahamaki-yadori*.

162. *Limmerium ishiyamanum* sp. nov.

♀. Der Färbung und Zeichnung nach der vorigen Art sehr ähnlich; sie weicht aber durch die folgenden Merkmale ab:

1. Kopf nach hinten rundlich verschmälert.
2. Stigma im Vorderflügel blassgelb.
3. Die Vorder- und Mittelhüften ganz gelblichweiss.
4. Die Hintertrochantern an der Basis schwarz; deren Schienen an den Spitzen nicht verdunkelt.
5. Jedes Glied der Hintertarsen nur an der Spitze bräunlich.
6. Hinterleib ganz schwarz.
7. Bohrer kürzer als der halbe Hinterleib. Länge: ♀ 6.5 mm.

Fundort: Hokkaido (Ishiyama); nur ein ♀ Exemplar wurde von Prof. Dr. S. MATSUMURA gesammelt; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Ishiyama-chibi-amebachi*.

**Gattung *Charops* HOLMGREN**

*Charops* HOLMGREN, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh., XV, p. 324 (1853).

163.\* *Charops(?) luteipes* WALKER

*Charops(?) luteipes* WALKER, Cist. Ent., XI, p. 307 (1874).

Fundort: Honshu.

T. N.: *Kiashi-himebachi*.

**TRIBUS PRISTOMERINI**

**Gattung *Pristomerus* CURTIS**

*Pahymerus* GRAVENHORST (partim), Ichn. Eur., 111, p. 721 (1829).

*Pristomerus* CURTIS, Brit. Ent., XIII, p. 624 (1836).

164. *Pristomerus ruftabdominalis* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 14, ♀)

♀. Kopf kaum punktiert, matt; Scheitel breit; Schläfen schmal und schief; Gesicht dicht grob punktiert, weisslich pubescent; Clypeus rundlich konvex, vorn abgerundet; Mandibeln kräftig, zweizählig; Augen bedeutend gross; Nebenaugen klein. Antennen fadenförmig, etwas kürzer als der Körper; einige Basalglieder viel länger als breit. Thorax dicht grob punktiert; Schildchen ganz glatt, stark glänzend, flach, an den Seiten nicht gerandet; Parapsidenfurchen deutlich tief angedeutet; Speculum gross; Metathoracalfelder vollständig, Area superomedia pentagonal, fast 2 mal so lang wie breit; Luftlöcher des Metathorax klein, elliptisch. Hinterleib komprimiert, glatt; Postpetiolus, das 2te Segment auf der Rückenseite und das 3te nur an der Basis dicht fein längsgerunzelt; Legescheide fast so lang wie der Hinterleib. Flügel hyalin, am Randmal verdunkelt; Stigma kurz und breit; Radialzelle kurz; der Basalabschnitt des Radius viel kürzer als der Endabschnitt; Nervulus interstitial; der 2te rücklaufende Nerv weit hinter dem inneren Cubitalnerv; Areola ganz fehlend; Nervellus nicht gebrochen, aber hinter der Mitte gekrümmt. Beine ziemlich kräftig; die Hinterschenkel auf der Unterseite hinter der Mitte mit einem kräftigen schrägen Zahn; zwischen diesem und der Spitze fein kerbzählig; Klauen gekämmt.

Schwarz. Die inneren Augenränder zum Teil dunkel rotbraun; Schaft und Clypeus rotgelb; die beiden Palpen, Mandibeln ausgenommen die Endzähne, die Vorder- und Mittelbeine ganz oder zum grössten Teil und Tegulen gelb; die Hinterbeine gelbrot, Hüften oben, Schenkel nahe dem Ende, Schienen an der Spitze und Basis und die Tarsen verdunkelt. Hinterleib gelblichrot; Petiolus hellgelb; Postpetiolus, das 2te Segment ganz und das 3te an der Basalhälfte schwarz; Bohrer schwarz. Stigma und Nerven schwarzbraun. Länge: ♀ 8 mm.

Fundort: Hokkaido (Sapporo); 2 ♀ Exemplare wurden am 13. August 1925 vom Verfasser gesammelt; das Männchen unbekannt.

T. N.: *Toge-chibi-amebachi*.

## TRIBUS PORIZONINI

Gattung *Diaparsis* FÖRSTER

*Diaparsis* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 149 (1868).

Übersicht der Arten

Körper und Hinterleib gelbrot ..... *japonicus* ASHMEAD  
— Körper und Hinterleib grösstenteils schwarz ..... *coreanus* sp. nov.

165. *Diaparsis japonicus* ASHMEAD

(Taf. VI, Fig. 28, ♀)

*Temelucha japonicus* ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXX, p. 185, ♀ (1906).

Fundorte: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kiushu und Korea. Diese ist sehr häufig in Japan; Schmarotzer von *Chilo simplex* BUTL.

T. N.: *Kibara-amebachi*.

166. *Diaparsis coreanus* sp. nov.

(Taf. VI, Fig. 16, ♀)

♀, ♂. Kopf quer, glatt und ganz matt, nach hinten etwas rundlich verschmälert; Scheitel breit; Schläfen sehr schmal; Stirn nicht eingedrückt; Gesicht fein punktiert, in der Mitte schwach gewölbt; Augen gross, innen nicht ausgerandet; Nebenaugen klein, beim Männchen deutlich grösser als die des Weibchens; Clypeus getrennt vom Gesicht durch die Querfurche, konvex, vorn abgerundet; Mandibeln kurz und dick, mit 2 kleinen gleichen Zähnen. Antennen fadenförmig, schlank, kürzer als der Körper. Thorax gestreckt, dicht punktiert; Parapsidenfurchen vorn deutlich tief angedeutet; Schildchen flach, an den Seiten nicht gerandet; Metathorax lang, vollständig gefeldert, Area superomedia fast 2 mal so lang wie breit, pentagonal; Luftlöcher rund. Hinterleib stark zusammengedrückt, glatt, der Postpetiolus und das 2te Segment dicht fein längsgestreift; Bohrer etwas kürzer als der Hinterleib; Petiolus flach; das 2te Segment so lang wie das erste. Flügel hyalin; Stigma kurz und breit; Radialzelle dreieckig, der Endabschnitt des Radius fast gerade; Nervulus interstitial; Nervellus nicht gebrochen. Klauen nicht gekämmt.

Schwarz. Augenränder breit, Clypeus, Wangen, Mandibeln ausgenommen die Endzähne, die beiden Palpen, Schaft unten, Prothorax zum grössten Teil, Mesonotum vorn beiderseits, Parapsidenfurchen, Schildchen, alle Hüften, Trochantern und Tegulen rein gelb; die sämtlichen Beine gelbrot, aber die Hinterschienen an der Basis und Spitze, deren Tarsen dunkel gelbbraun; Gesicht in der Mitte schwarzbraun. Stigma und Nerven schwärzlich; die folgenden Segmente des Hinterleibs vom 3ten bis letzten, mit Ausnahme der Rückenseiten, rotbraun, das 2te auf der Unterseite gelb. Fühler

schwarz, unten gegen die Basis braun.

Länge: ♀♂ 9–11 mm. Bohrer: ♀ 6 mm.

Fundorte: Kiushu (Kumamoto), Korea (Onsëiri); 2 (1 ♀, 1 ♂)  
Exemplare wurden von T. KURISUE und H. KAWAMURA gesammelt.

T. N.: *Chosen-chibi-amebachi*.

166a. *Diaparsis coreanus* UCHIDA

var. *kondonis* var. nov.

♀, ♂. Sie weicht von der typischen Art durch die folgenden Merkmale ab:

1. Gesicht ganz rein gelb.

2. Pro- und Metathorax, sowie auch die Mesopleuren rötlich-gelb, der mittlere beim Weibchen an der Basis beiderseits mit einem schwarzen Fleck; beim Männchen das Metanotum grösstenteils schwarz.

Länge: ♀♂ 10–11 mm.

Fundort: Süd-Mandschurei (Kinshu); gesammelt in 2 (1 ♀, 1 ♂)  
Exemplaren von T. KONDÔ. Diese ist Schmarotzer von *Nephopteryx pirivorella* MATS.

### TRIBUS PLECTISCINI

#### Gattung *Ateleute* FÖRSTER

*Ateleute* FÖRSTER, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., XXV, p. 171 (1868).

167.\* *Ateleute pallidipes* ASHMEAD

*Ateleute pallidipes* ASHMEAD, Proc. U. S. Nat. Mus., XXX, p. 186, ♂ (1906).

Fundort: Japan (genauer Fundort nicht angegeben).

T. N.: *Keshi-hirata-amebachi*.

### GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG

Von den Ophioninen Japans besitzen wir 164 Arten und 29 Varietäten, von welchen 27 Arten und 5 Varietäten in Sachalin, 12 Arten und 5 Varietäten in den Kurilen, 65 Arten und 13 Varietäten in Hokkaido, 69 Arten und 14 Varietäten in Honshu, 12 Arten und 5 Varietäten in Shikoku, 14 Arten und 6 Varietäten in Kiushu, 14 Arten auf den Riukiu-Inseln, 46 Arten und 9 Varietäten in Formosa und 34 Arten und 3 Varietäten in Korea gesammelt wurden.

Die folgende Liste zeigt die geographische Verbreitung der Arten und Varietäten von Ophioninen des Japanreiches.









NAME DER ARTEN	FUNDORTE							Sonstige Fundorte
	Sachalin	Kurilen	Hokkaido	Honshu	Shikoku	Kiushu	Riukiu-Inseln	
<i>Exochilum circumflexum</i> L. var. <i>rufomaculatum</i> UCH.					x	x	x	
<i>Heteropelma calcator</i> WESM.	x		x	x			x	Europa, Assam, Sikkim
<i>H. calcator</i> WESM. var. <i>flaviscutellum</i> UCH.			x				x	
<i>H. calcator</i> WESM. var. <i>elongatum</i> UCH.				x	x	x		
<i>H. fulvitaris</i> CAM.							x	Assam, Burma
<i>Trichomma enacator</i> ROSS.				x				Europa
<i>T. cnaphalocrocis</i> UCH.							x	
<i>Acanthostoma insidiator</i> SM.			x	x	x	x	x	
<i>Habronyx heros</i> WESM. var. <i>matsukemushi</i> MATS.		x						
<i>Formosanomalon baibarense</i> UCH.							x	
<i>Aphanistes jozankeanus</i> MATS.			x					
<i>A. jozankeanus</i> MATS. var. <i>nigricans</i> UCH.			x	x				
<i>A. orientalis</i> UCH.	x		x				x	
<i>A. orientalis</i> UCH. var. <i>asahidakeanus</i> UCH.			x					
<i>A. bellicosus</i> WESM.	x		x	x				Europa, Asien
<i>A. kankonis</i> UCH.							x	
<i>Anomalon moivanum</i> UCH.			x					
<i>A. hirayamaeum</i> UCH.				x				
<i>A. garugawense</i> UCH.			x					
<i>A. yanagiwaracum</i> UCH.				x				
<i>Labrorychus niikunii</i> UCH.				x				
<i>L. nikkonis</i> UCH.				x				
<i>L. yezonis</i> UCH.			x					
<i>Agrypon suzuki</i> MATS.				x		x		
<i>A. suzuki</i> MATS. var. <i>nigromaculatum</i> UCH.				x			x	

NAME DER ARTEN	FUNDORTE								Sonstige Fundorte	
	Sachalin	Kurilen	Hokkaido	Honshu	Shikoku	Kiushu	Rinkiu-Inseln	Formosa		Korea
<i>Agrypon kiushuense</i> UCH.						x				
<i>A. maruyamense</i> UCH.			x							
<i>A. nigrinotum</i> MATS. et UCH.						x	x			
<i>A. japonicum</i> UCH.			x	x						
<i>A. sapporensis</i> UCH.			x							
<i>A. gratiosum</i> END.								x		
<i>A. varitarsum</i> WESM.			x							Europa, Indien
<i>A. flavifrontatum</i> SM.			x	x						
<i>A. oyeyamense</i> UCH.				x						
<i>A. tamahonum</i> UCH.								x		
<i>A. daisetsuzanum</i> UCH.	x		x							
<i>A. flaveolatum</i> GRAV.	x		x					x		Europa
<i>A. elongatum</i> UCH.				x						
<i>Gongropelma taiense</i> UCH.								x		
<i>G. formosanum</i> END.								x		
<i>G. kikuchii</i> UCH.								x		
<i>Plesiophthalmus melanocephalus</i> HAB.			x							Europa
<i>P. alarius</i> GRAV.	x		x							Europa
<i>Astiphromma jezoense</i> UCH.			x	x						
<i>A. geniculatum</i> UCH.		x	x	x						
<i>Mesochorus iwataensis</i> UCH.			x							
<i>M. kuwayamae</i> MATS.	x									
<i>M. fulgurans</i> CURT.				x						Europa
<i>Tegona bimaculata</i> UCH.			x							
<i>Nawaia japonica</i> ASH.				x						

NAME DER ARTEN	FUNDORTE							Sonstige Fundorte
	Sachalin	Kurilen	Hokkaido	Honshu	Shikoku	Kjusiu	Riukiu-Inseln	
<i>Banchus monileatus</i> GRAV.				x				Europa
<i>B. falcatorius</i> F.	x							Europa
<i>Xenoschesis fulvipes</i> GRAV.			x					Europa
<i>X. crassicornis</i> UCH.							x	
<i>Exetastes ichneumoniformis</i> GRAV.			x					Europa, Sibirien
<i>E. karafutonis</i> UCH.	x							
<i>E. robustus</i> GRAV.			x					Europa
<i>E. cinctipes</i> RET.	x		x	x				Europa, Sibirien, Indien
<i>E. fornicator</i> F.							x	Europa, Indien
<i>E. miniatus</i> UCH.						x		
<i>E. longigenus</i> UCH.	x		x					
<i>E. fukuchiyamanus</i> UCH.				x				
<i>E. ishikawensis</i> UCH.				x				
<i>E. longipes</i> UCH.				x	x			
<i>Allexetastes coreanus</i> KOKJ.							x	
<i>A. komarovi</i> KOKJ.							x	
<i>Nothanomaloides matsuyamensis</i> UCH.					x			
<i>Zacharops naranga</i> CUSH.							x	
<i>Campoplex hakonensis</i> ASH.				x				
<i>C. subrubrus</i> UCH.				x				
<i>C. subrubrus</i> UCH. var. <i>jozanus</i> UCH.				x				
<i>C. longicaudus</i> UCH.				x				
<i>C. sachalinensis</i> UCH.	x							
<i>C. yezoensis</i> UCH.				x				
<i>C. bicoloripes</i> ASH.				x				

NAME DER ARTEN	FUNDORTE								Sonstige Fundorte	
	Sachalin	Kurilen	Hokkaido	Honshu	Shikoku	Kiushu	Riukiu-Inseln	Fornosa		Korea
<i>Campoplex daisetsuzanus</i> UCH.			x							
<i>C. matsumuræ</i> UCH.			x	x						
<i>C. japonicus</i> CAM.				x						
<i>C. albimanus</i> WK.				?						
<i>Sagarites ventralis</i> WK.				?						
<i>Trophocampa teshionis</i> UCH.			x							
<i>Rhythmonotus takagii</i> MATS.				x				x		
<i>Casinaria albibasalis</i> UCH.				x				x		
<i>Melalophacharops tamanukii</i> UCH.			x							
<i>Diocetes vulgaris</i> MORL.								x		Indien
<i>D. lineatus</i> UCH.								x		
<i>Limnerium exartemæ</i> UCH.			x							
<i>L. ishiyamanum</i> UCH.			x							
<i>Charops ?) luteipes</i> WK.				?						
<i>Pristomerus ruftabdominalis</i> UCH.			x							
<i>Diaparsis japonicus</i> ASH.			x	x	x	x		x		
<i>D. coreanus</i> UCH.								x		
<i>D. coreanus</i> UCH. var. <i>kondonis</i> UCH.										Süd-Mandschurei
<i>Ateleute pallidipes</i> ASH.				x						
GESAMTSUMME	32	17	78	83	17	20	14	55	37	

LITERATURVERZEICHNIS

- ASHMEAD, W. H.: Classification of the Ichneumon Flies, or the Superfamily Ichneumonidea (Proc. U.S. Nat. Mus., XVIII, 1900).
- : Notes on some New Zealand and Australian Parasitic Hymenoptera, with Descriptions of new Genera and new Species (Proc. Linn. Soc. New South Wales, 1900).
- : Fauna Hawaiiensis (1901).
- : Descriptions of new Hymenoptera from Japan (Proc. U. S. Nat. Mus., XXX, 1906).
- BRADLY, G. C.: The Status of *Parabates* FÖRSTER, and *Parabatus* THOMSON (Hymenoptera, Ichneumonidae) (Ann. Mag. Nat. Hist., III, 1919).
- BRIDGMAN, J. B.: Additions to the Rev. T. A. MARSHALL'S Catalogue of British Ichneumons (Trans. Ent. Soc. Lond. 1831-1889).
- CAMERON, P.: On some Hymenoptera from Japan and the Pacific (Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow, 1885).
- : Hymenoptera Orientalia, or Contribution to a Knowledge of the Hymenoptera of the Oriental Zoological Region (1897-1903).
- : Descriptions of new Genera and Species of Hymenoptera from India (Zeit. Hym.-und Dipt., III, 1903; IV, 1904).
- : Descriptions of some new Species of parasitic Hymenoptera, chiefly from the Shikkim Himalaya (Zeit. Hym.-und Dipt., V, 1905).
- : New Species of Hymenoptera from India (Entom., 1905).
- : On some Australian and Malayan parasitic Hymenoptera (Tijd. Ent., XLVIII, 1905).
- : Descriptions of two new Species of Ichneumonidae from Japan (Entom., 1906).
- : On some new Genera and Species of Indian Ichneumonidae (Entom., 1906).
- : On some undescribed phytophagus and parasitic Hymenoptera from the Oriental Zoological Region (Ann. Mag. Nat. Hist., XIX, 1907).
- : A Contribution to the Knowledge of the Hymenoptera of the Oriental Zoological Region (Ann. Mag. Nat. Hist., XX, 1907).
- CUSHMAN, R. A.: New Oriental and Australian Ichneumonidae (Phil. Journ. Sci., XX, 5, 1922).
- : On the Genera of Ichneumon-flies of the Tribe *Paniscini* ASHMEAD, with Descriptions and Discussion of related Genera and Species (Proc. U.S. Nat. Mus., LXIV, 1924).
- DALLA TORRE: Catalogus Hymenopterorum hucusque Descriptorum Systematicus et Synonymicus, III, 1-2, 1901-1902.
- ENDERLEIN, G.: Beiträge zur Kenntnis aussereuropäischer Ichneumoniden (Stett. Ent. Zeit., 82, 1921).
- FABRICIUS, J. C.: Entmologia Systematica (1792-1794).
- : Supplement Entmologia Systematica (1798).
- : Systema Eleutheratorum (1801).
- FONSCOLOMBE, M.: Ichneumologie Provençale ou Catalogue des Ichneumonidae qui se trouvent aux environs d'Aix, et Description des Espèces inédites (Ann. Soc. Ent. Fr., 1847-1854).

- GIRAUD, J.: Notes sur trois Hyménoptères Parasites (Ann. Soc. Ent. Fr., 1869).
- GRAVENHORST, J. L. C.: Ichneumonologia Europea (1829).
- HABERMEHL, H.: Über Ichneumoniden (Zeit. Hym.-und Dipt., III, 1903).
- : Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Ichneumonidenfauna (Konowia, I, 1922).
- HANDRISCH, A.: Handbuch der Entomologie, III, (1925).
- HANCOCK, G. L. R.: A preliminary Account of the Ichneumonidae of the Cambridge-shire Fens (Nat. Hist. Wicken Fen, II, 1925).
- HELLÉN, W.: Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finnlands (Act. Soc. Faun. et Flor. Fennica, 56, 1926).
- ISHIDA, S.: Kansho Meichu Chosa Hôkoku (Taiwan Sôtoku Shokusanakyoku Hôkoku, 88, 1-2, 1914).
- KOHL, F. F.: Faune du District de Walouyki du Gouvernement de Woronége (Russie), Hymenoptera, II (1913).
- KOKUJEW, N.: Hymenoptera Asiatica Nova (Rev. Russ. Ent., 1903-1906).
- : Duæ novæ Ichneumonidarum Species Russia Australis (Rev. Russ. Ent., 1906).
- KRIECHBAUMER, J.: Ichneumonidae nova exotica (Ber. Naturf. Ges. Leiptzig, 1892-1894).
- : Bemerkungen über Ophioniden (Zeit. Hym.-und Dipt., I, 1901).
- KRIEGER, R.: Zur Synonymik der Ichneumoniden, II (Zeit. Hym.-und Dipt., III-IV, 1903-1904).
- KUROIWA, H.: Provisional List of the Hymenoptera collected in Loochoo determined by Dr. S. MATSUMURA (1908).
- LINNÉ, C.: Systema Nature, ed. 10 (1758).
- : Fauna Suecica, ed. 11 (1761).
- MARSHALL, T. A.: A Catalogue of the British Hymenoptera: Chrysididae, Ichneumonidae, Braconidae, and Evaniidae, III (1872).
- : Notes on Part III of the Catalogue of British Insects published by the Ent. Soc. London; Hymenoptera (Trans. Ent. Soc. Lond., 1872).
- MATSUMURA, S.: Erster Beitrag zur Insekten-Fauna von Sachalin (Journ. Coll. Agr., Tohoku Imp. Univ., IV, I, 1911).
- : Thousand Insects of Japan, Supplement, IV (1912).
- : On the three Species of *Dendrolimus* (Lepidoptera), which attack Spruce- and Fir-trees in Japan, with their parasitic and predaceous Insects (Ann. Mus. Zool. Acad. Scien. Russ., XXXVI, 1925).
- : On the five Species of *Dendrolimus*, injurious to Conifers in Japan, with their parasitic and predaceous Insects (Journ. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., XVIII, I, 1926).
- et UCHIDA, T.: Die Hymenopteren-Fauna von den Riukiu Inseln (Insect. Matsumurana, I, 1-2, 1926).
- MORLEY, C.: British Ichneumons, III (1907); V (1913).
- : Revision of Ichneumonidae, I-IV (1912-1915).
- : Fauna British India, Hymenoptera, III, I (1913).
- PACKARD, A. S.: New Ichneumon Parasites of North American Butterflies (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., XXI, 1880).
- PERKINS, R. C. L.: On Hawaiian Ophioninae (Trans. Ent. Soc. Lond., 1914).
- PFANKUCH, K.: Die Typen der GRAVENHORST'schen Gattung *Banchus*, *Exetastes* and

- Leptobatus* (Jahres. Ver. Insek. Breslau, 1912).
- PFANKUCH, K.: Ichneumonologisches, Ophioninae (Konowia, II, 1923).
- POULTON, B.: Notes in 1887 upon Lepidopterous Larvae, &c., including a complete Account of the Life-history of the Larvae of *Sphinx convolvuli* and *Aglia tau* (Trans. Ent. Soc. Lond., 1888).
- RADOSZKOWSKI, O.: Hyménoptères de Corée (Horæ Soc. Ent. Russ., XXI, 1887).
- RATZEBURG, J. T. C.: Die Ichneumon der Forstinsekten in forstlicher und entomologischer Beziehung (1844-1853).
- ROMAN, A.: Die Ichneumonidentypen C. P. THUNBERGS (Zool. Bid. Fr. Uppsala, I, 1912).
- : Philippinische Schlupfwespen aus dem schwedischen Reichsmuseum, 1-2 (1913).
- : Beiträge zur schwedischen Ichneumonidenfauna (Archiv für Zool., 9, 1914).
- : Skånska parasisteklar (Ent. Tidsk., 1917).
- RUDOW: Die Ichneumonidengattung *Amblyteles* und ihre Wirte (Ent. Zeit. Frankfurt a. M., XXXI, 1914).
- SCHMIEDEKNECHT, O.: Die Ichneumonidentribus der Anomalinen (Zeit. Hym.-und Dipt., II-IV, 1902-1904).
- : Hymenoptera Mitteleuropas nach ihren Gattungen und zum grossen Teil auch nach ihren Arten analytisch bearbeitet (1907).
- : Opuscula Ichneumonologica, Ophioninae, XVIII-XXIX (1908-1911).
- : Die Schlupf- und Brackwespen (1914).
- SHESTAKOV, A.: Ad cognitionem specierum tribus Anomalonini (Ann. Zool. Acad. Sci. Russ., 1923).
- : Tabula diagnostica et species novae palaearticiere generis *Enicospilus* ФЕПН. (Konowia, V, 1926).
- : Ad cognitionem specierum tribus Ophinini (Konowia, V, 1926).
- SMITH, F.: Descriptions of new Species of *Tenthredinidae*, *Ichneumonidae*, *Chrysididae*, *Chalcididae*, *Formicidae*, &c., of Japan (Trans. Ent. Soc. Lond., 1874).
- SONAN, J.: Taiwan san Himebachi to sono Kishu (Taiwan Noji-Ho, 1921).
- : Kishu no hanmeiseru Rokushu no Himebachi ni tsuite (Taiwan Noji-Ho, 1925).
- : Sushu no Himebachi ni tsuite (Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIV, 1924).
- SZÉPLIGETI, G.: Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Ichneumoniden (Ann. Mus. Nat. Hung., I, 1899).
- : Übersicht der paläarktischen Ichneumoniden (Ann. Mus. Nat. Hung., III, 1905).
- : Genera Insectorum, 34 (1905); 114 (1911).
- TAKAGI, G.: Matsukemushi ni kansuru Hōkoku (Chosen-Ringyo-Shikenjō Hōkoku, II, 1925).
- THOMSON, C. G.: Opuscula Entomologica (1869-1897).
- : Notes Hyménopterologiques (Ann. Soc. Ent. Fr., 1885).
- TOSQUINET, J.: Documents pour servir à la Monographie des Ichneumonides de la Russie d'Asie (Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIII, 1889).
- VIERECK, H. L.: Type Specimens of the Genera of Ichneumonflies (Proc. U. S. Nat. Mus., 1914-1916).
- WALKER, F.: Descriptions of some Japanese Hymenoptera (Cist. Ent., XI, 1874).
- WHITMARSH, R. D.: North American Paniscini (Ann. Ent. Soc. Am., III, 1910).

**INHALTSVERZEICHNIS**

Seite		Seite		Seite	
240	Acanthostoma	236	circumflexum (Exochilum)	282	exartemae (Limmerium)
250	Agrypon	236	circumflexum var. dendrolimi (Exochilum)	266	Exetastes
209	ainoicus (Ophion)	237	circumflexum var. nigroscutellata (Exochilum)	236	Exochilum
260	alaricus (Plesiophthalmus)	236	circumflexum var. nipponicum (Exochilum)	265	falcatorius (Banchus)
279	albibasalis (Casinaria)	237	circumflexum var. rufomaculatum (Exochilum)	256	flaveolatum (Agrypon)
278	albimanus (Campoplex)	239	cnaphalocrocis (Trichomma)	254	flavifrontatum (Agrypon)
272	Allexetastes	224	combustus (Henicospilus)	221	flavocephalus (Henicospilus)
230	Allocamptus	224	combustus var. shikouensis (Henicospilus)	221	folicator var. coreanus (Nototrachys)
198	Amebachia	199	coreana (Amebachia)	231	folicator var. formosanus (Nototrachys)
233	amictum (Schizoloma)	235	coreanum (Schizoloma)	231	folicator var. japonicus (Nototrachys)
234	amictum var. intermedium (Schizoloma)	203	coreanus (Nipponophion)	240	Formosanomalon
234	amictum var. nigricoxalis (Schizoloma)	272	coreanus (Allexetastes)	258	formosanum (Gongropelma)
234	analis (Henicospilus)	235	coreanus (Diaparsis)	223	formosanus (Henicospilus)
225	Anomalon	233	coreanus var. infuscus (Nipponophion)	223	formosensis (Henicospilus)
244	Anomalonini	286	coreanus var. kondonis (Diaparsis)	268	fornicator (Exetastes)
242	Aphanistes	266	crassicornis (Xenoschesis)	270	fukuchiyamanus (Exetastes)
260	Astiphromma	196	cristatus (Parabatus)	263	fulgurans (Mesochorus)
286	Ateleute	196	cristatus var. japonicus (Parabatus)	265	fulvipes (Xenoschesis)
193	baibarana (Amebachia)	197	cristatus var. kikuchii (Parabatus)	238	fulvitarse (Heteropelma)
241	baibarensis (Formosanomalon)	256	daisetsuzanum (Agrypon)	216	fusco-maculatus (Henicospilus)
194	baibarensis (Parabatus)	277	daisetsuzanus (Campoplex)	246	garugawense (Anomalon)
263	Banchini	211	Dicamptus	257	Gongropelma
264	Banchus	284	Diaparsis	261	geniculatum (Astiphromma)
244	bellicosus (Aphanistes)	281	Diocetes	183	glaucopterus (Opheltes)
277	bicoloripes (Campoplex)	257	elongatum (Agrypon)	186	glaucopterus var. apicalis (Ophelte)
222	bifasciatus (Henicospilus)	238	emacescens (Henicospilus)	186	glaucopterus var. fuscus (Opheltes)
263	bimaculata (Tegona)	239	enecator (Trichomma)	187	glaucopterus var. major (Opheltes)
237	calicator (Heteropelma)	213	Eremotylus	187	gracilipes (Paniscus)
238	calicator var. elongatum (Heteropelma)	228		192	gracilipes var. formosus (Paniscus)
238	calicator var. flaviscutellum (Heteropelma)	239		192	gratiosum (Agrypon)
272	Campoplegini	233		254	
274	Campoplex	233			
235	capitatum (Schizoloma)	233			
192	capito (Paniscus)	233			
279	Casinaria	233			
208	castaneus (Ophion)	233			
188	cephalotes (Paniscus)	233			
283	Charops	233			
268	cinctipes (Exetastes)	233			

	Seite		Seite		Seite
grumi (Paniscus) . . . . .	190	lineatus (Diocetes) . . . . .	282	obscurus (Ophion) . . . . .	209
gyochiensis (Henicospilus) . . . . .	229	lineatus (Henicospilus) . . . . .	219	ocellaris (Paniscus) . . . . .	191
Habronyx . . . . .	240	longicornis (Pleuroneurophion) . . . . .	212	okinawensis (Henicospilus) . . . . .	227
hakonensis (Campoplex) . . . . .	275	longigenus (Exetastes) . . . . .	270	okunii (Ophion) . . . . .	207
Henicospilus . . . . .	214	longipes (Exetastes) . . . . .	271	opaculus (Paniscus) . . . . .	192
heros var. matsukemushii (Habronyx) . . . . .	240	luteipes (Charops(?)) . . . . .	283	Ophion . . . . .	204
Heteropelma . . . . .	237	luteus (Ophion) . . . . .	210	Ophionini . . . . .	200
hirayamaeum (Anomalon) . . . . .	246	maculifemoratus (Parabatus) . . . . .	193	Opheltes . . . . .	186
hokkaidonis (Ophion) . . . . .	205	maruyamanus (Henicospilus) . . . . .	220	orientalis (Allocomptus) . . . . .	239
ichneumoniformis (Exetastes) . . . . .	267	maruyamense (Agrypon) . . . . .	252	orientalis (Aphanistes) . . . . .	242
insidiator (Acanthotoma) . . . . .	240	matsumurae (Campoplex) . . . . .	277	orientalis var. asahidakeanus (Aphanistes) . . . . .	245
ishikawensis (Exetastes) . . . . .	271	matsuyamensis (Nothanomaloides) . . . . .	273	orientalis (Ophion) . . . . .	208
ishiyamanum (Limmerium) . . . . .	283	Melalophacharops . . . . .	280	orientalis (Paniscus) . . . . .	192
isshikii (Dicamptus) . . . . .	212	melanocephalus (Plesiophthalmus) . . . . .	259	orientalis (Stauropodotonus) . . . . .	213
iwatensis (Mesochorus) . . . . .	262	merdarius (Henicospilus) . . . . .	229	oyeyamense (Agrypon) . . . . .	254
japonica (Nawaia) . . . . .	264	Mesochorini . . . . .	259	pallidipes (Ateleutes) . . . . .	286
japonicum (Agrypon) . . . . .	252	Mesochorus . . . . .	262	Paniscini . . . . .	185
japonicus (Campoplex) . . . . .	277	miniatus (Exetastes) . . . . .	269	Paniscus . . . . .	187
japonicus (Diaparsis) . . . . .	285	moiwanum (Anomalon) . . . . .	245	Parabatus . . . . .	193
japonicus (Nephopheltes) . . . . .	187	monileatus (Banchus) . . . . .	265	Flectiscini . . . . .	286
jezoense (Astiphromma) . . . . .	260	mushanus (Henicospilus) . . . . .	216	Plesiophthalmus . . . . .	259
jozankeanus (Aphanistes) . . . . .	242	narangae (Zacharops) . . . . .	274	Pleuroneurophion . . . . .	212
jozankeanus var. nigricans (Aphanistes) . . . . .	242	Nawaia . . . . .	264	Porizonini . . . . .	284
kankonis (Aphanistes) . . . . .	244	Nephopheltes . . . . .	187	Pristomerini . . . . .	283
kanshirensis (Henicospilus) . . . . .	226	nigribasalis (Henicospilus) . . . . .	222	Pristomerus . . . . .	283
karafutonis (Exetastes) . . . . .	267	nigrinotum (Agrypon) . . . . .	252	pubibundae (Henicospilus) . . . . .	219
kikuchii (Gongropelma) . . . . .	258	nigriventris (Paniscus) . . . . .	190	pungens (Henicospilus) . . . . .	227
kiuhaboncs (Parabatus) . . . . .	195	nigropictus (Dicamptus) . . . . .	211	purpurascens (Thyreodon) . . . . .	200
kiushuense (Agrypon) . . . . .	251	nigropictus var. fuscus (Dicamptus) . . . . .	211	ramidulus (Henicospilus) . . . . .	225
komarovi (Allexetastes) . . . . .	272	nigrus (Paniscus) . . . . .	188	reticulatus (Henicospilus) . . . . .	227
kuwayamae (Mesochorus) . . . . .	262	niikunii (Labrorychus) . . . . .	248	Rhythmnotus . . . . .	279
Labrorychus . . . . .	248	nikkonis (Labrorychus) . . . . .	249	riukiensis (Henicospilus) . . . . .	227
laqueatus (Henicospilus) . . . . .	228	nikkonis (Ophion) . . . . .	204	robustus (Exetastes) . . . . .	268
latungula (Parabatus) . . . . .	197	Nipponophion . . . . .	231	rufabdrominalis (Pristomerus) . . . . .	284
Limmerium . . . . .	282	Nothanomaloides . . . . .	273	Sagarites . . . . .	278
		Nototrachini . . . . .	231	sakaguchii (Henicospilus) . . . . .	220
		Nototrachys . . . . .	231	sapporense (Agrypon) . . . . .	253


Inhaltsverzeichnis

3

Seite	.	Seite	Seite
sauteri (Henicospilus) . . . . .		taiwanus (Henicospilus) 226	Trophocampa . . . . . 278
schalinensis (Campoplex) 276		takagii (Rhythmnotus) 279	unicolor (Paniscus) . . . . . 189
Schizoloma . . . . . 233		takaozanus (Ophion) . . . . . 206	variegatus (Nippon-
semiopacus Henicos-		takaozanus (Paniscus) . . . . . 189	ophion) . . . . . 201
pilus) . . . . . 223		tamahonum (Agrypon) . . . . . 255	varitarsum (Agrypon) . . . . . 254
shinkanus (Henicospilus) 217		tamanukii (Melalophacha-	ventralis (Sagarites) . . . . . 278
sibiricus (Eremotylus) . . . . . 213		rops) . . . . . 180	virgatus (Parabatus) . . . . . 195
sibiricus var. japonicus		tarsatus (Parabatus) . . . . . 195	vulgaris (Diocetes) . . . . . 281
(Ophion) . . . . . 206		Tegona . . . . . 263	Xenoschesis . . . . . 265
smithii (Ophion) . . . . . 211		teshionis (Trophocampa) 278	yanagiwaraeum (Anoma-
Stauropodoctonus . . . . . 213		testaceus (Paniscus) . . . . . 190	lon) . . . . . 247
striatus (Henicospilus) . . . . . 218		testaceus var. nigrinotus	yezoensis (Campoplex) 276
subrubrus (Campoplex) 275		(Paniscus) . . . . . 191	yezoensis (Henicospilus) 227
suzukii (Agrypon) . . . . . 251		testaceus var. nigronotatus	yezonis (Labrorychus) . . . . . 249
suzukii var. nigromacula-		(Paniscus) . . . . . 191	yonezawanus (Henicos-
tum (Agrypon) . . . . . 251		Thyreodon . . . . . 200	pilus) . . . . . 218
tainanensis (Henicos-		Trichomma . . . . . 238	Zacharops . . . . . 247
pilus) . . . . . 225		triguttatus (Henicospilus) 221	
tainense (Gongropelma) 258		tristrigatus (Henicos-	
		pilus) . . . . . 220	


## Erklärung der Tafel V

1. *Parabatus cristatus* THOMS, var. *japonicus* UCH. (var. nov.) ♀
2. *Nipponophion* (gen. nov.) *variegatus* UCH. (sp. nov.) ♀
3. *Ophion okunii* UCH. (sp. nov.) ♀
4. *Nipponophion coreanus* UCH. (sp. nov.) ♀
5. *Henicospilus triguttatus* UCH. (sp. nov.) ♀
6. *Parabatus cristatus* THOMS, var. *kikuchii* UCH. (var. nov.) ♂
7. *Pleuroneurophion longicornis* UCH. (sp. nov.) ♀
8. *Henicospilus mushanus* UCH. (sp. nov.) ♀
9. *Parabatus maculifemoratus* UCH. (sp. nov.) ♀
10. *Henicospilus formosensis* UCH. (sp. nov.) ♀
11. *H. nigribasalis* UCH. (sp. nov.) ♀
12. *H. bifasciatus* UCH. (sp. nov.) ♀
13. *Schizoloma coreanum* UCH. (sp. nov.) ♂
14. *Formosanomalon* (gen. nov.) *baibarense* UCH. (sp. nov.) ♂
15. *Aphanistes orientalis* UCH. (sp. nov.) ♀
16. *Heteropelma calcator* WESM. var. *elongatum* UCH. (var. nov.) ♀
17. *Labrorychus nikkonis* UCH. (sp. nov.) ♂
18. *Agrypon oyeyamense* UCH. (sp. nov.) ♀
19. *Anomalon moiwanum* UCH. (sp. nov.) ♂
20. *Trichomma enaphalocrocis* UCH. (sp. nov.) ♀
21. *Agrypon japonicum* UCH. (sp. nov.) ♀
22. *A. tamahonum* UCH. (sp. nov.) ♀
23. *Aphanistes kankonis* UCH. (sp. nov.) ♀
24. *Agrypon daisetsuzanum* UCH. (sp. nov.) ♂
25. *Astiphromma jezoense* UCH. (sp. nov.) ♀
26. *Nototrachys folicator* F. var. *coreanus* UCH. (var. nov.) ♂
27. *Astiphromma geniculatum* UCH. (sp. nov.) ♂



## Erklärung der Tafel VI

1. *Ophion takaozanus* UCH. (sp. nov.) ♂
2. *Exetastes miniatus* UCH. (sp. nov.) ♀
3. *Tegona bimaculata* UCH. (sp. nov.) ♀
4. *Anomalon yanagiwaraeum* UCH. (sp. nov.) ♀
5. *A. garugawense* UCH. (sp. nov.) ♀
6. *Trophocampa teshionis* UCH. (sp. nov.) ♂
7. *Melalophichrops* (gen. nov.) *tamanukii* UCH. (sp. nov.) ♀
8. *Limmerium exartemae* UCH. (sp. nov.) ♀
9. *Campoplex yezoensis* UCH. (sp. nov.) ♂
10. *Exetastes longipes* UCH. (sp. nov.) ♀
11. *Gongropelma kikuchii* UCH. (sp. nov.) ♀
12. *Agrypnon elongatum* UCH. (sp. nov.) ♀
13. *Henicospilus taiwanus* UCH. (sp. nov.) ♀
14. *Pristomelus rufiabdominalis* UCH. (sp. nov.) ♀
15. *Exochilum circumflexum* L. var. *rufomaculatum* UCH. (var. nov.) ♀
16. *Diaparsis coreanus* UCH. (sp. nov.) ♀
17. *Paniscus takaozanus* UCH. (sp. nov.) ♂
18. *Amebachia* (gen. nov.) *baibarana* UCH. (sp. nov.) ♂
19. *Paniscus nigrus* UCH. (sp. nov.) ♀
20. *Xenoschesis crassicornis* UCH. (sp. nov.) ♀
21. *Exetastes fukuchiyamanus* UCH. (sp. nov.) ♀
22. *Henicospilus yezoensis* UCH. (sp. nov.) ♀
23. *Nolhanomaloides* (gen. nov.) *matsuyamensis* UCH. (sp. nov.) ♀
24. *Exetastes karfulonis* UCH. (sp. nov.) ♀
25. *Casinaria albibasalis* UCH. (sp. nov.) ♀
26. *Nephopheltes japonicus* CUSH. ♀
27. *Labrorychus yezonis* UCH. (sp. nov.) ♂
28. *Diaparsis japonicus* ASH. ♀



## Erklärung der Tafel VII

- |     |                              |                          |   |
|-----|------------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | Vorder- und Hinterflügel von | <i>Ophion orientalis</i> | UCH. (sp. nov.)                                 |
| 2.  | " "                          | " "                      | <i>Henicospilus maruyamanus</i> UCH. (sp. nov.) |
| 3.  | " "                          | " "                      | <i>H. giochiensis</i> UCH. (sp. nov.)           |
| 4.  | " "                          | " "                      | <i>H. pudibundae</i> UCH. (sp. nov.)            |
| 5.  | " "                          | " "                      | <i>H. fuscomaculatus</i> UCH. (sp. nov.)        |
| 6.  | " "                          | " "                      | <i>H. zonezawanus</i> UCH. (sp. nov.)           |
| 7.  | " "                          | " "                      | <i>Allocamptus orientalis</i> UCH. (sp. nov.)   |
| 8.  | " "                          | " "                      | <i>Dicamptus issiki</i> UCH. (sp. nov.)         |
| 9.  | " "                          | " "                      | <i>Thyreodon purpurascens</i> SM.               |
| 10. | " "                          | " "                      | <i>Nawaia japonica</i> ASH.                     |
| 11. | " "                          | " "                      | <i>Plesiophthalmus alarius</i> GRAY.            |
| 12. | " "                          | " "                      | <i>Stauropodoctonus orientalis</i> MORL.        |
| 13. | " "                          | " "                      | <i>Acanthostoma insidiator</i> SM.              |
| 14. | " "                          | " "                      | <i>Banchus falcatorius</i> F.                   |
| 15. | " "                          | " "                      | <i>Eremotylus sibiricus</i> SZÉPL.              |
| 16. | " "                          | " "                      | <i>Schizotoma amictum</i> F.                    |

