



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	1987年度談話会アブストラクト集 北海道大学理学部数学教室
Author(s)	Yoshida, T.
Citation	Hokkaido University technical report series in mathematics, 6, 1
Issue Date	1988-01-01
DOI	https://doi.org/10.14943/5125
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/5440
Type	departmental bulletin paper
File Information	06.pdf



1 9 8 7 年 度 談 話 会 ア ブ ス ト ラ ク ト 集
北 海 道 大 学 理 学 部 数 学 教 室

Edited by T. Yoshida

Series #6. April, 1988

HOKKAIDO UNIVERSITY
TECHNICAL REPORT SERIES IN MATHEMATICS

- | # | Author | Title |
|----|----------------|---|
| 1. | T. Morimoto, | Equivalence Problems of the Geometric Structures
admitting Differential Filtrations |
| 2. | J. L. Heitsch, | The Lefschetz Theorem for Foliated Manifolds |
| 3. | | Twelfth Sapporo Symposium on Partial Differential Equations in 1987,
Edited by K. Kubota |
| 4. | J. Tilouine, | Kummer's criterion over Λ and Hida's Congruence Module |
| 5. | | Abstracts of Mathematical Analysis seminar 1987
Edited by Y. Giga |

1987年度 談話会アブストラクト

ページ

1	諏訪 立雄	D-modules associated to singular foliations	1
2	肥田 晴三	Galois 表現について	11
3	志賀 徳造	集団遺伝学にあらわれる拡散過程	18
4	A. Weinstein	The Geometry of Poisson Brackets	19
5	J. Knopfmacher	Solomon's Zeta Function and Enumeration of Lattices over Orders	20
6	J. Tilouine	Hida's Congruence Module and Iwasawa Theory of the anticyclotomic \mathbb{Z}_p -extension	22
7	M. Deza	The classification of finite connected hypermetric space	25
8	丹野 修吉	Two topics related to spheres (i)Central sections of convex bodies, (ii)Gauge invariant of contact Riemannian structures	26
9	田村 一郎	3次元多様体上の non-singular flow と lifting property	28
10	幸崎 秀樹	Jones index 理論とエルゴード理論	30
11	上野 健爾	Conformal Field Theory over \mathbb{Z}	32
12	三輪 哲二	Two remarks on recent development in solvable models	41
13	栞田 幹也	Knotting submanifolds locally	52
14	石川 剛郎	特異ラグランジュ多様体について	54
15	大沢 健夫	L^2 コホモロジーと交叉コホモロジー	56
16	C. T. C. Wall	Nets of conics and deformations of singularities	58
17	伊藤 昇	2重正則有向グラフ	59
18	長野 正	対称空間の構造について	61
19	泉屋 周一	Generic な1階偏微分方程式	63
20	新井 朝雄	On perturbation problem of embedded eigenvalues in quantum field theory	65
21	島倉 紀夫	楕円型偏微分方程式と対称化-Talenti の仕事について	66
22	富永 久雄	各元が特殊な2元の和であるような環	68
23	吉田 知行	24の不思議(群論から超弦理論まで)	70
24	阿部 欣悦	複素部分多様体の或る種の剛性と maximal surfaces について	72
25	吉永 悦男	Topologically principal part of analytic functions	74
26	赤堀 隆夫	77アブストラクト CR-structure の複素ユークリッド空間への埋め込み問題	77
27	儀我 美一	半線型熱方程式の解の爆発について	88
28	鈴木 寛	Incidence matrices for "t-designs" on $H(d, q)$	95
29	三上健太郎	運動量写像とグルポイド	96
30	Cheng K. Nah	A remark on association schemes on finite groups	97

D-modules associated to singular foliations

4.15
T. Suwa

Singular foliation とは

$$\begin{array}{ccc} \text{coherent} & & \\ \text{integrable sheaf} & \subset & \text{tangent sheaf} \\ & \text{subsheaf} & \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{normal sheaf} \\ \text{characteristic classes} \\ \text{Bott residues} \end{array} \right. \rightarrow$$

normal 方向の differential operators の sheaf.

$$\uparrow \text{D-module theory to apply (7.4.1)}$$
§1. Generalities

$$X : \text{complex mfd. } \mathcal{O} = \mathcal{O}_X : \text{structure sheaf}$$

(holom. fct. germs の sheaf)

$$\mathcal{D}_X : \text{linear diff. operators (}\mathcal{O}\text{-coeff.) の sheaf}$$

locally

$$\mathcal{D} \ni P = \sum_{\text{loc.}} f_{\alpha} \frac{\partial^{\alpha}}{\partial x^{\alpha}}$$

$$TX : \text{holom. tan. bdl. } T^*X : \text{holom. cotan. bdl.}$$

$$\Omega^p := \mathcal{O}(\wedge^p T^*X)$$

$$\Theta^p := \mathcal{O}(\wedge^p TX) \quad \text{特に } \Theta := \Theta^1$$

$$\mathcal{O} : \text{typical left D-module} : P(f) := Pf$$

$$\Omega^n : \text{right } \mathcal{D}\text{-module} : (f \wedge \eta)$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &v \in \mathbb{H}, w \in \Omega^n \quad \checkmark \text{最高次} \\ &w^v = -L_v w \end{aligned}$$

locally free resolutions

$$0 \rightarrow \mathcal{D} \otimes \mathbb{H}^n \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{D} \otimes \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathcal{D} \otimes \mathbb{H} \rightarrow \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \mathcal{D} \rightarrow \Omega^1 \otimes \mathcal{D} \rightarrow \Omega^2 \otimes \mathcal{D} \rightarrow \dots \rightarrow \Omega^n \otimes \mathcal{D} \rightarrow \Omega^n \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{l} \lceil \\ \text{diff. eq.} \\ \sum_{j=1}^p P_{ij} u_j = 0 \\ \quad i=1, \dots, p \end{array} \iff \begin{array}{l} M \text{ is coherent.} \\ \mathcal{D}^p \xrightarrow{(P_{ij})} \mathcal{D}^q \rightarrow M \rightarrow 0 \end{array} \rfloor$$

IX F.

M : left \mathcal{D} -module \exists \mathbb{H} complex.

N : right \mathcal{D} -module \exists \mathbb{H} complex.

Dual

$DM := R\text{Hom}_{\mathcal{D}}(M, \mathcal{D})$: right modules or complex

$DN := R\text{Hom}_{\mathcal{D}}(N, \mathcal{D})$: left \mathcal{D} -module

examples

$$\mathcal{D}\mathcal{O} = \Omega^n[-n], \quad \mathcal{D}\Omega^n = \mathcal{O}[-n]$$

left \leftrightarrow right

$$M^V := \Omega^n \otimes_{\mathcal{O}} M \quad \text{: right } \mathcal{D}\text{-module}$$

$$N^V := \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\Omega^n, N) \quad \text{: left } \mathcal{D}\text{-module}$$

examples

$$\mathcal{O}^{\vee} = \Omega^n, \quad \Omega^n \vee = \mathcal{O}$$

de Rham complex

$$\text{DRM} := \Omega^n \otimes_{\mathcal{D}}^L M \quad (M \text{ is de Rham complex) is}$$

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{(\text{deg} = -n)} \Omega^1 \otimes_{\mathcal{O}} M \rightarrow \Omega^2 \otimes_{\mathcal{O}} M \rightarrow \cdots \rightarrow \Omega^n \otimes_{\mathcal{O}} M \xrightarrow{(\text{deg} = 0)} 0$$

$$\text{DRN} := N \otimes_{\mathcal{D}}^L \mathcal{O}$$

examples

$$\text{DR}\mathcal{O} = (0 \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \Omega^1 \rightarrow \cdots \rightarrow \Omega^n \rightarrow 0) = \mathbb{C}[n]$$

"=" is derived categoryにおける等号
(cohomologyの等しいcomplexesを同一視)

$$\text{DR}\Omega^n = \mathbb{C}[n]$$

Prop.

$$\text{DRM}^{\vee} = \text{DRM}, \quad \text{DRN}^{\vee} = \text{DRN}$$

Solution complex

$$\text{Sol } M := \text{RHom}_{\mathcal{D}}(M, \mathcal{O})$$

$$\text{Sol } N := \text{RHom}_{\mathcal{D}}(N, \Omega^n)$$

Prop.
 M (resp. N) : coherent.

$$\Rightarrow \text{Sol}(DM) = \text{DR}M, \quad \text{DR}(\text{DR}M) = \text{Sol}M$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{resp.} \\ \text{Sol}(DN) = \text{DR}N, \quad \text{DR}(\text{DR}N) = \text{Sol}N \end{array} \right)$$

$$\mathcal{D} = \cup \mathcal{D}_k, \quad \mathcal{D}_k : \text{order } \leq k \text{ of diff. operators}$$

$$\text{gr } \mathcal{D} = \bigoplus \mathcal{D}_k / \mathcal{D}_{k-1}$$

\parallel

\mathcal{O}_{T^*X} holom. fct.s on T^*X
 polynomial along fibres

$$M = \cup M_k \quad (M_k) : \text{"good" filtration}$$

\uparrow coherent

$$\text{gr } M = \bigoplus M_k / M_{k-1}$$

$$\mathcal{D}_i M_k \subset M_{i+k}$$

$$I := \text{Ann}(\text{gr } M) \subset \text{gr } \mathcal{D}$$

\sqrt{I} is def. \exists a T^*X subvariety \mathbb{E}

M or characteristic variety \mathbb{E} (or) $\text{Char } M$ is defined.

Bernstein - Kashiwara :

$$n \leq \dim \text{Char } M \leq 2n \quad ("=" : \text{holonomic})$$

§2 D-module の Riemann-Roch

(Malgrange, Angéniol - Lejeune)

$K(\mathcal{O}_X)$: coherent \mathcal{O}_X -modules の Groth. group

$K(\mathcal{D}_X)$: (good filtration $\in \pm$) coherent \mathcal{D} -modules の Groth. group

$K(\mathcal{O}_{T^*X})$: coherent \mathcal{O}_{T^*X} -modules の Groth. group

Theorem (Quillen, Malgrange)

$$\begin{array}{ccc}
 K(\mathcal{D}_X) & \xleftarrow{\rho} & K(\mathcal{O}_X) \\
 & \searrow \delta & \nearrow \alpha \\
 & & K(\mathcal{O}_{T^*X})
 \end{array}$$

map は $\forall n$ で iso.

$$\alpha(\mathcal{L}) := L i^* \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \Omega^n$$

$$\rho(\mathcal{L}) := \mathcal{D} \otimes \mathcal{L} \otimes \Theta^n$$

$$\delta := \alpha \circ \rho$$

T^*X

$\pi \downarrow \left. \vphantom{\pi} \right\} i: 0\text{-section}$
 X

δ は ϵ と具体的に表わせる (Malgrange)

$$M \rightarrow \text{DRM}$$

$$\left\{ (M_k) \right.$$

\leftarrow n は 次の complexes で filtered される.

$$F^k(\text{DRM}): 0 \rightarrow M_k \rightarrow \Omega^1 \otimes_{\mathcal{O}} M_{k+1} \rightarrow \cdots \rightarrow \Omega^n \otimes_{\mathcal{O}} M_{k+n} \rightarrow 0$$

(coherent \mathcal{O} -modules の complex)

Prop.

$$k \gg 0 \Rightarrow \text{DRM} \simeq F^k(\text{DRM})$$

Q-iso (quasi-iso.
i.e. cohomology level τ - \cong)

(だから)

DRM は $K(\mathcal{O}_X)$ の元を定める。

Prop.

$$\delta(M) = \text{DRM} \quad \text{in } K(\mathcal{O}_X)$$

よって

[R-R for \mathcal{O}_X -module] が出

[R-R for \mathcal{D} -module] が出る。

Theorem (Global index theorem for \mathcal{D} -modules)

X : cpt. cpx. mfd.

$$\chi(X, \text{DRM}) = \int_X \text{ch}(L, i^* \text{gr} M \otimes \Omega^n) \text{Td} X$$

特に M : holonomic

$$\Rightarrow \text{RHS} = (-1)^n \text{Char} M \cdot X \quad \text{in } T^*X$$

これは Dubson index thm.

§3 Singular foliation

\mathcal{S} : coherent \mathcal{O}_X -module

$$\text{Sing } \mathcal{S} := \{x \in X \mid \mathcal{S}_x \text{ is not free } \mathcal{O}_{X,x}\text{-module}\}$$

$$\text{rank } \mathcal{F} := \text{rank}(\mathcal{F} |_{X - \text{Sing } \mathcal{F}})$$

$E \subset \mathcal{H}$: coherent に付く.

$$\mathcal{H}_E := \mathcal{H} / E \quad : \text{normal sheaf}$$

$$S(E) \stackrel{\text{def.}}{=} \text{Sing } \mathcal{H}_E \quad (> \text{Sing } E)$$

Def.

$E \subset \mathcal{H}$: coherent

or singular foliation とは

(1) integrable : $[E_x, E_x] \subset E_x, x \in X - S(E)$

(2) full in \mathcal{H}

$\text{rank } E = p$ のとき, E は $X - S(E)$ 上の $\dim. p$ の
普通の foliation

例 $p=1$

$$E = (\nu) \quad , \quad \nu : \text{a vector field}$$

$$S(E) = \{x \mid \nu(x) = 0\}$$

singular fol. E に付く

$$\mathcal{D}E \stackrel{\text{loc.}}{=} \left(\begin{array}{l} \nu_1, \dots, \nu_p : E \text{ の loc. generators のとき} \\ \left\{ \sum_{i=1}^p p_i \nu_i \right\} \text{ で生成される } \mathcal{D}\text{-module} \end{array} \right)$$

$$\mathcal{D}_E := \mathcal{D} / \mathcal{D}E : E \text{ に associate した } \mathcal{D}\text{-module}$$

Remarks

1° Char \mathcal{D}_E は E の conormal space に一致

$$\dim \text{Char } \mathcal{D}_E = 2n - p$$

2° Char \mathcal{D}_E の non-sing. part には E を持ち上げた fol. があ

Theorem (Global index theorem for singular foliations)

X : cpt. cpx. mfd.

$$\chi(X, \text{Sol } \mathcal{D}_E) = \int_X \text{ch}(L i^*_{gr} D M^V \otimes \Omega^n) \text{Td } X$$

Theorem

(fol. or sing) = (normal sheaf, or sing) はある時としない

E は locally free, of rank p のとき

$$\chi(X, \text{Sol } \mathcal{D}_E) = \int_X \text{td} \oplus_E \cdot c_p(E)$$

$$\text{Sol } \mathcal{D}_E : 0 \rightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{d_E} E^* \xrightarrow{d_E} \Lambda^2 E^* \xrightarrow{d_E} \dots \rightarrow \Lambda^p E^* \rightarrow 0$$

$$d_E(f) := \sum_{i=1}^p v_i(f) \psi_i \quad \begin{cases} (v_1, \dots, v_p) : \text{loc. basis for } E \\ (\psi_1, \dots, \psi_p) : \text{dual basis} \end{cases}$$

0-th cohomology

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(\mathcal{D}_E, \mathcal{O}) = \mathcal{O}_E = \left(\begin{array}{l} \text{the sheaf of germs of holom. fct.} \\ \text{constant along leaves} \end{array} \right)$$

Special cases

1) $E = \text{non-sing}$

Poincaré lemma
↓

$\text{Sol } D_E \simeq \mathcal{O}_E$ Q -iso. (higher cohomology は消滅)

$$\chi(X, \mathcal{O}_E) = \int_X \text{td}(\Theta_E) \cdot c_7(E)$$

2) $E = TX$ $\left(\begin{array}{l} \mathcal{O}_E = \mathbb{C} \\ \Theta_E = 0 \end{array} \right)$

$$\chi(X, \mathbb{C}) = \int_X c_n(X)$$

3) $E = 0$ $\left(\begin{array}{l} \mathcal{O}_E = \mathcal{O}_X \\ \Theta_E = \Theta_X \end{array} \right)$

$$\chi(X, \mathcal{O}_X) = \int_X \text{Td}X$$


4) E が Γ -vector field を持つとき

右辺は localize され、Bott residue で表わせる

→ Bott の定理の拡張

v : vector field on X with isolated zeros

$$\chi(X, \mathcal{O}_X) = \sum_{p \in \text{Zero } v} (\text{local Todd \# at } p)$$



別の例

↓ 次頁

1987年4月22日 強研会

Galois 表現について

肥田晴三

今日は有理数体 \mathbb{Q} の代数的閉包 $\bar{\mathbb{Q}}$ についての p -進 Galois 表現, 対応する Galois 群からの (連続) 表現

$$\pi: \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}_n(A)$$

をどのように数論的に捉えるべきかについて 研究が (たいてい) $n=2$ の A として \mathbb{Z}_p 上の algebra を取る. ほとんどの A として $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$, \mathbb{Z}_p あるいは \mathbb{Q}_p 等々をとりとることができる. (ここで p は素数で以下は p を固定する).

1等簡単な Galois 表現の例は多分円分体から得られるものである. 今 μ_{p^r} で $\bar{\mathbb{Q}}$ の中での 1 の p^r 乗根全体の群を Γ_r とする.

ここで μ_{p^r} は位数が p^r の巡回群である.

ζ の生成元を $\zeta = \zeta_{p^r}$ とすると, $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ による


作用のために G をかけると, $\sigma \in G$ に対して ζ^σ は

$$\zeta^\sigma = \zeta^{\chi_r(\sigma)} \quad \chi_r(\sigma) \in \mathbb{Z}$$

となる. 勿論 $\chi_r(\sigma)$ は $\text{mod } p^r$ で一意に定まる. (これは)

F_r で \mathbb{Q} 上 ζ_{p^r} で生成される体である F_r/\mathbb{Q} は Galois 拡大で

$r > s$ に対して $F_r \supset F_s$ であるから 次の図式は可換である:



$$\begin{array}{ccccc}
 G & \longrightarrow & \text{Gal}(F_\infty/\mathbb{Q}) & \xrightarrow{\chi_\infty} & \mathbb{Z}_p^\times = \varprojlim_r (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times & \xrightarrow{\tau_\infty} & A = \varprojlim_r A_r \\
 \parallel & & \downarrow \sigma|_{F_r} & & \downarrow & & \downarrow \\
 G & \longrightarrow & \text{Gal}(F_r/\mathbb{Q}) & \xrightarrow{\chi_r} & (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times & \xrightarrow{\tau_r} & A_r = \mathbb{Z}_p[(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times] \\
 \parallel & \sigma_r \mapsto & \sigma_r|_{F_r} \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \\
 G & \longrightarrow & \text{Gal}(F_s/\mathbb{Q}) & \xrightarrow{\chi_s} & (\mathbb{Z}/p^s\mathbb{Z})^\times \cong \text{mod } p^s & \xrightarrow{\tau_s} & A_s = \mathbb{Z}_p[(\mathbb{Z}/p^s\mathbb{Z})^\times]
 \end{array}$$

この図式の射影的極限をとると次の2つの Galois 表現を得る: $F_\infty = \bigcup_r F_r$ として

$$\chi_\infty: G \rightarrow \text{Gal}(F_\infty/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p^\times = \text{GL}_1(\mathbb{Z}_p)$$

$$\pi = \tau_\infty \circ \chi_\infty: G \rightarrow \text{Gal}(F_\infty/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p^\times \hookrightarrow A = \varprojlim_r A_r$$

一般に χ_n は cyclotomic character と呼ばれ、今では \mathbb{F}_p を素数 p に来た。
 二で注目したいのは Γ の方である。

二の形は環で p -進局所環といふことが出来る

二で \mathbb{Z}_p 環 A の特徴付けが出来る。以下 A を \mathbb{Z}_p 上の局所環とし、その極大ideal m_A により $A \cong \varprojlim A/m_A^n$ であり、 A/m_A^n は有限 Artin 環である。これより $A \subset \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_p[[X]]$ 等を取ることが出来る。 A が群環の極限であるとして、群環自身の普遍性より次のような普遍性も A が持つことが知られている。すなわち $\varepsilon: \mathbb{Z}_p^x \rightarrow A^x$ による連続群の homomorphism が与えられる。これは $\varepsilon_a: A \rightarrow A$ による \mathbb{Z}_p -algebra の homomorphism として一意に拡張し、次の図式を可換にする:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_p^x & \xrightarrow{\varepsilon} & A \\ \downarrow \cong & \nearrow \varepsilon_a & \\ A & & \end{array}$$

この普遍性のため A は位相群 \mathbb{Z}_p^x の連続群環と呼ばれ、これを $A = \mathbb{Z}_p[[\mathbb{Z}_p^x]]$ とかける。

χ_n により $\text{Gal}(\mathbb{F}_n/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p^x$ とすることが出来る。 A の普遍性を用いると表現 Γ は次のような普遍性を持つ。すなわち $\varepsilon: \text{Gal}(\mathbb{F}_n/\mathbb{Q}) \rightarrow A^x$ による連続指標が与えられる。 \mathbb{Z}_p -algebra の準同型 $\varphi_\varepsilon: A \rightarrow A$ が一意に存在して $\varepsilon = \varphi_\varepsilon \circ \Gamma$ とかける。

Kronecker により \mathbb{F}_n が次の特徴付けを持つことが知られている:

Theorem (Kronecker) \mathbb{F}_n は \mathbb{Q} 上 p の外で不分解な最大 abel 拡大である。

二で有限次拡大 F/\mathbb{Q} が p の外で不分解ならば p と異なる素数 l を F の素ideal の積に分解し、平方因子を含まないことが出来る。

この定理は \mathbb{F}_n の部分体は p の外で不分解で、逆に p の外で不分解な abel 拡大体 F/\mathbb{Q} が存在すれば $\mathbb{F}_n \supset F$ とすることが出来る。

一般に Galois 表現 $\pi: G \rightarrow \text{GL}_n(A)$ が与えられる。 $\text{Ker}(\pi)$ は G の部分群で Galois 理論により \mathbb{Q} の部分体 $F(\pi)$ で $\text{Gal}(\mathbb{Q}/F(\pi)) = \text{Ker}(\pi)$ とする。二で $F(\pi) = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^\sigma = x \text{ for all } \sigma \in \text{Ker}(\pi)\}$ とする。

$\pi = \pi$ π が p の外で不分岐 π である $F(\pi)$ が p の外で不分岐 π である π である。 $\pi = \pi$ Kronecker の定理より $\Pi : G \rightarrow GL_1(A)$ の普遍性は F_∞ を用いて次のように変えられる: p の外で不分岐連続指標 $\varepsilon : G \rightarrow GL_1(A)$ が与えられる。 \mathbb{Z}_p -algebra の準同型 $\varphi_\varepsilon : A \rightarrow A$ が一意的に存在し $\varepsilon = \varphi_\varepsilon \circ \Pi$ である。

同じ普遍性を持つ表現の存在を GL_n の表現についても同様に示す。 この問題を検討するために GL_1 の場合をさらに分解する。 可能な環 A の構造をもう少し詳しく見てみる。 まず $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ は位数 $p^{r-1}(p-1)$ の巡回群であるから 一意的に位数 $p-1$ の巡回群 μ_{p-1} と位数 p^{r-1} の巡回群 Γ_r の積と書ける。 可能な

$$(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times = \Gamma_r \times \mu_{p-1}$$

である。 したがって $A_r = \mathbb{Z}_p[(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times] = (\mathbb{Z}_p[\mu_{p-1}])[\Gamma_r]$ である。

一方 $\mathbb{Z}_p^\times = \varprojlim_r (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times = \mu_{p-1} \times \varprojlim_r \Gamma_r = \mu_{p-1} \times \Gamma$ である。

したがって \mathbb{Z}_p の中では 1 の $p-1$ 乗根がすべて入っている。 このことから

$\omega : \mu_{p-1} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ はこの自然な inclusion である。 μ_{p-1} の指標は ω^a ($a=1, \dots, p-1$) で表される。 このことから

$$\mathbb{Z}_p[\mu_{p-1}] = \underbrace{\mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p}_{p-1} \times \mathbb{Z}_p$$

$$\mu_{p-1} \ni s \longmapsto \omega(s)^a$$

である。 したがって $A_r = \mathbb{Z}_p[\Gamma_r] \times \dots \times \mathbb{Z}_p[\Gamma_r]$,

$$A = \mathbb{Z}_p[[\mathbb{Z}_p^\times]] = \Lambda \times \dots \times \Lambda \times \dots \times \Lambda, \quad \Lambda = \varprojlim_r \mathbb{Z}_p[\Gamma_r] = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

$$(s, s) \longmapsto \omega(s)^a$$

である。 今 Γ は位数 p^{r-1} の巡回群の射影的極限である。 位相的には 1 の元で生成される。 したがって生成元 u を 1 の固定元として Λ の構造はよくわかっていて

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]] \cong \mathbb{Z}_p[[X]] : \text{-変数中級数環}$$

$$u \longmapsto 1+X$$

が知られている。 したがって Λ は局所環で Λ の極大 ideal m は $p \times X$

\mathbb{Z} で生成される。よって $\Lambda/m \cong \mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ である。よって $u \mapsto 1+x$ となる $u \equiv 1 \pmod{m}$ で u は生成元となるから任意の $\gamma \in \Gamma$ に対して $\gamma \equiv 1 \pmod{m}$ である。

χ を 普遍的表現 $\Pi : G \rightarrow GL_1(\Lambda)$ の α 番目の成分 Λ の射影を π_α とし $\rho_\alpha = \pi_\alpha \pmod{m} : G \rightarrow GL_1(\mathbb{F}_p)$ とする。任意の $\sigma \in G$ に対して $\chi_{\text{ord}}(\sigma) = z = (\gamma, \delta) \in \mathbb{Z}_p^\times = \Gamma \times \mu_{p-1}$ とおくと $\mu_{p-1} = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{F}_p^\times$ となるから $\pi_\alpha(\sigma) = \omega(\delta)^\alpha \gamma \equiv \omega(\delta)^\alpha \pmod{m}$ となり、正確に component は $\pi_\alpha \pmod{m} = \rho_\alpha$ と決まる。このことから π_α は次の普遍性をもち、

p の外で不分岐な連続指標 $\varepsilon : G \rightarrow GL_1(A)$ がある A の極大 ideal m_A に対して、 $\varepsilon \pmod{m_A} = \rho_\alpha$ をみたせば、 \mathbb{Z}_p -algebra の準同型 $\varphi : \Lambda \rightarrow A$ が一意に存在して $\varepsilon = \varphi \circ \pi_\alpha$ となる。

すなわち π_α は $\pi \pmod{m_A} = \rho_\alpha$ となる表現たちの中で最も普遍的なものである。

このように普遍表現の GL_n への一般化を考察する。 ρ_α を代りたして p の外で不分岐な既約表現 $\rho : G \rightarrow GL_n(\mathbb{F}_p)$ を与えよう。今環 $R = R_p$ と p の外で不分岐な連続表現 $\Pi : G \rightarrow GL_n(R_p)$ の組がある p に対して普遍的であるとは次がみたされることである： p の外で不分岐な連続表現 $\pi : G \rightarrow GL_n(A)$ がある $\pi \pmod{m_A} = \rho$ をみたせば、ある \mathbb{Z}_p -algebra の準同型 $\varphi : R \rightarrow A$ が存在して $\pi \sim \varphi \circ \Pi$ となる。 (注意: π は ρ に対して ρ は既約)。

Theorem (Mazur). 各々の p に対して、次の条件をみたす \mathbb{Z}_p -algebra $R = R_p$ と連続表現 $\Pi^{\text{univ}} : G \rightarrow GL_n(R_p)$ の組が一意に存在する:

- (i) R は noether 局所環で χ の極大 ideal m に対して $R = \varprojlim R/m^r$ かつ R/m^r は有限環で $R/m \cong \mathbb{F}_p$ である。 (R は p -進局所環)。
- (ii) (R, Π^{univ}) は p に対して普遍的
- (iii) R は (i), (ii) をみたす環の内では minimal である。 (つまり (i) (ii) をみたす R' があれば (ii) には自然な準同型 $R' \rightarrow R$ が全射である)。

$n=1$ の $\rho = \rho_a$ ならば 勿論 同様の議論で R_ρ は Λ に与えられる。
この algebra Λ は 別名 岩澤 algebra と呼ばれ、岩澤理論の基本的
例であるが、これを便利と便利と以外に その存在理由は 今で明確
ではなからぬ。

さて 一般の ρ に対して Mazur の定理で 検証された環 R_ρ を 具体的に
作るのが 次の目標である。 $n=2$ の R の 構造を 与えよう

$\det \circ \rho : G \rightarrow GL_1(\mathbb{F}_p)$ を 与えれば $1 \leq a \leq p-1$ の 存在 $|\mathbb{Z} \det \circ \rho = \rho_a$
がある。 したがって (Λ, π_a) の 普遍性から $\varphi : \Lambda \rightarrow R$ なる 局所環の
準同型で $\det \circ \pi_a \circ \varphi = \varphi \circ \pi_a$ を みたすものが 存在する。 すると
 R は 標準的に Λ 上の algebra とする。

$n=2$ のとき R 自身は Λ の一部を 具体的に 作る問題と 考えられる。 与えら
 $\rho : G \rightarrow GL_2(\mathbb{F}_p)$ を 既約で p 外で 不分裂と 表現と する。 R 自体は
大きい (多分 $\text{Kull dim } R_\rho \geq 4$? と 考えられている) ので R の 局所
剰余環 を 作り その 構成問題と 考えられる。 全部の $\pi \bmod m_A = \rho$ なる
表現と 同型 普遍性の代りに さらに 表現と 条件を 付け R の 局所剰余環
を 定義し その 構成方法と 考えよう という ことである。

そのために Galois 群の 楕円部分群を 説明する。 今 F を 有限次
代数体と 与えれば $\overline{\mathbb{Q}} = \bigcup_F F$ により $\overline{\mathbb{Q}}$ の 整数環 \mathcal{O} を
 $\mathcal{O} = \bigcup_F \mathcal{O}_F$ で 定義する ことが 出来る。 したがって \mathcal{O}_F は F の 整数環 である。
素数 $l \in \mathbb{Z}$ に対して \mathcal{O} の 素 ideal \mathcal{P} で $\mathcal{P} \cap \mathbb{Z} = l\mathbb{Z}$ なるものを 取る。
今 $I_l = \{ \sigma \in G \mid \frac{\sigma \alpha}{\alpha} \in \mathcal{O} \text{ かつ } \alpha \sigma \equiv \alpha \pmod{\mathcal{P}} \}$ と 置き
 I_l を \mathcal{P} の 楕円群と 呼ぶ。 I_l は 共役を除いて \mathcal{P} の 取り方に 依存
しない。 Hilbert の 理論により $\pi : G \rightarrow GL_n(A)$ に対して

π が l で 不分裂 $\Leftrightarrow \pi(I_l) = \{1\}$ が 知られている。

すなわち p の外に不変な表現 $\pi: G \rightarrow GL_2(A)$ により $\pi(I_p)$ の形に条件を付して R を小さくする。今 G を π で $A(\pi) = A^2$ に作用させ

$$H_0(I_p, A(\pi)) = A(\pi) / \sum_{\sigma \in G} (\pi(\sigma) - 1)A(\pi)$$

を考へる。これは I_p が trivial に作用する最大の商である。今 π が ordinary であることは $H_0(I_p, A(\pi)) \cong A$ であることと同義である。

(これは $\pi(I_p)$ が $\begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ の形をしていることと同義である)。

定理に照らして、ordinary な表現 $\rho: G \rightarrow GL_2(A)$ を固定すると、環 R_p^{ord} と ordinary な表現 $\pi^{\text{ord}}: G \rightarrow GL_2(R_p^{\text{ord}})$ であり、ordinary な表現 ρ の極大 ideal の reduction が ρ と一致するものの中に普遍的なもの τ が存在する。先程と同じ議論で R_p^{ord} は Λ 上の algebra である。

R_p^{ord} に対して具体的に作り出すというのが我々の趣意である。先程の作り方を有効にするとは呼ぶ方法で述べる。 GL_1 の時の (Λ, π_α) の構成法を述べる。 GL_1 の場合の群環 Λ_r の代りになるものを Hecke algebra である。

$$\Gamma_1(p^r) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z}) \mid ad-bc > 0, c \equiv 0 \pmod{p^r}, d \equiv 1 \pmod{p^r} \right\}$$

この群に属する重さ 2 の係数形式の空間を $S(\Gamma_1(p^r))$ とする。

各整数 n に対しこの空間には Hecke 作用素 $T(n): S(\Gamma_1(p^r)) \rightarrow S(\Gamma_1(p^r))$ が定義される。Hecke algebra $\mathfrak{h}_r(\mathbb{Z})$ は $\text{End}_{\mathbb{C}}(S(\Gamma_1(p^r)))$ の部分環で \mathbb{Z} 上 $T(n)$ で生成されるものである。すなわち

$$\mathfrak{h}_r(\mathbb{Z}_p) = \mathfrak{h}_r(\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p, \quad \mathfrak{h}_r(\mathbb{Q}_p) = \mathfrak{h}_r(\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_p$$

$\mathfrak{h}_r(\mathbb{Z}_p)$ は \mathbb{Z}_p 上階数有限で自然に Λ_r 上の algebra の構造を持つ。

すなわち $\mathfrak{h}_r(\mathbb{Z}_p)$ は 2 次の標準的分解を持つ:

$$\mathfrak{h}_r(\mathbb{Z}_p) = \mathfrak{h}_r^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p) \times \mathfrak{h}_r^{s,s}(\mathbb{Z}_p)$$

$T(p) \mapsto$ 単数 \times 位相的中零元。

すなわち $r > s$ ならば \mathbb{Z}_p -algebra の準同型 $\varphi_s^r: \mathfrak{h}_r^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p) \rightarrow \mathfrak{h}_s^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p)$ があって次の図式を可換にする。

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_r & \longrightarrow & \mathfrak{h}_r^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p) \ni T(n) \\ \downarrow \text{proj.} & & \downarrow \varphi_s^r \quad \downarrow \\ \Lambda_s & \longrightarrow & \mathfrak{h}_s^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p) \ni T(n) \end{array}$$

最も重要なことは Eichler-志村により p を除く不分割素数の ordinary 表現 $G \rightarrow GL_2(R_r^{\text{ord}}(\mathbb{Q}_p))$ が存在し、次の図式が可換である:

$$\begin{array}{ccc} \pi_r^{\text{mod}} : G & \longrightarrow & GL_2(R_r^{\text{ord}}(\mathbb{Q}_p)) \\ \parallel & & \downarrow \varphi_r \\ \pi_s^{\text{mod}} : G & \longrightarrow & GL_2(R_s^{\text{ord}}(\mathbb{Q}_p)). \end{array}$$

予想 I 上の主張は \mathbb{Q}_p を \mathbb{Z}_p に変えて正しい。

この予想は多くの場合に知られている (Mazur, Wiles, Tilouine, Hida)。これは

予想 I を仮定する。 $\pi^{\text{mod}} = \varprojlim_r \pi_r^{\text{mod}} : G \rightarrow GL_2(\mathbb{R}^{\text{ord}})$ である。

すなわち $\mathbb{R}^{\text{ord}} = \varprojlim_r R_r^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p)$ である。 $\rho : G \rightarrow GL_2(\mathbb{F}_p)$ が modular

であるとは $\exists \varphi$ ある \mathbb{Z}_p -algebra の準同型 $\varphi : \mathbb{R}^{\text{ord}}(\mathbb{Z}_p) \rightarrow \mathbb{F}_p$ が存在し

$\rho = \varphi \circ \pi_r^{\text{mod}}$ であるとは ρ が modular である。

\mathbb{R}^{ord} の局所環である直積因子 R_ρ^{mod} が存在し φ が factors through

する。すなわち $R^{\text{ord}} \rightarrow R_\rho^{\text{mod}}$ の射影 ρ を P_R とする。

$$\pi_\rho^{\text{mod}} = P_R \circ \pi^{\text{mod}} : G \rightarrow GL_2(R_\rho^{\text{mod}})$$

である。 $(R_\rho^{\text{ord}}, \pi_\rho^{\text{mod}})$ の普遍性から Λ -algebra の全射準同型

$$\Phi : R^{\text{ord}} \rightarrow R_\rho^{\text{mod}} \quad \text{が存在する。}$$

予想 II (Mazur) ρ が ordinary ならば modular である $\Phi : R_\rho^{\text{ord}} \cong R_\rho^{\text{mod}}$ 。

一般に次の予想はよく知られている。

予想 III (Weil, Langlands, Serre). ρ が ordinary ならば $\det(\rho(\text{複素共役})) = -1$

$$\Rightarrow \rho \text{ は modular.}$$

以上の予想が正しいかは R_ρ^{ord} は Hecke algebra により作られることが出来ること

R_ρ 自身も $R = \varprojlim_r R_r(\mathbb{Z}_p)$ の部分として作られることと等しいと知られている。

集団遺伝学にあらわれる拡散過程

東京工業大・理 志賀徳造

集団遺伝学にあらわれる次の2種類の拡散過程について、構成の問題、定常状態の分類及びその安定性を論じた。

(1) state space: $K_d = \{x = (x_1, \dots, x_d) : x_1 \geq 0, \dots, x_d \geq 0, \sum_1^d x_i \leq 1\}$

generator:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d x_i x_j \left(\sum_{k=1}^{d+1} \beta_k x_k - \beta_i - \beta_j \right) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

ここで $\beta_1, \dots, \beta_{d+1}$: 正定数

$$x_{d+1} = 1 - \beta_1 - \dots - x_d$$

(2) state space: $X = [0, 1]^S = \{x = (x_p)_{p \in S} : 0 \leq x_p \leq 1\}$

S : 可算無限集合.

generator:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{p \in S} x_p (1 - x_p) \frac{\partial^2}{\partial x_p^2} + \sum_{p \in S} b_p(x) \frac{\partial}{\partial x_p}$$

これらの拡散作用素の特徴は、境界上で完全に退化していること、及び拡散係数を滑らかに全領域へ拡張出来る点にあり従来の一般的な方法の適用出来ない、新しいクラスに属する退化楕円型微分作用素である。対応する拡散過程の解析は確率微分方程式、双対過程の解析等、確率論の手法で行なう。

The Geometry of Poisson Brackets

Alan Weinstein

University of Tokyo and University of California, Berkeley

Abstract

A *Poisson structure* on a manifold P is a Lie algebra structure on $C^\infty(P)$ for which the identity $\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$ holds. The "inside picture" of a Poisson manifold presents it as the total space of a singular foliation, each leaf of which carries a symplectic structure (i.e. a closed 2-form of maximal rank).

Recent work of M.V. Karasev and the speaker paints a fairly clear "outside picture" of Poisson manifolds. A *realization* of the Poisson manifold P consists of a symplectic manifold S and a submersion from S to P which is compatible with Poisson brackets. It turns out that, at least locally, there is a universal realization of any Poisson manifold which has the structure of a local *symplectic groupoid*. The construction of this realization is a strict generalization of Lie's construction of a local group for any Lie algebra.

An interesting problem, only partly solved at this time, is to characterize those Poisson manifolds which admit a *global* symplectic groupoid as realization.

HOKKAIDO UNIVERSITY

SAPPORO 060, JAPAN

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

62/6/11

Solomon's Zeta Function andEnumeration of Lattices over Orders- John Knopfmacher

In 1977, L. Solomon introduced a wide-ranging but natural and concrete generalization of the Riemann and Dedekind zeta functions, as well as of K. Hey's zeta function for a simple \mathbb{Q} -algebra. The coefficients of Solomon's zeta function give the numbers of certain types of sublattices of varying finite index in a given arithmetical lattice over an order in a semisimple \mathbb{Q} -algebra, and in special cases these reduce to classical arithmetical functions.

The first main aim of this talk is to state and discuss results on the asymptotic average values of the coefficients of Solomon's zeta function. The problem of deriving best possible error estimates is discussed as well.

2/...

- 2 -

HOKKAIDO UNIVERSITY

SAPPORO 060, JAPAN

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Solomon's zeta function (continued):

The second major aim of this talk is to discuss and consider similar questions for a parallel type of zeta function, essentially implicit in Solomon's original definitions although not treated by him.

The latter zeta function is one appropriate to the enumeration of lattices over orders in semisimple $F_2(X)$ -algebras, where $F_2(X)$ is the field of rational functions in an indeterminate X over a finite field F_q with q elements.

Here much more explicit and complete results can be obtained for the coefficients than in the preceding situation, after first deriving analogues for the new zeta function of theorems first conjectured and partly proved by Solomon for the former function, which were later fully established for that case by C.J. Bushnell + I. Reiner.

[References

1. Analysis, Vol. 5 (1985), 29-42
2. Manuscripta Math., Vol. 53 (1985), 101-106.]

John Kuepfman, University of Witwatersrand, Johannesburg
SOUTH AFRICA.

HOKKAIDO UNIVERSITY

SAPPORO 060, JAPAN

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Sapporo

Wednesday, June 17, 1984

The purpose of the present talk is to explain a result of the speaker establishing a connection between Hida's congruence module and the Iwasawa module of the anticyclotomic \mathbb{Z}_p -extension of an imaginary quadratic field.

In the first part of the talk we recall some definitions and basic results of Iwasawa theory:

- 1) \mathbb{Z}_p -extension K_∞/K of a number field K .
- 2) If S is a set of primes of K above p , we define the Iwasawa module X_∞^S (resp. X_n^S , $n \geq 0$) as the Galois group of the maximal abelian p -extension of K_∞ (resp. K_n , $n \geq 0$) unramified outside S , and we endow it with a structure of $\mathbb{Z}_p[[\text{Gal}(K_\infty/K)]]$ (resp. $\Lambda_n = \mathbb{Z}_p[\text{Gal}(K_n/K)]$). module over $\Lambda =$

3) We explain that the knowledge of the characteristic power series of X_∞^S (when it is Λ -torsion) gives a good grasp on the structure of X_n^S over Λ_n for all $n \geq 0$.

HOKKAIDO UNIVERSITY

SAPPORO 060, JAPAN

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Now, our result is the following. Take

M an imaginary quadratic field, $p \neq 2, 3$ a prime number which splits in M (in order to get a Λ -torsion module!). Take K to be the Ring-klassenkörper of M of conductor p and K_∞/K to be the anticyclotomic \mathbb{Z}_p -extension. We suppose for simplicity that the class number of M is 1, so that we have a basic anticyclotomic character κ . We take S to be the set of primes in K above one of the two primes in M above p . And we take the κ^i -part of X_∞^S . Then this is a torsion Λ -module and if $i \not\equiv 0, 1 \pmod{p-1}$, we prove that its characteristic power series is divisible by the characteristic power series of the congruence module attached by Hida to an eigenform (here the eigenform is $\theta(z) = \sum \alpha^i e^{2\pi i \sqrt{-d} \alpha \bar{\alpha} z}$ if we suppose i even and strictly ^{α integer in M} smaller than $p-1$).

The second part is devoted to the ^{precise} definition of this congruence module. So we recall the definition of ^{the} big Hecke algebra, its ordinary part, its structure of Λ -module and its control. We remark that the congruence module has a very simple structure as Λ -module and we compare

HOKKAIDO UNIVERSITY

SAPPORO 060, JAPAN

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

its characteristic power series to the Kubota-Leopoldt p -adic L -function, in the sense that it interpolates also special values of some L -function.

ABSTRACT

A finite distance space $X, d: X^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ is hypermetric (of negative type) if $\sum a_x a_y d(x, y) \leq 0$ for all integral sequences $\{a_x \mid x \in X\}$ that sum to 1 (sum to 0). X, d is connected if the set $\{(x, y) \mid d(x, y) = 1, x, y \in X\}$ is the edge set for a connected graph on X , and graphical if d is the path length distance for this graph. Then we prove

Theorem 1. A connected space X, d has negative type if and only if X may be realised as a subset of a Euclidean space $E, \|\cdot\|$, such that

(i) X contains 0 and spans E

(ii) $d(x, y) = 1/2\|x - y\|^2 \quad (x, y \in X)$

(iii) $L = \mathbb{Z}X$ is a root lattice, i.e. an orthogonal direct sum of lattices of type $A_n, D_n, E_6, E_7,$ and E_8 .

Call a hypermetric space X, d complete if for each triple $x, y, z \in X$ with $d(y, z) = 1$ and $d(x, y) + 1 = d(x, z)$, there is a unique element $w \in X$ with $d(w, x) = 1, d(w, y) = d(x, z)$, and $d(w, z) = d(x, y)$. Then we also prove

Theorem 2. (i) A connected distance space is hypermetric if and only if it is isomorphic to a subspace of a complete connected hypermetric space.

(ii) The complete connected hypermetric spaces are graphical, and are precisely the Cartesian products of Johnson graphs, half cubes, Cocktail Party graphs, the Shafli graph on 27 vertices, and the Gosset graph on 56 vertices.

We finish by describing how a given connected hypermetric space may be canonically embedded in a complete one, and give some open problems.

Theorem 1 is an extension of a result of Schoenberg. Theorem 2 is obtained by applying a result of Assouad to show any connected hypermetric space may be identified with a subset of a minimal saturated set induced by a coset of some root lattice in its lattice of weights.

Two Topics related to spheres

- (i) Central sections of convex bodies
- (ii) Gauge invariant of contact Riemannian structures

1987.6.24 東京工大 丹野修吉

(i) K と K' を 3次元Euclid空間内の中心対称凸体とする。中心は共に原点とする。原点を含む任意の平面 L に対して

「 L による K と K' の断面の面積について $A(K \cap L) < A(K' \cap L)$ なら、体積について $V(K) < V(K')$ が成り立つか」

という問題を考察する。

単位球体 B から ε -cap をカットした凸体 K を考える。 B の表面 S 上に中心対称となるように $2N$ 個の点 $\{\pm q_1, \dots, \pm q_N\}$ を分布させる。各点 q を中心として、 S 上半径 ε の円を描いて、その線でカットする。これを $K(\varepsilon, N, \Theta)$ と書きあらわす。 Θ は点の分布を示し、カットは重ならないものとする。

$K(\varepsilon, N, \Theta)$ の体積と同じ体積をもつ半径 R の球体を K' とする。もし、各 L について

$$A(K(\varepsilon, N, \Theta) \cap L) < \pi R^2$$

が成り立つようにできれば、反例が存在することになる。

$A(K(\varepsilon, N, \Theta) \cap L)$ の L についての平均値を $M(\varepsilon, N)$ とすれば

定理A. 任意の ε と N について $M(\varepsilon, N) < \pi R^2$.

$N > 100$ に対して、分布 Θ'_0 を「均質なモデル」として、ある方法で定義する。十分均質な筈であるとして、これを H モデルと呼ぶ。

定理B. H モデル Θ'_0 について、ある L があって

$$A(K(\varepsilon, N, \Theta'_0) \cap L) > \pi R^2.$$

注. K が楕円体なら上の「...」は成り立つ。(Busemann[PJM.1953])

注. 等号の場合、つまり $A(K \cap L) = A(K' \cap L)$ が各 L について成り立つなら K と K' は合同である。(Funk's integration Theorem [MA.1916])

注. この問題は次元を上げてても意味があるが、12次元以上では確率論的には反例がある。(Larman+Rogers [M.1975])

(ii) 山辺の問題「コンパクトなリーマン多様体は計量 g を共形変形してスカラー曲率 S を一定にできるか」は既に解決されているが、その方程式は次のものであった：

$$4[(m-1)/(m-2)]\Delta f + S f = S_0 f^{(m+2)/(m-2)}$$

最近、Jerison-Lee [JDG.1987]は類似のことを CR-多様体について研究している。上の方程式については接触多様体で考察することが自然と思われるので、その FORMULATIONについて述べる。

接触リーマン構造は、strongly pseudo-convex CR-構造から P の積分可能条件を除いたものに対応しているから、まず適当に接続を定めなければならない。CR-構造での田中接続を次のように拡張する。

$${}^*\Gamma_{jk}^i = \Gamma_{jk}^i + \eta_j \phi_k^i - \nabla_j \xi^i \eta_k + \xi^i \nabla_j \eta_k$$

${}^*\nabla$ は g 、 ξ 、 η を平行場にし、 ${}^*\nabla\phi = 0$ は P の積分可能条件と同値である。 ${}^*\nabla$ を拡張された Tanaka-Webster 接続と呼ぶ。

この接続の torsion のノルムの二乗の積分は、最近 $m=3$ のとき Chern-Hamilton によって調べられている。

${}^*\nabla$ のリッチ曲率テンソル ${}^*R_{ij}$ を g^{ij} で縮約したものとして、Tanaka-Webster スカラー曲率 *S が定められる。実質的には

$${}^*S = S - R_{ij} \xi^i \xi^j + 2(m-1)$$

である。 (M, η, g) において正値関数 σ を用いて $\tilde{\eta} = \sigma \eta$ とし

$$(\phi, \xi, \eta, g) \longrightarrow (\tilde{\phi}, \tilde{\xi}, \tilde{\eta}, \tilde{g})$$

を自然に定めたものを接触リーマン構造の gauge 変換という。

$\Delta_P f = (g^{ij} - \xi^i \xi^j) \nabla_i \nabla_j f$ と定めれば

$$\sigma {}^*\tilde{S} = {}^*S - (\mu/u) \Delta_P u, \quad \sigma = u^{2/n}, \quad \mu = 4(n+1)/n$$

$$-\mu \tilde{\Delta}_P \tilde{f} + {}^*\tilde{S} \tilde{f} = u^{1-p} (-\mu \Delta_P f + {}^*S f),$$

$$P = 2+2/n, \quad \tilde{f} = f/u, \quad m=2n+1$$

定理 C. コンパクト接触リーマン多様体 (M, η, g) において、次で定義される $\lambda_{(\eta, g)}$ は接触リーマン構造の gauge invariant である：

$$\lambda_{(\eta, g)} = \inf \left\{ \int (\mu \|df\|_P^2 + {}^*S f^2) dM ; f \geq 0, \int f^p dM = 1 \right\}$$

$F_{(\eta)}$ と $F_{(\eta, g)}$ を次のように定義する：

$$F_{(\eta)}(g, f) = \int (\mu \|df\|_P^2 + {}^*S f^2) dM, \quad F_{(\eta, g)}(f) = F_{(\eta)}(g, f)$$

$$g : \text{associated metric}, \quad f : f \geq 0, \quad \int f^p dM = 1$$

これらの積分の critical point の条件、安定性などについて、特に、球面の標準的接触構造の場合について、最近の結果について説明する。

3次元多様体上の non-singular flow と lifting property

東京電機大学 工学部

田村 一郎

同じに 3次元多様体上の non-singular flow とし誰にでも
思いがけるのが 3次元球面上の Hopf flow, すなわち $S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2; |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ とし

$$\phi_t((z_1, z_2)) = (e^{it}z_1, e^{it}z_2)$$

によって与えられる flow である。この場合すべての軌道は閉軌道であるが, 1950年 H. Seifert はこの flow を perturb して与えられる flow にはつねに少なくとも一つの閉軌道があることを示し, その論文で S^3 の non-singular flow はすべて閉軌道をもつかどうかということはまだ知られていないと述べている。以後, この閉軌道の存在問題は Seifert 予想とよばれている。軌道を一つの葉とすることにより, S^3 の non-singular flow は S^3 の余次元 2 の葉層構造を定めるが, Seifert 予想はこの場合, S^3 の余次元 2 の葉層構造にはつねにコンパクトな葉があるか, ということになる。これは葉層構造論でも極めて基本的な問題である。

この Seifert 予想に関しては, 1971年 P. Schweitzer によって C^1 級 flow については反例があることが示された。また, 1985年の A.M.S. の Bull. には J. Harrison による C^2 級の反例が報いられているが, このフルパーパーはまだ最終的なものにはなっていないように思われる。

Seifert 予想を肯定的な面から論ずる難しさは, 3次元多様体における flow の多様性をどのようにしてとらえるかということである。このための一つの方策として flow に横断的曲面をつくり, それによって flow を制御しようということが考えられる。

この横断面構成を可能にするための一つの条件が *lifting property* であって、これによつて *flow* をファイバー・バンドルの拡張と見做すことができる。それならば、いつ *non-singular flow* が *lifting property* をもちうるかが次の問題となるが、これに代りには *flow* が *minimal* ならばその *flow* が *lifting property* を持つことがいえる。この証明には、*lifting property* をもたない *flow* については *hyperbolicity* に類似した性質があらわれるということ、*minimal* な *flow* ではこのことから矛盾が起るという論法が用いられる。

以上のことによつて、Seifert 予想を肯定的に解決することが可能になる。

(1987年7月8日)

Jones index 理論 と エルゴード理論

九州大学 教養部
幸崎 秀樹

1983年に V. Jones は II_1 -factor の index 理論を発表した。
 II_1 -factor M 及びその subfactor N が与えられた時、作用素環論的な比が Jones index $[M:N]$ として定義される。index の値が 4以上の任意の実数 ($+\infty$ を含む) が $4\cos^2\frac{\pi}{n}$, $n=3,4,\dots$, であり、しかもこの値をとる $M \supseteq N$ の実例が存在するというのが Jones の結果である。
 $N \subseteq M$ より canonical に II_1 -factor の extension $M \subseteq M_1$ が構成され、これを繰り返す事により II_1 -factor の tower $N \subseteq M \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$ が構成される。この時、projection の列 $\{e_i\}_{i=1,2,\dots}$ で次の関係式を満たすものが得られる。

$$\begin{cases} e_i e_j = e_j e_i & |i-j| \geq 2 \\ e_i e_{i\pm 1} e_i = [M:N]^{-1} e_i \end{cases}$$

この projection の列の解析が Jones 理論の中心である。似た構造が他の分野 (Braid 群, Hecke 環, Potts model 等) にも表われるので作用素環論とこれらの分野の関連についても活発に研究が進められている。中でも作用素環論の研究から生まれた knot の新しい不変量 (Jones polynomial) は特記に値する。作用素環論自体としても index 理論は本質的である。(まだ完成には程遠いか) factor 自体の構造は多くの人々の努力で解明されて来たが、その中に subfactor がどのように入っているかという問題は必ずかしいが重要な研究課題である。index 理論は subfactor の分類の為には不可欠であると思われる。


講演者の研究により index 理論は II_1 とは限らない (つまり trace を持たない) 一般の factor に対しても展開される事が示された。 II_1 でない事から生じる困難は富田竹崎理論の spatial 版 (Connes の spatial theory) により解決される。先に書いたように subfactor の具体的実例及びその時の index の計算が重要である。 factor の実例の構成の為にはエルゴード理論が強力である (今の所 エルゴード理論のみでは構成できない factor が存在するかどうかは open problem である。) ので subfactor の構成の際も エルゴード理論が役立つ事が当然予想される。

談話会では まず factor の構成の為に エルゴード理論がどのように使われるかを説明する。次に エルゴード理論に基づいて (II_1 とは限らない) subfactor がどのように構成されるかという問題及びこれに関係した話題について説明する。

$U \in UGM$



$M(U) \quad (\exists \alpha \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } M(U) \sim \alpha \mathbb{1})$




$\exists m_0 < m_\infty$

s.t. $m_\infty \leq m \quad \text{block}_m = \square$

$m_0 \geq m \quad \text{block}_m = \blacksquare$

$\chi(U) = \text{Charge}(U) \stackrel{\text{or}}{=} \text{index}(U) = \dim \ker - \dim \text{coker}$

Fermion 的 能级



的 能级

(Pauli 不相容原理 每个 state 只能容纳 1 个 fermion)

所以 能级 的 填充 = 有序。

$UGM = \varprojlim UGM^n$ 在 complex mfd + structure 上

$T_{(U)} UGM \cong \text{Hom}_{\text{cont.}}(U, \mathcal{V}/U)$

$\text{End } \mathcal{V} = \left\{ f: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \mid \begin{array}{l} \text{homom. } \exists \beta \text{ s.t.} \\ \text{for } \forall m \in \mathbb{Z}, f(F^m \mathcal{V}) \subset F^{m+\beta} \mathcal{V} \end{array} \right\}$

$\text{End } \mathcal{V} \ni \forall f \rightarrow \bar{f} \in \text{Hom}_{\text{cont.}}(U, \mathcal{V}/U)$

$$z = \frac{1}{z}$$

$$\mathcal{D}_z = \mathbb{C}[z, z^{-1}] \left[\frac{d}{dz} \right]$$

$$V = \mathbb{C}((z^{-1}))$$

U

P

$$\mathcal{D}_z \subset \text{End } V$$

\mathcal{D}_z is UGM a complex analytic vector field z in \mathbb{C} .

$$z_{\frac{1}{2}} = z + \frac{1}{2} \ni \mu, \quad e^{\mu_i} = z^{\mu + \frac{1}{2}}$$

$\forall \mu \in \mathbb{Z}$.

§ UGM a Plicker embedding.

$$[U] \in \text{UGM},$$

U charge p.

$$\text{basis } N \ll 0, \quad e^v \quad v \leq N.$$

$$e^{N_1} e^{N_2} \dots e^N$$

$$e^{\mu(p-\frac{1}{2})} \wedge e^{\mu(p-\frac{3}{2})} \wedge \dots \wedge e^{\mu(n)} \wedge \dots$$

$$\hat{=} \{ \mu \leq 0, \quad \mu(n) = n \}$$

$$\frac{1}{z} \Big|_p = \prod_{\mu \leq 0} \mathbb{C} e^{\mu(p-\frac{1}{2})} \wedge e^{\mu(p-\frac{3}{2})} \wedge \dots$$

r. isobar

$$UGM \hookrightarrow P(\Xi), \quad \Xi = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \Xi_p$$

: fermion Fock space.

生成 $\bar{\psi}_\mu(x) = e^{-x} \wedge x \quad x \in \Xi$

消滅 $\psi_\mu(x) = e^x \lrcorner x$

x の中の e_μ を落とす操作

$$[\psi_\mu, \psi_\nu]_+ = \psi_\mu \psi_\nu + \psi_\nu \psi_\mu = 0$$

$$[\bar{\psi}_\mu, \bar{\psi}_\nu]_+ = 0$$

$$[\psi_\mu, \bar{\psi}_\nu]_+ = \delta_{\mu+\nu, 0}$$

$$\psi(z) = \sum \psi_\mu z^{-\mu - \frac{1}{2}}$$

$$\bar{\psi}(z) = \sum \bar{\psi}_\mu z^{-\mu - \frac{1}{2}}$$

$$[\mathcal{D}_z, \mathcal{D}_z] \subset \mathcal{D}_z$$

$$U \subset \mathcal{U} \quad \wedge U \subset \wedge^d U$$

$$P \in \text{End } U$$

$$(\wedge^d P)(f_1 \wedge \dots \wedge f_d)$$

$$= P(f_1) \wedge \dots \wedge P(f_d)$$

$$+ f_1 \wedge P(f_2) \wedge \dots$$

$$+ \dots + f_1 \wedge \dots \wedge P(f_d)$$

右に作用する

$$p = \text{id} \times \dots \times \text{id}$$

$$(\wedge^d p)(f_1 \wedge \dots \wedge f_d)$$

$$= \omega(f_1, \dots, f_d)$$

$\frac{1}{\pi} \frac{d}{dz}$ の生成子

$\bar{\Phi}(p) : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 正交变换???

for $p \in \mathbb{D}_z$.

$$\bar{\Phi}(p) := \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{(z=\infty)} (P_z \psi(z)) \bar{\psi}(z) : dz$$

$$: \psi_\mu \bar{\psi}_\nu : = \begin{cases} \psi_\mu \bar{\psi}_\nu & \mu < 0, \nu > 0 \\ -\bar{\psi}_\nu \psi_\mu & \mu > 0, \nu < 0 \\ \psi_\mu \bar{\psi}_\nu & \mu, \nu \geq 1 \end{cases}$$

$\mu > 0$

$$: \psi_\mu \bar{\psi}_\mu : = -\bar{\psi}_{-\mu} \psi_\mu \quad \psi_\mu \bar{\psi}_\mu + \bar{\psi}_{-\mu} \psi_\mu = id$$

(id 的消去 (零法与双对))

$$\bar{\Phi}(id)|_{\mathfrak{g}_p} = -p$$

$$p \longmapsto \bar{\Phi}(p)$$

is Lie alg homom 与反同态

$$\bar{\Phi}([p, q]) = [\bar{\Phi}(p), \bar{\Phi}(q)] + c(p, q)$$

() anomaly term

$$H^2(\mathbb{D}_z, \mathbb{C})$$

$$S^1$$

$$\mathbb{C}$$

物理の重要量

ament. $J_n = -\oint (z^n)$

$$J(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} J_n z^{-n-1}$$

Energy momentum tensor

$$T(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} L_n z^{-n-2}$$

$$L_n = \oint (z^n (z \frac{d}{dz} + \frac{1}{2}(n+1)))$$

$$[J_n, J_m] = n \delta_{n+m, 0}$$

$$[L_n, L_m] = (n-m) L_{n+m} + \frac{1}{12}(n^3-n) \delta_{n+m, 0}$$

Virasoro algebra

$$\mathcal{F} \xrightarrow[B]{} \mathcal{H}$$

$$\mathbb{P}(\mathcal{F}) \simeq \mathbb{P}(\mathcal{H})$$

B = Bosonization

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}[[t_1, t_2, \dots, t_n \dots]] \otimes \mathbb{C}[e^{\pm t_0}]$$

$|\Psi\rangle$

$$B|\Psi\rangle := \sum e^{t_0} \langle n | \exp\left(\sum_{m=1}^{\infty} J_m t_m\right) |\Psi\rangle$$

$$a_m = B J_m B^{-1} : \text{operator on } \mathcal{H}$$

$$a_m = \frac{\partial}{\partial t_m} \quad m \geq 0$$

$$a_{-m} = m t_m \quad m > 0$$

$$\psi(z) = \exp\left(\sum t_n z^n\right) e^{t_0} \exp\left(\log z \frac{\partial}{\partial t_0} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \frac{\partial}{\partial t_n}\right)$$

\mathbb{Z} 上. $\exp \sum \dots$ or $\frac{1}{n!} z^n \frac{\partial}{\partial z} z^n$ \mathcal{H} 上の問題

$$\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} \stackrel{\text{up}}{=} \mathbb{Z}[u, u^{-1}] \otimes \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]^{\wedge}$$

universal Witt ring

where

$$n t_n = \sum_{d|n} d \cdot x_d^{n/d}$$

と可なり. 類似な解決方法.

$$e^{\sum t_n z^n} = e^{\sum \frac{t_n}{n} z^n}$$

$$= \prod_{m=1}^{\infty} (1 - x_m z^m)^{-1}$$


$$\exp\left(+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n} \frac{\partial}{\partial t_n}\right) f(t_1, t_2, \dots) = f\left(t_1 + \frac{1}{z}, \dots\right)$$

$$t_n \rightarrow t_n - \frac{1}{nz^n}$$

$$\exp\left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n} \frac{\partial}{\partial t_n}\right) f(x) = f\left(x + \left[\frac{1}{z}\right]\right)$$

$$\left[\frac{1}{z}\right] = \left(\frac{1}{z}, 0, 0, \dots, 0\right)$$

Wdh ring via sum.



$$\psi(z)$$

$$\bar{\psi}(z)$$

$$J(z)$$

$$J_n$$

$$\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} \leftarrow$$

operator to go

θ関数 / \mathbb{Z} or / \mathbb{Q}_p
 theta constants / \mathbb{Z} (see chiu, Faltings)

(16) Witten complex oriented cobordism ring elliptic genus.) どの関数?

(17) Fuchs (Russian) Cohomology of ∞ dim Lie algebras

grass manif $\hookrightarrow \infty$ dim Lie alg.
 Gramer alg \hookrightarrow cobordism ring
 operators

natural Gram alg \hookrightarrow cobordism ring
 Ito Iwata 1970s
 (+ modification)

Comments by T. Ochiai

$$\mathbb{Z}[u, u^{-1}] \otimes \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]$$

is Burde ring of inf cyclic gr \mathbb{Z} .

(18) complex cobordism ring oriented $\cong \mathbb{Z}[[x_1, x_2, x_3, \dots]]$

(if so, or if not event) what the meaning of x_i ?

For instance over \mathbb{C} , (Sato) $\mathbb{Z}[[t_1, t_2, t_3, \dots]]$ in KP equation, $t_i =$ parameter of time evolution

star-triangle relation

三輪 哲 = (京大 数理研)

S : a set $S \ni a$: a state

$$W: \mathbb{C} \times S^4 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(u, a, b, c, d) \mapsto \begin{array}{ccc} a & & b \\ & \boxed{u} & \\ d & & c \end{array}$$

W is star-triangle relation の 同解

$$\Leftrightarrow \sum_g f \begin{array}{ccc} a & & b \\ & \boxed{u+v} & \\ g & & g \\ e & & d \end{array} c = \sum_g f \begin{array}{ccc} a & & b \\ & \boxed{u} & \\ & g & \\ e & & d \end{array} c$$

for $\forall a, b, c, d, e, f$

U : face operator $\text{End}(V \times V \times V)$

$$\dim V = \#(S)$$

$$U_{\begin{array}{ccc} a & & b \\ & \boxed{} & \\ b' & & c' \end{array}} = \delta_{aa'} \delta_{cc'} \begin{array}{ccc} a & & b \\ & \boxed{} & \\ b' & & c' \end{array}$$

$$U_i \in \text{End}(V_1 \times V_2 \times \dots \times V_{m+2})$$

$$V_i \times V_{i+1} \times V_{i+2} (= \text{face})$$

$$U_i(u) U_j(v) = U_j(v) U_i(u) \quad |i-j| \geq 2$$


$$U_{i+1}(u) U_i(u+v) U_{i+1}(v) = U_i(v) U_{i+1}(u+v) U_{i+1}(u)$$

Young 図形の増大列

n, l : positive integer, ≥ 2 , $(-1)^{n-1}$
 $P_+(n; l)$: Young 図形の同値類
 $(f_0, \dots, f_{n-1}) \leftrightarrow$ f_0

- 1) 深さ n 以下 f_{n-1}
- 2) $f_0 - f_{n-1} \leq l$
- 3) $(f_0, \dots, f_{n-1}) \sim (f_0 + 1, \dots, f_{n-1})$

$a \in \mathcal{S} \quad a = \sum_{\mu=0}^{n-1} a^\mu \Lambda_\mu, \quad \sum_{\mu=0}^{n-1} a^\mu = l$
 $a^\mu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$




$(a, b) \in \mathcal{S}$: admissible $a^\mu \rightarrow b^\mu$
 $\Leftrightarrow b = a + \hat{\mu} \quad \mu = 0, 1, \dots, n-1$

$\hat{\mu} = (0, \dots, 1, \dots, 0)$
 \uparrow
 μ

$= \Lambda_{\mu+1} - \Lambda_\mu$

例 $n=3, l=2$



$$\mathcal{J}^* = \overline{\mathcal{J}}^* \oplus \mathbb{C}\Lambda_0 \oplus \mathbb{C}\delta$$

$$\overline{\mathcal{J}}^* = \left\{ \sum_{\mu=0}^{n-1} x_{\mu} \varepsilon_{\mu} \mid \sum_{\mu=0}^{n-1} x_{\mu} = 0 \right\}$$

内積

$$\langle \varepsilon_{\mu}, \varepsilon_{\nu} \rangle = \delta_{\mu\nu}, \quad \overline{\mathcal{J}}^* \perp (\mathbb{C}\Lambda_0 \oplus \mathbb{C}\delta)$$

$$(\Lambda_0, \Lambda_0) = (\delta, \delta) = 0, \quad (\Lambda_0, \delta) = 1$$

$$\rho = \sum_{\mu=0}^{n-1} \Lambda_{\mu} \quad a_{\mu\nu} = \langle a + \rho, \varepsilon_{\mu} - \varepsilon_{\nu} \rangle$$

$A_{n-1}^{(1)}$ family

$$\theta_1(u, p) = 2|p| \sin u \prod_{k=1}^{\infty} (1 - 2p^k \cos 2u + p^{2k})(1 - p^k)$$

$$[u] = \theta_1\left(\frac{\pi u}{L}, p\right)$$

$$a \in \sum_{\mu=0}^{n-1} \mathbb{C}\Lambda_{\mu} \quad (z \neq \pm Lz)$$

$$a \begin{array}{c} \mu \\ \nearrow \\ \square \\ \searrow \\ \mu \end{array} = \frac{[u+1]}{[1]}$$

$$a \begin{array}{c} \mu \\ \nearrow \\ \square \\ \searrow \\ \nu \end{array} = \frac{[a_{\mu\nu} - u]}{[a_{\mu\nu}]}$$

$$a \begin{array}{c} \nu \\ \nearrow \\ \square \\ \searrow \\ \mu \end{array} = \frac{[u][a_{\mu\nu} + 1]}{[1][a_{\mu\nu}]}$$

$(\mu \neq \nu)$

restriction $a \in \mathcal{S} = P_+(n; l)$

$$L = n + l$$

fusion $N \geq 1$


$(a, b) : N$ admissible

(1) $b = a + \hat{\mu}_1 + \dots + \hat{\mu}_N$

(2) $\forall j = 0, 1, \dots, N, \forall \sigma \in \mathfrak{S}_N$

(1)だけの時 N weakly admissible, $a \xrightarrow{N} b$ と書く
 $a + \hat{\mu}_{\sigma(1)} + \dots + \hat{\mu}_{\sigma(j)} \in P_+(n, l)$
 $a = a_0$

$$\begin{array}{ccc} a & N & b \\ M & \boxed{u} & M \\ d & N & c \end{array} =$$



\oplus : 和の意味

(a_0, a_1, \dots, a_M) $a_{i+1} = a_i + \hat{\mu}_i$
 (c_0, c_1, \dots, c_N) $c_{i+1} = c_i + \hat{\nu}_i$

の進む方向に従って, STR の解 restriction $a \in \mathcal{S} = P_+(n; l)$
 $L = n + l$

さらに $a \xrightarrow{N} b$ は N admissible に属す。

*1の注意

$p=0$ とすると STR の解は $x = e^{2\pi i u/L}$ の多項式に reduce する。

$$U_i(u) = V_i x^N + \dots$$

この時 V_i は braid 群の表現を与える。

$$B_m: \begin{aligned} V_i V_j &= V_j V_i & |i-j| \geq 2 \\ V_{i+1} V_i V_{i+1} &= V_i V_{i+1} V_i \end{aligned}$$

特に $N=1$ として

$V_1 \times V_2 \times \dots \times V_{m+2}$ の element

$(a_1, a_2, \dots, a_{m+2})$ として

(1) $a_i = \phi$

(2) (a_i, a_{i+1}) : admissible

を満たすものたちで張られた空間 \mathcal{V}_m

既約な表現空間となり、

$$B_m \longrightarrow \text{End}(\mathcal{V}_m)$$



J_m

$$(V_i - 1)(V_i + q) = 0$$

$$q = e^{2\pi i/L}$$

& factor して Iwahori algebra の既約表現を与える

この表現は別の所で現われる。

(1) Wenzl : $C^* \frac{D}{E}$

II_1 factor-subfactor の構成

(2) Tsuchiya-Kamei : conformal field theory

$A_1^{(1)}$ symmetry を持つ conformal field theory

における $m+2$ 点相関関数の

monodromy 表現.

Local state probability

$N=1$ の restricted model.

\mathcal{L} : 2次元正方形格子 $i = (i_1, i_2) \in \mathcal{L}$

\mathcal{C} : a configuration $(a_i)_{i \in \mathcal{L}}$ $a_i \in \mathcal{S}$
 \parallel
 $\mathcal{P}_+(n; l)$

(1) 制限条件 $(a_i, a_{i+(0,1)})$

$(a_i, a_{i+(1,0)})$ \nexists admissible

(2) 境界条件 $|i| \gg 0$ の時

$$a_i = b_{i_1+i_2}$$


$$b_j = \xi + \Lambda_{\nu+j-1}$$

$$\xi \in \mathcal{P}_+(n; l-1)$$

$$\Lambda_\nu \in \mathcal{P}_+(n; 1)$$

$$b_j \in \mathcal{P}_+(n; l)$$

例



$$b_{3j} = \phi$$

$$b_{1+3j} = \square$$

$$b_{2+3j} = \square$$

$$P(a) = \frac{\sum_c \delta_{a, a_{\text{face}}} \prod_{\square} u}{\sum_{c \text{ face}} \prod_{\square} u}$$

は、パラメタ (u, p) の領域 $0 < p < 1, -1 < u < 0$ で well-defined になり、答は u に依らない。

$A_{n-1}^{0,1}$ の指標の分解

$$A_{n-1} = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}), \quad \langle X, Y \rangle = \text{tr} XY$$

$$X^a : \text{o.n.b.} \quad \langle X^a, X^b \rangle = \delta_{ab}$$

$$\text{affine Lie algebra} \quad [X^a, X^b] = f_c^{ab} X^c$$

$$[X_m^a, X_n^b] = f_c^{ab} X_{m+n}^c + m \langle X^a, X^b \rangle \delta_{m+n, 0} l$$

$$[X_m^a, l] = 0$$

$a \in \mathcal{P}_+(n; l)$ に対して

$A_{n-1}^{0,1}$ の既約表現 $L(a)$ が決まる。

$$L(a) \ni |vac\rangle$$

$$X_m^a |vac\rangle = 0 \quad m > 0$$

$$h_{i,i} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{pmatrix}_{\substack{\leftarrow i \\ \leftarrow i+1}} \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) \hookrightarrow A_{n-1}^{0,1} \text{ に対して}$$

$$h_i |vac\rangle = a^i |vac\rangle$$

$$l |vac\rangle = \sum_{i=1}^{n-1} a^i |vac\rangle$$

この既約表現の指標は, n 変数

$$(z_1, \dots, z_{n-1}, q) \in (\mathbb{C}^\times)^{n-1} \times \mathbb{C}_{|q| < 1}$$

の函数。 $\chi_a(z_1, \dots, z_{n-1}, q)$ と書く。
それを

Kac-Peterson ('84 Adv. in Math.)

χ_a は q を elliptic nome とする q -函数の
 比の形に書ける。

$$A_{n-1}^{(1)} \oplus A_{n-1}^{(1)} \supset \Delta(A_{n-1}^{(1)}) : \text{diagonal}$$

$$\xi \quad \eta = A_\nu$$

$L(\xi) \times L(\eta)$ を $\Delta(A_{n-1}^{(1)})$ の既約表現に
 分解すると, 対応して指標の恒等式

$$\chi_\xi(z_1, \dots, z_{n-1}; q) \chi_\eta(z_1, \dots, z_{n-1}; q)$$

$$= \sum_a b_{\xi\eta a}(q) \chi_a(z_1, \dots, z_{n-1}; q)$$

が得られる。この時 ($p = e^{-\epsilon}$, $x = e^{-4\pi^2/L\epsilon}$)

$$P(a) = \frac{b_{\xi\eta a}(x^n) \chi_a(x, \dots, x; x^n)}{\chi_\xi(x, \dots, x; x^n) \chi_\eta(x, \dots, x; x^n)}$$

例2の注意

Virasoro 代数 Vir

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{m^3-m}{12} \delta_{m,-n} c$$

$$[L_m, c] = 0$$

Vir の表現加群 V であって

$$V_h = \{ v \in V \mid L_0 v = h v \}$$

が $\forall h$ に対して有限次元のものに対して
指標を $\dim V \cdot q^{L_0 - c/24}$ で定義する。

$b_{3/2, a}(q)$ は Virasoro 代数の指標となり、

$$q = e^{2\pi i \tau} \longrightarrow \bar{q} = e^{-2\pi i / \tau}$$

に対して線型空間 $\sum_{\substack{\{3/2, a\}} \mathbb{C} b_{3/2, a}(q)$ は
invariant.

$p=0$ とした model \mathbb{Z}^2 周りの長さ n cylindrical な lattice を考える。軸方向に

$$(i_1, i_2 + m') = (i_1 + m'', i_2)$$

という同一視を行なうことができる有限格子を

$$L(\tau) \quad \tau = \sqrt{-1} \frac{m' + \sqrt{-1} m''}{n}$$

と書く。

Cardy ('86) の principle

$$Z_{L(\tau)} = \prod_e \sum_{\text{face}} \square$$

$$\log Z_{L(\tau)} = (-\log f) m' n + Z_f(\tau) + \dots$$

$$\text{この時} \quad Z_f(\tau) = \frac{1}{2} \sum_{\xi, \eta, a} b_{\xi \eta a}(\tau) b_{\xi \eta a}(\tau^*)$$

τ^* は τ の複素共役。

$Z_f(\tau)$ は modular invariant.

Knitting submanifolds locally, のアブストラクト

阪市大 杉田幹也

$L^n \subset M^{n+2}$ codim. 2 の submanifold

L, M 共に connected, closed, oriented, smooth manifold とする。

この講演では 次の問題を考える。

問題 $L \in \text{local}$ に knot させると, $L \cap M$ の新しい
土里めは何か 得られるか?

これを少し正確に定式化する。

L の勝手な点 $x \in L$ を取り, x の M における disk 近傍 D_M^{n+2}

とある。 $D_M^{n+2} \cap L = D_L^n$ は x の L における disk 近傍である。

対 (D_M^{n+2}, D_L^n) は standard な対 (D^{n+2}, D^n) と diffeo. である。


さて, (D^{n+2}, D) を次のようにする。

(1) $D \cong D^n$ diffeo.

(2) $\partial(D^{n+2}, D) = \partial(D^{n+2}, D^n)$ ∂ は境界を表わす。


(3) D は D^{n+2} の中で knot している。

$n=1$ の例





$L \in \text{local}$ に knot させるとは (D_M^{n+2}, D_L^n) を上のような (D^{n+2}, D) で置きかえることである。

例



この部分を上記 (D^3, D) で置きかえると



この操作では M, L は abstract には変わっていないが

L の土里めは明らかに異なっているかも知れない。

$$(D^{n+2}, D) \cup (D^{n+2}, D^n) = (S^{n+2}, K) \quad \text{とおく}$$

ここで \cup は境界での貼り合わせ。 $K = D \cup D^n$ は S^n と diffeo. 故に (S^{n+2}, K) は m -Penot を定める。 $\pm a$ の (D_M^{n+2}, D_L^n) の部分を (D^{n+2}, D) で置き換える操作は (M, L) と (S^{n+2}, K) と連結和することと同じであることに注意する。以上の考察の下に、次の集合を考える

$$I(M, L) = \{ (S^{n+2}, K) \in \mathcal{K}_n \mid (M, L) \# (S^{n+2}, K) \cong (M, L) \}$$

ここで \mathcal{K}_n は m -Penot 全体の isotopy classes の集合で連結和により abelian monoid になる。 $I(M, L)$ は \mathcal{K}_n の submonoid になる。この $I(M, L)$ から L が local Penot として、新しい埋め込みから得られるかを記述しつとと考察される。

$I(M, L)$ の構造には、 L の meridian の $H_1(M-L; \mathbb{Z})$ 又は $\pi_1(M-L)$ の order が関連していることがわかる。どうもその order が \mathbb{Z} で $I(M, L)$ は決まってしまうように思われる。

よおさうに言え、meridian の order (p とか ∞) から $\infty, 1, 1 < p < \infty$ に分れる。次の3つの type が起る。

$$\text{Type 1.} \quad I(M, L) = \{0\}$$

$$\text{Type 2.} \quad I(M, L) = \mathcal{K}_n$$

$$\text{Type 3.} \quad \{0\} \subsetneq I(M, L) \subsetneq \mathcal{K}_n$$

Type 3 は generalized Smith conjecture の反例と関係がある。

特異ラグランジュ多様体について

1987. 10. 21

北大理 石川 剛郎

10) (M^{2n}, ω) を シンプレクティック多様体とする. M の部分多様体 L が $\omega|_L = 0$ を満たすとき イソトロピック多様体という. n 次元イソトロピック多様体を ラグランジュ多様体と呼ぶ.

例. B を n 次元多様体, T^*B を B の余接バンドルとする. T^*B には自然なシンプレクティック構造が入る; T^*B 上の 1-form α で, 任意の B 上の 1-form $\beta: B \rightarrow T^*B$ に対し $\beta^*\alpha = \beta$ となるものが一意的に存在する (canonical 1-form) を α とし $\omega = d\alpha$ とおく.

ラグランジュ多様体の例としては closed 1-form $\beta: B \rightarrow T^*B$ の像 $\beta(B)$ がある. これは projection $\pi: T^*B \rightarrow B$ に対し 特異性をもたないが, 一般のラグランジュ多様体 $L \subset T^*B$ に対し $\pi|_L: L \rightarrow B$ は特異点をもつ (ラグランジュ特異点).

20) 特異ラグランジュ多様体の定義はまだ定っていないが, 次のような定義のしかたがある. (M^{2n}, ω) シンプレクティック多様体の部分集合 X が ラグランジュバリエティ — とは

(1番目の定義) X は n 次元 involutive variety

(2 ") X は stratification をもち, この各 stratum が isotropic $\dim X = n$

(3 ") 任意の C^∞ map $f: N \rightarrow M$, $f(N) \subset X$ に対し $f^*\omega = 0$ かつ $\dim X = n$.

この3つは対等は, 線型偏微分方程式で holonomic なものの characteristic variety として, あるいは Lagrange 多様体の簡約, あるいは Lagrange map の特異点のある場合の像として現われる.

20) $f: N, \gamma_0 \rightarrow (T^*B, \omega)$ が isotropic map-germ (Lagrangian map-germ)
 $\stackrel{\text{def}}{\iff} f^*\omega = 0$ (かつ $\dim N = \dim B$)

$f: N, \gamma_0 \rightarrow (T^*B, \omega)$, $g: N', \gamma_0 \rightarrow (T^*B', \omega')$ と 2つの Lagrangian map-germ とすると f と g が equivalent iff 図式

$$N, \gamma_0 \xrightarrow{f} T^*B, f(\gamma_0) \xrightarrow{\pi} B, \pi f(\gamma_0)$$

$$\begin{array}{ccccc} \text{SII} \downarrow & \circlearrowleft & \text{SII} \downarrow \tau & \circlearrowleft & \text{SII} \\ & & & & \end{array}$$

$$N', \gamma_0 \xrightarrow{g} T^*B', g(\gamma_0) \xrightarrow{\pi'} B', \pi' g(\gamma_0)$$

を可換にするために向きの diffeomorphism τ , $\tau^*(\omega') = \omega$ と $\tau f' = f$ が存在する iff である。

f が Lagrangian stable iff, f は Lagrange map の中で $f^*\omega = 0$ かつ f と同値な芽を消すことができない iff である。

次の結果が知られている

Theorem (Arnold 1972)

$f: N, \gamma_0 \rightarrow T^*B$ が Lagrange stable immersion germ iff
 このとき, f は \mathcal{L} -stable $\iff f$ is generic family

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}: Y \rightarrow \mathbb{R} & \text{が} & \mathcal{G}/(\mathcal{Y} \circ f(\gamma_0)) \text{ の versal} \\ \downarrow \pi & & \\ B & & \\ \text{deformation} & & \end{array}$$


Theorem (Givental 1986)

$f: \mathbb{R}^2, 0 \rightarrow T^*\mathbb{R}^2, 0$ と

$$f(x_1, x_2) = (q_1, q_2, p_1, p_2) = (x_1, \frac{x_2^2}{2}, \frac{x_2^3}{3}, x_1 x_2)$$

とすると, f は \mathcal{L} -stable.

f or $f(\mathbb{R}^2)$ は open Whitney umbrella $W_2(5)$ である。



任意の \mathcal{L} -stable map $f: \mathbb{R}^{2n}, 0 \rightarrow T^*\mathbb{R}^{2n}, 0$ $f = W_{2n}(4n+1)$
 を構成し, kernel rank one of Lagrange map-germ は本質的にこれに等しいことを示した。

談話会 (10月5日) - 1974.10.5

L^2 コホモロジーと交叉コホモロジー

大沢健夫

(X, ds^2) を n 次元完備 Kähler 多様体とする。

X 上の L^2 コホモロジーが de Rham 或は Dolbeault

の意味の通常のコホモロジーと同型である為の

条件を述べ、以下の場合に (次数の制限つきで、

これが実現されることをいふ)。

1. 滑らかな境界をもつ擬凸領域とその上、

Bergman type の計量

2. 射影的代数多様体の非特異部分とその上、

Poincaré type の計量

更に 後者において計量のとり方の自由度を考慮

に入れるとより好都合な計量の存在が言える。

即ち、

定理 \bar{X} を (\mathbb{C} 上の) 完備な射影的代数多様体, X をその非特異部分とせよ。このとき X 上の完備な Kähler 計量 ds^2 で次の二条件をみたすものが存在する。

1) ds^2 の基本形式 ω の定めるコホモロジー類 $[\omega] \in H^2(X, \mathbb{R})$ は \bar{X} 上の Fubini-Study metric から導かれるものと一致する。

2) $H_{(2)}(X) \cong IH(\bar{X})$, 但し $H_{(2)}$, IH はそれぞれ (\mathbb{C} 係数) L^2 コホモロジー, 交叉コホモロジーを表す。

系 $\dim IH^{2m-1}(\bar{X}) \equiv 0 \pmod{2}$

Nets of conics and deformations of singularities

The discriminant of a net of conics is a cubic curve Δ in the plane Π parametrising the net. For Δ smooth, there are 3 isomorphism classes of corresponding nets: these are determined by the double covering $\tilde{\Delta}$ of Δ consisting of lines belonging to line-pairs of the net.

In the real case, the same is true but there are 4 topologically distinct types of double covering.

A map-germ $f_0: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, homogeneous of degree 2, determines a net. We seek to classify deformations to Σ^2 , for f_0 as above. Such a deformation is obtained by adding to f_0 a linear map f_1 of rank 1, determining a line L in \mathbb{P}^2 and a line Λ in Π . Then Λ determines a subpencil of the net, and the singularity has type $B_{r+2, s+2}$ if L passes through base points of this pencil of multiplicities r, s (set r resp $s = 0$ if there is no base point), and C_{r-1} if L is a common tangent at a base point of multiplicity r .

By considering the number of connected components of the closures of the strata $C_1, B_{3,4}$ and $B'_{3,4}$ in the deformation, the 4 real types of net can be distinguished.

E. N. C. Wall

4/11/87

(アブストラクト)

Sapporo, Nov. 11, 1987

2重正則有向グラフ

甲南大理 伊藤 昇

(v, k, λ) symmetric design はつきりの様にも定義される。まず次数 v の $(0, 1)$ 行列 A を、 $AA^t = (k-\lambda)I + J$, ここで J は転置, I, J はそれぞれ次数 v の単位行列, 全1行列をいめず, を満足するもの全部の集合を $A(v, k, \lambda)$ とおく。 $A_1, A_2 \in A(v, k, \lambda)$ において A_2 が A_1 と同値であるとは、置換行列 P, Q が存在して $A_2 = P^t A_1 Q$ とあることとする。これは同値関係で、各同値類 D, \dots を symmetric design といい (s.d. と略する)

Symmetric design is Steiner, Kummer, Sylvester, Hadamard 等によっても考察されているので, design という言葉以前に出現していることに注意したい。しかし一般論を作り上げようとしたのは 1950年代からであって, とくに Ryser (最近亡くされた) を中心とする人達の結果が著しい: $k-\lambda = k^2 - \lambda v$, $AA^t = A^t A$ 即ち A は正規行列, さらには $x^2 = (k-\lambda)y^2 + (-1)^{\frac{v-1}{2}}z^2$ が自明でない整数解を持つ等の結果がある。数年前に Lander がその後の成果をある程度まとめたものを出した, 一般論では進歩がない。ただし A の単因子群, A をその行ベクトル達が作る lattice の生成行列と見る, また code と考える などの方向を打出していると思える。むともしこれらのことは誰でも考えることとも思えるが, 若し人達に興味を持って頂きたいと思う。 $v=11, k=11, \lambda=1$ 即ち 位数 10 の射影平面 6 とときき話題になる。たとえば存在すれば, A の形では $(111!)^2$ もあることに注意したい。また一般論に大きな影響を与える問題とも思う。

もし A の範囲を適当に制限したら一般論を推進する可能性がでて来るのではなか。これが話者の考えであって, またその制限として, $A+A^t+I$ も $(0, 1)$ 行列というのを取り上げる。こうした時の $A(v, k, \lambda)$ の部分集合を $B(v, k, \lambda)$ とおく。 $A_1, A_2 \in B(v, k, \lambda)$ において A_2 が A_1 と同値であるとは置換行列 P が存在して $A_2 = P^t A_1 Q$ とあることとする。これは同値関係であって, 各同値類 \mathcal{N}, \dots を doubly regular asymmetric digraph (2重正則有向グラフ, drad と略) といい。このとき $v \geq 2k+1$ とするればよいらしい, sd には $A \in A(v, k, \lambda)$ なら $J-A \in A(v, v-k, v-2k+\lambda)$ であり, sd の同値関係をも上手に対応しているのだ。一般論としての制限はよさくない。 \mathcal{N} についてはパターンが考えられる。そして $A+A^t+I+N=J$ とすると N は対称行列で, あるグラフ

$N(v)$ グラフ と呼ぶ, の (代表行列の) 隣接行列と考えられる. $N(v)$ is empty
 のときだけは, 以前から文献にある. これは Hadamard トーメント ($v = 2n + 1$)
 の場合である. $N(v)$ is empty である, しかも connected である. 場合として
 正則 Hadamard 行列 (design) に対応する d 個の 特徴付けられる. この様に
 ある程度の結果は得られているが, 問題山積で, 若し人達は是非興味を持って
 頂きたいと思う.

対称空間の構造について

長野 正 (上智大)

対称空間 M は各点 x で点対称 s_x の与えられた多様体で、ここでは或リーマン計量をすべての s_x が保つと仮定する。 n 次元ユークリッド空間は例であるが、以下 M は連結コンパクトとする。対称空間 M から対称空間 N への滑らかな写像 f が各点対称と可換なら ($f \circ s_x = s_{f(x)} \circ f$)、 f は準同型である (定義)。 M が連結なのでこれは全測地的と同等である。以下部分空間と言えは包含写像が準同型である対称空間を意味する。

点 o に対し s_o の固定点集合 (部分空間) $F(s_o, M) = \{x \in M; s_o(x) = x\}$ の各連結成分 M^+ を極地と呼ぶ; x を通る極地を $M^+(x)$ と記す。極地 M^+ の任意の点 p での直交補空間 $M^-(p)$ は一意的に存在する; $M^-(p)$ は連結部分空間で定義によりその p での接空間は M^+ の接空間の直交補空間である。 M^+ の点 p の採り方に $M^-(p)$ の同型類はよらない。 M^- は M と同じ階数を持つ。極地は M と位相的に密接な関係にあり、 $M^-(p)$ の局所構造及び基本群は M のと深く関係する。 M は一つの対 $(M^+, M^-(p))$ で完全に決まる。

例。ユニタリ群 $U(m)$ は $s_x(y) = xy^{-1}x$ により対称空間、 $M = U(m)$ の部分空間である測地線の特徴は $U(m)$ の連結 1 次元部分群と合同な (自己同型群で互いに移れる) ことである。 x が $F(s_1, M)$ に入る $\Leftrightarrow x$ は包合的 ($x^2 = 1$)。この x の trace $\text{Tr}(x)$ が $n - 2r$ なら $M^+(x) \cong G_r(\mathbb{C}^m) := [\mathbb{C}^m$ 中の r 次元部分空間の成す複素グラスマン多様体], $0 \leq r \leq m$, である。その直交補空間は $M^-(x) \cong U(r) \times U(m-r)$ 。極地 $G_r(\mathbb{C}^m)$ は $U(m) / (U(r) \times U(m-r))$ と書けるが、一般に原点 o を停める自己同型の群の単位元を含む連結成分 (今の場合 $U(m)$, 正確には $\text{ad } U(m)$) が各極地に推移的に働く。

複素グラスマン多様体 $G_r(\mathbb{C}^m)$, $2r \leq m$, の 2 点 x, y の (算術的) 距離 $d(x, y) := \dim x / (x \cap y)$ を考える。W.L.Chow [Ann. of Math. 50(1949)] は、 $r > 1$ の仮定の下に「全単射 $f: G_r(\mathbb{C}^m) \rightarrow G_r(\mathbb{C}^m)$ が距離 d を保つなら、 f は正則または反正則変換である」ことを証明した。($G_r(\mathbb{C}^m)$ の通常位相に関する連続性を f に仮定しなかった。) 証明のアイデアは鮮明で射影幾何学の基本定理を使う。

この Chow の定理の一般化を試みる (但し f は滑めらかと仮定する)。先ず距離

を拡張する. 単純な連結コンパクト対称空間 M 中の直径が最小の (包含関係に関し) 極大な球を Helgason 球 (H 球) と呼ぶ. M の自己同型群は推移的に働くから任意の点に対しそれを通る H 球が存在する. H 球は合同を除き一意的である. M の 2 点 x, y の距離 d が p 以下だと x, y を p 個の H 球の鎖 (列) で結べることだと定義する; 但し $x=y$ なら $d(x, y) = 0$ と決める. それは上半連続である. そして $M = G_r(\mathbb{C}^m)$ のとき Chow の距離に一致する. この距離が M の幾何学的構造 (成層分解 stratification) と密接に関係することを次に見よう. その成層分解は M を極地上の円盤束の離散和に分解するのである.

幾何学的構造の説明のために M として, 典型的しかも基本的な例としてユニタリ群 $U(n)$ を採ろう. 先ず $U(1)$ は円である. これを $\{-1\}$ とその余集合に分けると胞体分割が出来る. その余集合は 1 への最短測地線が一意的である点の全体と解釈できるので $CCL(1)$ と記そう ($CCL(1) = \text{the complement of the cut locus of } 1$); $U(1) = \{-1\} \sqcup CCL(1)$. 一般の $U(n)$ の場合にも同様である. M 中の点 p への最短測地線が一意的である点の全体を $CCL(p, M)$ と記す; $CCL(p, M)$ は M の開集合で円板と微分同相である. $M = U(m)$ なら, ユニタリ群の極大円環体が対角行列全体 $\cong U(1)^m$ と同型だから, 任意の点 p は, その固有値 -1 の重複度が r なら, 極地 $M^+ \cong G_r(\mathbb{C}^m)$ の或点 x への最短測地線が一意的で $CCL(x, M) \cap M^-(x)$ に含まれる. 詳しくみると, 直交補空間 $M^-(x)$ を $U(r) \times U(m-r)$ と同一視すれば円板 $CCL(x, U(r))$ 中に在る. x を M^+ 内に動かしせば M^+ 上の円板束 D_r が出来る. $U(m)$ の成層分解はすべての極地上の円板束の和 $\sqcup_r D_r$ で与えられる.

$M = SU(m)$ でも同様; 但し極地 $G_r(\mathbb{C}^m)$ は偶数の r に対して存在する. 対応する円板束を D_r と書けば, 1 からの距離が r の点全体が正しく D_{2r} になる; $r = 0, 1, \dots, \text{ or } \lfloor m/2 \rfloor$. $M = G_r(\mathbb{C}^m)$ なら極地は $G_a(\mathbb{C}^r) \times G_b(\mathbb{C}^{m-r})$, $a+b=r$, で直交補空間は $G_a(\mathbb{C}^{m-2b}) \times G_b(\mathbb{C}^{2b})$ であり $G_a(\mathbb{C}^r) \times G_b(\mathbb{C}^{m-r})$ 上の円板束のファイバーは $CCL(x, G_a(\mathbb{C}^{m-2b}))$ である. これにより M の成層分解と距離 d による分割が同時に得られる.

成層分解と Chow の定理の拡張は対称 R 空間で成立する. 竹内 勝 [都立大セミナー (1987) 及び preprint] が, 田中 昇の理論 [特に *J. Math. Soc. Japan* (1965), *Hokkaido Math. J.* (1985)] を使って証明した.

1987年12月9日 北大談話会

Generic な 1 階偏微分方程式

北大理 泉屋周一

\mathbb{R}^{2m+1} ((x, z, p)) 上に、標準 1 形式 $\theta = dz - \sum_{i=1}^m p_i dx_i$ を与えて、 \mathbb{R}^{2m+1} を接触多様体とみなす。この時、 $L \subset \mathbb{R}^{2m+1}$ が Legendrian であるとは $\dim L = m$ & $i^*\theta = 0$ を満たす事とする。今、 $F: \mathbb{R}^{2m+1} \rightarrow \mathbb{R}$ を 1 階偏微分方程式とする ($F^{-1}(0)$ は smooth submfld) 時、その (abstract) solution γ は、 $\gamma(L) \subset F^{-1}(0)$ なる Legendrian immersion の事とする。 $\pi: \mathbb{R}^{2m+1} \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$ を $\pi(x, z, p) = (x, z)$ と定義して、 $\gamma: L \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1}$ を Legendrian immersion とする時、 $\pi \circ \gamma$ の特異点を Legendre 特異点 と呼ぶ。また、1 階偏微分方程式 $F: \mathbb{R}^{2m+1} \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 $\pi(F^{-1}(0))$ の特異点を π -特異点 と呼び、 π -特異点の集合を $\Sigma(F)$ とおす。 $\Sigma(F)$ が Legendrian submanifold になっている時、それを $F=0$ の 特異解 と呼ぶ。

今、局所的な性質を調べるので、1 階偏微分方程式 $F: (\mathbb{R}^{2m+1}, (x, z, p)) \rightarrow (\mathbb{R}, 0)$ について考える。それを general type であるとは、 F のある代表元 \tilde{F} とすると $\pi(F^{-1}(0))$ が fold type ($\det(F_{pp}) \neq 0$) であるような点 $(x, z) \in \Sigma(F)$ の中に dense に存在する事とする。この様な F のは generic に存在する。この時、以下の定理を得た。

定理 I. "generic" な 1 階偏微分方程式 $F=0$ at (x_0, z_0, p_0) は 特異解を持たない。すいて、その $\Sigma(F)$ は 高々 (x_0, z_0, p_0) を除いて abstract solutions の Legendre 特異点からなる

general type の 1 階偏微分方程式 $F=0$ で 特異解を γ を持つものについては以下の結果を得た

定理 II. $F=0$ at (x_0, z_0, p_0) を general type の 1 階偏微分方程式 $F=0$ で 特異解 γ を持つものとする。この時、各葉が abstract solution からなる $F^{-1}(0)$ 上の foliation で (1) 各葉は $\Sigma(F)$ に横断正則的に交わる (2) $L(x, z, p)$ を fold point $(x, z, p) \in \Sigma(F)$ を通るような葉とあると、 $d\pi(T_{(x, z, p)} L) = d\pi(T_{(x, z, p)} \Sigma(F))$ が成り立つような F の (x, z, p) がただ 1 つだけ存在する

この2つの定理は "general type" の1階偏微分方程式の性質のため
 を決めるものである。そこで、さらに詳しく性質を調べるために $(x_0, z_0, p_0) \in \Sigma(F)$
 から contact regular point ($\tilde{u} \in E(T_{(x_0, z_0, p_0)} F^{(1)}) \neq 0$) の場合に、
 その方程式の解の特異点の配置 (configuration) を調べる方法を考える。

\mathbb{R}^{2m+1} の coordinate $(x_1, \dots, x_m, z, p_1, \dots, p_m)$ について Legendre 変換 Σ

$$x_1 = p_1, \dots, x_m = p_m, z = x_1 p_1 + \dots + x_m p_m - F, p_1 = x_1, \dots, p_m = x_m$$

と定める。この時、 $G(x_1, \dots, x_m, z, p_1, \dots, p_m) = F(p_1, \dots, p_m, p_1 x_1 + \dots + p_m x_m - z, x_1, \dots, x_m)$
 とおく。 $F^{(1)}$ の contact regular point は $G^{(1)}$ の π -regular point に
 対応することからわかる。この時、以下の古典的結果が知られている

定理 1階偏微分方程式 $G(x_1, \dots, x_m, z, p_1, \dots, p_m) = 0$ から

$$\frac{\partial G}{\partial p_i}(x_0, z_0, p_0) \neq 0 \quad \& \quad G(x_0, z_0, p_0) = 0 \quad \text{をみたす時、} \quad (x_0, z_0, p_0) \text{ の}$$

ある近傍で $\Sigma = f(x_1, \dots, x_m, C_1, \dots, C_m) - z$ ($T = \text{rank} \left(\frac{\partial f}{\partial C_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) = m$)
 なる (古典) 解を求む。



従ってこの $f(x_1, \dots, x_m, C_1, \dots, C_m)$ を Legendre 変換すると $F^{(1)}$ の解が
 得られる。このようにして得られた $F^{(1)}$ の解の generating family は

$$f(x_1, \dots, x_m, C_1, \dots, C_m) - z - \sum_{i=1}^m U_i x_i$$

という函数族であらえらる。 (U_1, \dots, U_m, z) (C_1, \dots, C_m) を

separated parameter とする。 P - K -同値類から $F^{(1)}$ の解の configuration
 を決定していることがわかる。たとえば $m=1$ の時、generic には分類すると
 $x^2 - ux + c - z$ $x^3 - ux + c - z$ $x^4 - ux + cx^2 + c - z$

となり、後の2つは以下の図の様に解が配置されている事がわかる



これは、 $m=1$ のとき Bruce が示した事の "キチ" とした証明である。

ON PERTURBATION PROBLEM OF EMBEDDED EIGENVALUES IN QUANTUM FIELD THEORY

Asao Arai
 Department of Mathematics
 Hokkaido University

Let H be an infinite dimensional complex separable Hilbert space and $F_s(H)$ be the Fock space over H . Let h be a non-negative self-adjoint operator acting in H and $d\Gamma(h)$ be the second quantization of h acting in $F_s(H)$. In the Hilbert space

$$F = L^2(\mathbb{R}) \otimes F_s(H),$$

we consider a class of Hamiltonians of the following form :

$$H = I \otimes d\Gamma(h) + \omega_0 a^* a \otimes I + H_I$$

where $\omega_0 > 0$ is a constant parameter, a is the annihilation operator on $L^2(\mathbb{R})$ and H_I is a symmetric operator consisting of quadratic operators with respect to Boson annihilation and creation operators, a and a^* . We regard as $H_0 = I \otimes d\Gamma(h) + \omega_0 a^* a \otimes I$ as the unperturbed part and H_I as the perturbation. The operator H_0 is non-negative and self-adjoint. If h has a non-empty continuous spectrum, then H_0 has embedded eigenvalues coming from the eigenvalues of $\omega_0 a^* a$. Under some general conditions, it is proved that all such embedded eigenvalues of H_0 disappear under the perturbation H_I . We remark that the class of the Hamiltonians unifies some existing quantum field models.

談話会記録(1988年1月13日)

楕円型偏微分方程式と対称化 — Talentiの仕事について

島倉紀夫(京大)

G. Talentiの論文, 特に下記の1, の簡単な紹介.

\mathbb{R}^n の領域 Ω におけるDirichlet問題

$$(1) \quad -\sum_{j,k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left\{ a_{jk}(\alpha) \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\} + c(\alpha)u = f(\alpha) \text{ in } \Omega; \quad u=0 \text{ on } \partial\Omega;$$

を考える. Ω は有界でなくてもよいが $n=2$ のときは体積が有限とする. 係数 $a_{jk}(\alpha)$, $c(\alpha)$ は実数値可測函数で

$$\sum_{j,k=1}^n a_{jk}(\alpha) \xi_j \xi_k \geq \sum_{j=1}^n \xi_j^2, \quad c(\alpha) \geq 0,$$

をみたすとする. $f(\alpha) \in L^p(\Omega)$ ($n=2$ なら $p>1$, $n \geq 3$ なら $p = \frac{2n}{n+2}$) とする. そして u は(1)の弱解とする.

他方, Ω と同じ体積をもつ(原点を中心とする) n 次元球(または \mathbb{R}^n 全体)を Ω^* として, Ω 上の実数値可測函数 u から Ω^* 上の可測函数 u^* を次のように定める:

$[0, +\infty) \ni t$ に対して $\mu(t) = \{x \in \Omega; |u(x)| > t\}$ のルベグ測度,

$[0, +\infty) \ni \rho$ に対して $u^*(\rho) = \sup\{t \geq 0; \mu(t) > \rho\}$,

$x \in \Omega^*$ に対して $u^*(x) = u^*(C_n |x|^n)$, ただし $C_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1 + \frac{n}{2})}$.

u^* のことを u の spherically symmetric rearrangement と呼ぶ.

(1)の解を u として u^* を定義し, 他方

$$(2) \quad -\Delta v(x) = f^*(x) \text{ in } \Omega^*; \quad v=0 \text{ on } \partial\Omega^*$$

の解を v とする (v は $|x|$ のみの函数である).

定理 (G. Talenti 1) (i) Ω^* で至る所 $u^* \leq v$;

$$(ii) \quad 0 < q \leq 2 \text{ ならば } \int_{\Omega} \left(\sum_{j,k=1}^n a_{jk} \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial u}{\partial x_k} \right)^{q/2} dx \leq \int_{\Omega^*} \left\{ \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial v}{\partial x_j} \right)^2 \right\}^{q/2} dx.$$

この定理の (i), (ii) のどちらの不等式も, $\Omega = \Omega^*$, $f = f^*$, $a_{j,k} = \delta_{j,k}$ かつ $C = 0$ ならば等式となる. 従って両不等式とも最良である. また (2) の解 v は f^* を用いて具体的に表示できる ((2) は求積法によって解くことのできる常微分方程式に帰着される). とくに (i) により, 各 t について集合 $\{x \in \Omega; |u(x)| > t\}$ の測度を f^* を用いて評価することができる.

(i) の応用として, Ω が有界領域のとき Ω 上 0 である函数 u に対して

$$\max |u| \leq K_{n,p} |\Omega|^{\frac{n}{2} - \frac{1}{p}} \left(\int_{\Omega} |\Delta u|^p dx \right)^{1/p} \quad \text{ただし } n/2 < p \leq +\infty.$$

が成り立つことがわかる, ここで $(1/p) + (1/q) = 1$ とすると

$$n \geq 3 \text{ のとき } K_{n,p} = \frac{1}{(n-2)n C_n^{2/n}} \left\{ \frac{\Gamma(q+1) \Gamma(\frac{n}{2} - q)}{\Gamma(\frac{n}{2})} \right\}^{1/q},$$

$$n=2 \text{ のとき } K_{2,p} = \Gamma(q+1)^{1/q} / (4\pi).$$

$K_{n,p}$ の値は最良である. 上記の定理と論文 2 の結果を組合せると, さらにいくつかのそれぞれ最良の不等式が得られる.

なお論文 4 では (1) が 1 階の項を含む場合への拡張, 論文 3 では発散型の非線形方程式への拡張, をそれぞれ論じている. 論文 1 が最も基本的である.

文献 (いずれも G. Talenti)

- 1 Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (4) 3 (1976), 697-718.
- 2 Ann. Mat. pura appl. (4) 110 (1976), 353-372.
- 3 Ann. Mat. pura appl. (4) 120 (1979), 159-184.
- 4 Boll. Unione Mat. Italiana (6) 4 (1985), 917-949.

各元が特殊な2元の和であらうな環

岡山大理 富永 久雄

以下、 R は環とし、その中心を C とする。 E, N でそれぞれ R のべき等元集合とべき零元集合をあらわすことにする。
 $E_n = \{x \in R \mid x^n = x\}$, $P = \bigcup_{n=2}^{\infty} E_n$ とし、 R の各元 x に対して $x^m \in P$ となる自然数 m が存在するとき、 R は同期環であるという。

$A, B \subseteq R$ の部分集合としたとき、次の条件を考える：

$$(A+B) \quad \forall x \in R, \exists a \in A, b \in B \mid x = a+b$$

$$[A+B] \quad \forall x \in R, \exists a \in A, b \in B \mid x = a+b, [a, b] = 0$$

$$(A+B)_1 \quad \forall x \in R, \exists_1 a \in A, b \in B \mid x = a+b$$

$$[A+B]_1 \quad \forall x \in R, \exists_1 a \in A, b \in B \mid x = a+b, [a, b] = 0$$

$$A \perp B \quad \forall a \in A, \forall b \in B, ab = ba = 0$$

$$[A \perp B] \quad \forall a \in A, \forall b \in B, [a, b] = 0 \Rightarrow ab = 0.$$

A, B が P, E, N である場合には次の諸結果がなりたつ：

Th. 1. 次は同値：

1) $R = E_3$

2) $[E+E]$

Th. 2. 次は同値：

1) R は同期環

2) $[P+N]$

Th. 3. 次は同値：

1) $(P+N)_1$

2) $[P+N], E \perp N^*, \text{ 即ち } N^* = \{x \in R \mid x^2 = 0\}.$

3) $R = P \oplus N$

Th. 4. 次は同値：

1) $[P+N]_1$

2) $[P+N], [E \perp N^*]$

Th. 5. 次は同値：

1) $[E+N]_1$

2) $[E+N]$

3) $\forall x \in R, x - x^2 \in N$

4) $N \triangleleft R, R/N$ は 7-元環

Th. 6 次は同値:

- 1) $(E+N)_1, E \perp N^*$
- 2) $(E+N), E \perp N^*$
- 3) $\forall x \in R, x-x^2 \in N; E \perp N^*$
- 4) $N \triangleleft R, R/N$ は Γ - n 環, $E \perp N^*$
- 5) $R = E \oplus N$

$n > 1$ とし, 次の条件を考える:

$$(\#)_n \quad \forall x \in R, x^n - x \in N.$$

Th. 5 によれば, R が $(\#)_2$ をみたせば $N \triangleleft R$ である.

このことに関連して, 次の Th. がなり立つ.

Th. 7. 次は同値:

- 1) R が $(\#)_n$ をみたせば, $N \triangleleft R$.
- 2) $n \not\equiv 1 \pmod{3}, n \not\equiv 1 \pmod{8}$
- 3) \forall 素数 $p, n \not\equiv 1 \pmod{p^2-1}$
- 4) \forall 素数 $p, M_2(GF(p))$ は $(\#)_n$ をみたさない.

Dirichlet の定理によれば

$$|\{\text{prime } n \mid n \equiv 5 \pmod{24}\}| = \infty$$

$$|\{\text{prime } n \mid n \equiv 1 \pmod{24}\}| = \infty$$

これより, Th. 7 の条件をみたす素数 n は無数に存在し, したがって素数 n もまた無数に存在することがわかる.

24 の不思議.

24 という数が数学のいろいろなところに登場する。しかも、普通ではあり得ないような、異常に良い性質を持ったもの (Golay 符号, Leech 格子, 保型関数等) と関係して現れるように見える。これは果して偶然や気のせいだけなのだろうか。それとも、何か全体を統制する極値問題の類でもあるのだろうか。主な文献のリストだけを掲げておく。

参考文献.

- [1] Apostol, T.M.: "Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory", Springer, 1976.
- [2] 数学のあゆみ, vol. 20, 1980. (特に, 「Monster と Modular 関数」(吉荒), 「Mackay's observation について」(清水)).
- [3] Chandrasekharan, K.: "Elliptic Functions", Springer, 1985.
- [4] Chapline, G: Unification of gravity and elementary particle interactions in 26 dimensions?, Physics Letters B, 158B(1985), 393-396.
- [5] Conway, J.H.: Three lectures on exceptional groups. Chapter VII of: Powell and Higman, "Finite Simple Groups", Academic Press, 1971.
- [6] Conway, J.H. and Norton, S.P.: Monstrous moonshine, Bull. London Math. Soc., 11 (1979), 308-339.
- [7] Conway, J.H. and Sloane, N.J.A.: "Sphere Packings, Lattices and Groups", Springer, 1987.
- [8] 土井・三宅: 「保型関数論」, 紀ノ国屋,
- [9] Frenkel, I., Lepowsky, J. and Meurman, A.: A natural representation of the Fischer-Griess Monster with the modular function J as character, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 81 (1984), 3256-3260.
- [10] Frenkel, I., Lepowsky, J. and Meurman, A.: An introduction to the Monster, in "Unified String Theories", M.G.Green and D.Gross, edited, World Scientific, Singapore 1986, pp. 533-546.
- [11] Gorenstein, D.: "Finite Simple Groups", Plenum Press, 1981.

- [12] Green, M. B., Schwartz, J. H. and Witten, E.: "Superstring Theory I, II", Cambridge Univ. Press, 1987.
- [13] Griess, R. L.: The friendly giant, *Inv. Math.*, 69 (1982), 1-102.
- [14] Kac, V. G.: Infinite dimensional algebras, Dedekind's η -function, classical Moebius function, and the very strange formula, *Adv. Math.*, 30 (1978), 85-136.
- [15] Kac, V. G.: "Infinite Dimensional Lie Algebras", Cambridge University Press, 1985 (second edited).
- [16] Lepowsky, J., Mandelstam, S. and Singer, I. M. (ed.): "Vertex Operators in Mathematics and Physics", Springer, 1983.
- [17] MacWilliams, F. J. and Sloane, N. J. A.: "The Theory of Error-Correcting Codes", North-Holland, 1977.
- [18] McKay, B. D. (editor): "Finite Groups - Coming of age", *Contemp. Math.* 45 (1985)
- [19] Serre, J. P.: "A course of arithmetic", Springer, 1973. (翻訳あり.)
- [20] Sloane, N. J. A.: Self-dual codes and lattices, in "Relations between Combinatorics and Other Parts of Mathematics", *Proc. Symp. Pure Math.*, vol. 34, Amer. Math. Soc. 1979, pp. 273-308.
- [21] 数理科学 (超弦理論特集号), 1986, vol. 11, サイエンス社.
- [22] Thierry-Mieg, J.: Anomaly cancellation and fermionisation in 10-, 18-, and 26-dimensional superstrings, *Phys. Lett. B*, 171 (1986), 163-169.
- [23] Thompson, T. M.: "From Error-Correcting Codes through Sphere Packings to Simple Groups", *The Carus Math. Monographs*, no. 21, The Mathematical Association of America, 1983.
- [24] Yoshida, T.: On character-theoretic transfer(II), *J. Algebra*, in press.

Rigidity of complex submanifolds and Maximal surfaces

Kinetsu Abe

Abstract.

In 1953, Calabi proved a rigidity theorem for Kählerian submanifolds in complex space forms. The Calabi rigidity theorem, since then, has been successfully applied to various areas in geometry. Among them is the study of minimal surfaces in real space forms.

The current resurgence of interest in indefinite metric geometry, partly stimulated by the recent developments in theoretical physics, has generated many spontaneous problems in that setting.

The purpose of this talk is two fold. Firstly, we wish to look into the general theory of indefinite (real or complex) metric geometry. In this context, we show an analogue of the Calabi rigidity theorem for general signature. Secondly, we present an application of our result to describe the moduli space of the maximal surfaces. This corresponds to the description of the minimal surfaces in \mathbb{R}^n due to Calabi et al.

Our main results state:

Theorem 1. Let M_s^n be a connected indefinite Kählerian manifold of signature s ($0 \leq s \leq k$). Let $f: M_s^n \rightarrow \mathbb{C}_k^N$ be a holomorphic and isometric immersion of M_s^n into \mathbb{C}_k^N . Then, up to the holomorphic isometries of \mathbb{C}_k^N , f is decomposed into the following three parts: There is a unique triple (α, β, γ) of integers ($\alpha \geq 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0$) such that α and β depend only on the manifold M_s^n and independent of f . There is also a unique canonical decomposition $\mathbb{C}_k^N = \mathbb{C}_\gamma^{2\alpha} \oplus \mathbb{C}_\beta^{\alpha+\beta} \oplus \mathbb{C}_{k-(\alpha+\gamma)}^{N-(\alpha+\beta+\gamma)}$ of \mathbb{C}_k^N depending on f . With respect to the decomposition, f factors into $f_1 \oplus f_2 \oplus f_3$. f_1 maps M_s^n into $\mathbb{C}_\gamma^{2\alpha}$ in such a way that the image of M_s^n under f_1 is contained in $\text{Span}(L_1, \dots, L_\gamma)$, f_2 maps M_s^n into $\mathbb{C}_\beta^{\alpha+\beta}$ fully and uniquely up to the holomorphic isometries of \mathbb{C}_k^N and f_3 maps M_s^n into the origin of $\mathbb{C}_{k-(\alpha+\gamma)}^{N-(\alpha+\beta+\gamma)}$.

Theorem 2. Let $\lambda: M \rightarrow \mathbb{C}_R^m$ be holomorphic and $\beta: M^2 \rightarrow \mathbb{R}_j^n$ be space-like and have $\eta = 0$ with $\|\lambda\|^2 = \|\sqrt{2}\beta/dw\|^2$. In addition assume both are full or non-degenerately full and for some $P_0 \in M^2$, $\lambda(P_0) = \beta(P_0) = 0$. Then, there is a transformation $A \in U(\mathbb{R}, m-k)$ so that

$$\beta = \sqrt{2} \operatorname{Re} S \begin{bmatrix} \vec{h} \\ \operatorname{neg}(\pi \circ A \circ \lambda') \\ \operatorname{Pos}(\pi \circ A \circ \lambda') \end{bmatrix},$$

where S is an $n \times n'$ -complex matrix (where $n' = m - 2l + 2l'$) satisfying

- (i) ${}^t \bar{S} I_{j, n-j} S = I_{j', n'-j'}$;
- (ii) ${}^t \lambda' S I_{j, n-j} S \lambda' = 0$
- (iii) $n' \leq n \leq 3 \cdot n'$.

Topologically principal part of analytic functions

Etsuo YOSHINAGA

The purpose of this talk is to search a topologically principal part of the Taylor expansion of a given analytic function $f(x)$ at the origin of Euclidean space. Here, the topologically principal part should satisfy the properties that it is a part of the Taylor expansion of $f(x)$ as small as possible and the local topological type of $f(x)$ at the origin is determined by it.

Let $K := \mathbb{R}$ or \mathbb{C} and $A(K^n)$ be the set of all germs of analytic functions $f: (K^n, 0) \rightarrow (K, 0)$ at the origin of K^n .

Let $\Gamma_+(f)$ be the Newton polygon of $f \in A(K^n)$, the convex hull of the set

$$\cup \{k + R_+^n \mid a_k \neq 0\}$$

in \mathbb{R}^n where R_+ is the set of all non-negative real numbers, for the Taylor expansion

$$f(x) = \sum_k a_k x^k = \sum_k a_{k_1, k_2, \dots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}.$$

Let S be a subset of Z_+^n (or R_+^n) where Z_+ is the set of all non-negative integers and define $f_S := f|_S := \sum_{k \in S \cap Z_+^n} a_k x^k$.

(1.2) Definition. An $f \in A(K^n)$ (or the Newton principal part of f) is non-degenerate if $\{x \in K^n \mid \frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_2} = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0\} \subset \{x_1 x_2 \dots x_n = 0\}$ for any compact face γ of $\Gamma_+(f)$.

(1.4) Definitions.

$$(1.4.1) \quad |\text{Grad } f|^2 := \left| \left(x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}, x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \right|^2$$

$$= \sum_{i=1}^n |x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}|^2.$$

For a given $k \in \mathbb{Z}_+^n$, define

(1.4.2)_k Condition : There exists a positive $\varepsilon = \varepsilon(k)$ such that

$$|\text{Grad } f| \geq \varepsilon |x|^k$$

in a neighbourhood of the origin of K^n .

(1.4.3) Let $\Lambda_+(f)$ be the convex hull of the set

$$U\{k + \mathbb{R}_+^n \mid \text{Condition (1.4.2)}_k \text{ holds}\}$$

in \mathbb{R}^n . We call $\Lambda_+(f)$ a gradient polygon of f .

Let m be the order of the function $|\text{Grad } f|$ on $V := V(f) := \{x \in K^n \mid |\text{Grad } f| = 0\}$. Namely

$$(1.4.4) \quad m := m(f)$$

$$:= \frac{1}{2} \text{Min}\{\text{the order of } |\text{Grad } f|^2 \text{ at } x_0 \mid x_0 \in V(f)\}.$$

For a given $k \in \mathbb{Z}_+^n$, define

(1.4.5)_k Condition : There exists a positive $\varepsilon = \varepsilon(k)$ such that

$$|\text{Grad } f|^{1+1/m} \geq \varepsilon |x|^k$$

in a neighbourhood of the origin of K^n .

(1.4.6) Let $\tilde{\Lambda}_+(f)$ be the convex hull of the set

$$U\{k + \mathbb{R}_+^n \mid \text{Condition (1.4.5)}_k \text{ holds}\}$$

in \mathbb{R}^n . We call $\tilde{\Lambda}_+(f)$ a quasi gradient polygon of f .

Then we can show that $\Gamma_+(f) \supset \Lambda_+(f) \supset \tilde{\Lambda}_+(f)$.

(1.5) Theorem. Suppose that one of the following two conditions holds for an analytic function $g(x)$:

$$(1.5.1) \quad \Gamma_+(g) \subset \tilde{\Lambda}_+(f).$$

$$(1.5.2) \quad \Gamma_+(g) \subset \text{Int} \Lambda_+(f) \text{ and } V(f) = \{0\}.$$

Then the family $f + ug$ is topologically trivial, identically on

$V(f)$, along $I := \{u \in \mathbb{R} \mid 0 \leq u \leq 1\}$. Namely there exists a local homeomorphism $H: (K^n \times \mathbb{R}, 0 \times I) \longrightarrow (K^n \times \mathbb{R}, 0 \times I)$ such that the following commutative diagram (1.5.3) holds :

(1.5.3) Commutative diagram.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (V \times \mathbb{R}, 0 \times I) & & \\
 & i \swarrow & & \searrow i & \\
 (K^n \times \mathbb{R}, 0 \times I) & \xrightarrow{H} & (K^n \times \mathbb{R}, 0 \times I) & & \\
 \downarrow p_1 & \searrow p_2 & & \swarrow p_2 & \downarrow f+ug \\
 & & (R, I) & & \\
 & & & & \\
 (K^n, 0) & \xrightarrow{f} & (K, 0) & &
 \end{array}$$

where p_1, p_2 are the canonical projections and i is the inclusion map.

(1.6) Theorem. Suppose $\Gamma_+(g) \subset \Lambda_+(f)$ for an analytic function g and $V(f) = \{0\}$. Then $f(x) + ug(x)$ is topologically trivial along $I(\delta) = \{u \in \mathbb{R} \mid 0 \leq u \leq \delta\}$ for a sufficiently small positive δ . Namely, there exists a local homeomorphism $H: (K^n \times \mathbb{R}, 0 \times 0) \longrightarrow (K^n \times \mathbb{R}, 0 \times 0)$ such that the commutative diagram (1.5.3) replacing I by 0 holds.

(1.7) Theorem. An f is non-degenerate if and only if $\Gamma_+(f) = \Lambda_+(f)$.

アブストラクト CR-structure の局所埋め込み問題について

初めて CR-structure という言葉を、聞かれる方もおられると思いますがアブストラクト CR-structure を定義します。 M を $2n-1$ 次元の実微分可能多様体, E を $\mathbb{C} \otimes TM$ の subbundle で次の 1) と 2) を満たすものとする。

$$1) E \cap \bar{E} = 0, \quad f\text{-dim} \left(\frac{\mathbb{C} \otimes TM}{(E + \bar{E})} \right) = 1,$$

$$2) [\Gamma(M, E), \Gamma(M, \bar{E})] \subset \Gamma(M, E)$$

この pair (M, E) をアブストラクト CR-structure と呼ぶ。


これは、複素多様体上の real hypersurface の

一般化で、すなわち $X^{(n)}$ を n -次元複素多様体,

そして M' をその real hypersurface, $M' = \{ p \cdot$

$h(p) = 0 \}$, ここで h は $X^{(n)}$ 上の実 \mathbb{C}^n -function で

$$dh(p_0) \neq 0$$



p_0 の近傍で考えて

$$E' : \stackrel{\text{def}}{=} T^{0,1}X|_{M'} \cap \mathbb{C} \otimes TM'$$

とすると pair (M', E') は、上の (1) と (2) を満たす。

取り扱う問題は、アブストラクトな CR-structure

(M, E) は、“局所的に” 複素多様体上の real-

hypersurface より 導かれるか？ という問題で

この問題について得られた結果を解説します。

(real analytic では trivial, C^∞ では非常に難しい問題)

ここで “局所的” とは、アブストラクト CR-structure (M, E)

が与えられたとき、 p_0 を M の reference point として

ある p_0 の近傍 $U(p_0)$ が存在して

$$f : (U(p_0), E|_{U(p_0)}) \rightarrow \mathbb{C}^n$$

が CR-embedding, i.e.,

f は、 C^∞ -embedding of $U(p_0)$ として

$$x f_j = 0 \quad \forall X \in E, \quad \begin{matrix} \hookrightarrow \\ \mathbb{C} \otimes TM \end{matrix} \quad j=1, 2, \dots, n,$$

$$f = (f_1, \dots, f_n).$$

それ故問題は、「アブストラクトな CR-structure

(M, E) が、与えられれば、アブストラクトな意味での

$\bar{\partial}$ -operator が定義されるか、この $\bar{\partial}$ -equation

$\bar{\partial}u = 0$ が十分多くの解を持ちか？」と、

替られる。丁度 Newlander - Nirenberg theorem の
が成立するかどうか？という問題になる

real hypersurface 版 ~~になる~~。この問題を、

strongly pseudo convex の仮定の下で調べよう。

(アブストラクト CR-structure の時も strongly pseudo

convex という概念が定義されるか。今日は省略

します。)

$(M^{(2m-1)}, E^{(m-1)})$ を、アブストラクト strongly pseudo

convex CR-structure とし p_0 をその reference point

とする。

1) $n=2$ \angle , Nirenberg の反例がある。

Nirenberg の反例を、少し解説します。Nirenberg の反例は、H. Lewy の有名な counter example を基に構成したもので、H. Lewy の counter example

とは、 $\mathbb{R}^3 = \mathbb{C} \times \mathbb{R} (z, t)$

$$L = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + \sqrt{-1} z \frac{\partial}{\partial t}$$

$$* \quad Lu(z, \bar{z}, t) = f(t)$$

ここで $f(t)$ は、 t へのみ depend する実数値 C^∞ -function で $u(z, \bar{z}, t)$ は、未知関数。H. Lewy

は、も上の * が、原点のある近傍で C^1 -級の

解を、もつならば $f(t)$ は、自動的に ^(C^∞ で) 実解析的

になる。それ故もし $f(t)$ として C^∞ だが、実解析的

でない関数を、与えれば C^1 -級の解は、存在

しない。* は、inhomogeneous だが Nirenberg は、

上の operator を modify して 1-st order diff. op. \hat{L} で

$$\hat{L} u(z, \bar{z}, t) = 0, \quad u(z, \bar{z}, t) \text{ of } \mathbb{C}^1$$

$$\Rightarrow u(z, \bar{z}, t) = \text{定数}$$

となるものを構成してやる。 $E := \mathbb{C}\tilde{L} \hookrightarrow \mathbb{R}^3$
 (\mathbb{R}^3, E)

を考えるとこれは \mathbb{C}^2 に local CR-embedding は、
 できない。

2) $n \geq 5$ (倉西) OK, local embedding theorem
 が成立する! (1980)

3) $n = 4$, 同様に OK (赤坂) (1984)

なぜ $n = 4$ が証明できたか説明します。その

ために倉西の ($n \geq 5$) の時の証明を思い出します。

倉西の証明は、次の2つのstepに分かれる。

(M, θ^T) を、アブストラクト CR-structure として

p_0 を、 M の reference point とする。

step 1. $f : (M, \theta^T) \hookrightarrow \mathbb{C}^m$

f は、 C^∞ -embedding, として θ^T は、induced

CR-structure by f , するとある特別な

p_0 の近傍系 $U_\varepsilon(f)$ が存在して且

$\dim_{\mathbb{R}} M = 2n-1 \geq 7$, i.e., $n \geq 4$ の時,

$\Gamma(U_\varepsilon(f), (\theta^T)^*)$ 上で Neumann operator N_b^f

が存在して Kodaira - Hodge decomposition

type theorem for $\bar{\partial}_b^f$

$$u = \bar{\partial}_b^f * \bar{\partial}_b^f N_b^f u + \bar{\partial}_b^f \bar{\partial}_b^f * N_b^f u$$

$$\forall u \in \Gamma(U_\varepsilon(f), (\theta^T)^*)$$

が成立, 逆に $\bar{\partial}_b^f$ とは、CR-structure

(M, θ^T) を induce する operator, として

$\bar{\partial}_b^{f*}$ は, $\bar{\partial}_b^f$ の L^2 -adjoint operator.

$\in L$ $\dim_{\mathbb{R}} M = 2n-1 \geq 9$, i.e., $n \geq 5$ の時

$\Gamma(U_\varepsilon(f), \Lambda^2(fT^*))$ 上 $\bar{\partial}_b^f$ Neumann operator

\mathcal{N}_b^f が存在して Kodaira-Hodge decomposition

type theorem

$$z = \bar{\partial}_b^{f*} \bar{\partial}_b^f \mathcal{N}_b^f z + \bar{\partial}_b^f \bar{\partial}_b^{f*} \mathcal{N}_b^f z$$

$$\forall z \in \Gamma(U_\varepsilon(f), \Lambda^2(fT^*))$$

が成り立つ。

Step 2. 上の Neumann ~~type~~ operator \mathcal{N}_b^f

を用いて Nash-iteration を行う。

$$f^{(0)} : (M, T^1) \xrightarrow{C^\infty} \mathbb{C}^n$$

(適当により近似) , $j^{(k)}(\bar{\partial}_b^f f^{(0)})(p_0) = 0$

$f^{(0)}$ よりよい近似 $f^{(1)}$ を

$$f^{(1)} = f^{(0)} - M_0 \left(\bar{\partial}_b^{f^{(0)*}} \mathcal{N}_b^{f^{(0)}} (\bar{\partial}_b^f f^{(0)}) \right)$$

on $\perp_\varepsilon(f^{(0)})$

$\bar{\partial}_b$ は, (M, T^*) 上 induce された operator, M_0 は, smoothing function,

induction 上

$$f^{(M+1)} = f^{(M)} - M_M \left(\bar{\partial}_b^{(M)*} \mathcal{N}_b^{(M)} (\bar{\partial}_b f^{(M)}) \right)$$

on $\sqcup_{\varepsilon_M} (f^{(M)})$

M_M : smoothing function

$\mathcal{N}_b^{(M)}$ とは, $\mathcal{N}_b f^{(M)}$ 上 上 構成された op.

(この段階まででは, $\dim_{\mathbb{R}} M \geq 7$, i.e., $n \geq 4$ で十分).

Convergent かの問題, 上の $f^{(M)}$, $\sqcup_{\varepsilon_M} (f^{(M)})$ かん

convergent に その 極限 かん

$$\bar{\partial}_b f = 0$$

を, 満たせば OK,

どう かん, こ 証明 する かん という かん

$$P_\mu := \|\bar{\partial}_b f^{(\mu)}\|_{U_{\varepsilon_\mu}(f^{(\mu)})} + \|f^{(\mu)} - f^{(\mu-1)}\|_{U_{\varepsilon_\mu}(f^{(\mu)})}$$

として μ 任意の μ に対して

$$* \quad P_{\mu+1} \leq O P_\mu^2 + \Delta,$$

(ここで O は、少々大きくてもよく Δ は、かなり小さい)

が言明できるは、Moser's lemma より

$$P_\mu \rightarrow 0 \quad (\text{as } \mu \rightarrow +\infty)$$

を述べ convergence が示される。実際には $\mathcal{F}_{\mathbb{Z}^k}$

$$\begin{aligned} \text{すなわち, } \bar{\partial}_b f^{(\mu+1)} &= \bar{\partial}_b f^{(\mu)} - \bar{\partial}_b \left\{ M_\mu(\bar{\partial}_b^{(\mu)*} \mathcal{N}_b^{(\mu)}(\bar{\partial}_b f^{(\mu)})) \right\} \\ &\doteq \bar{\partial}_b f^{(\mu)} - \bar{\partial}_b \bar{\partial}_b^{(\mu)*} \mathcal{N}_b^{(\mu)}(\bar{\partial}_b f^{(\mu)}) \\ &\doteq \bar{\partial}_b f^{(\mu)} - \bar{\partial}_b^{(\mu)*} \bar{\partial}_b^{(\mu)} \mathcal{N}_b^{(\mu)}(\bar{\partial}_b f^{(\mu)}) \\ &\quad + \underbrace{(\bar{\partial}_b^{(\mu)} - \bar{\partial}_b)}_{\text{wavy}} \bar{\partial}_b^{(\mu)*} \mathcal{N}_b^{(\mu)}(\bar{\partial}_b f^{(\mu)}) \\ &\doteq \bar{\partial}_b^{(\mu)*} \bar{\partial}_b^{(\mu)} \mathcal{N}_b^{(\mu)}(\bar{\partial}_b f^{(\mu)}) \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

(1-form に対する Kodaira-Hodge decomposition th.)

$$\doteq \bar{\partial}_b^{(m)*} N_b^{(m)} \bar{\partial}_b^{(m)} \bar{\partial}_b f^{(m)}$$

(2-form に対しても Neumann op. の存在が必要)

(倉田が $m \geq 5$ を使ったのは、この部分)

$$\doteq \bar{\partial}_b^{(m)*} N_b^{(m)} (\bar{\partial}_b^{(m)} - \bar{\partial}_b) \bar{\partial}_b f^{(m)}$$


ここでなぜ

$$\begin{aligned} & \bar{\partial}_b^{(m)*} \bar{\partial}_b^{(m)} N_b^{(m)} \bar{\partial}_b f^{(m)} \\ &= N_b^{(m)} \bar{\partial}_b^{(m)*} \bar{\partial}_b^{(m)} \bar{\partial}_b f^{(m)} \end{aligned} \quad \text{on } U_{\varepsilon_\mu}(f^{(m)})$$

としたかったのか? もしこのことか"成り立つのは" 1-form に対する Kodaira-Hodge decomposition th. まで十分.

しかし右辺は、意味がない。 $\bar{\partial}_b^{(m)*}$ とは、 $\bar{\partial}_b^{(m)}$ の $(U_{\varepsilon_\mu}(f^{(m)}) \text{ は boundary 上})$ での Hilbert adjoint op. だが故 $\bar{\partial}_b^{(m)*}$ の定義域に $\bar{\partial}_b^{(m)} \bar{\partial}_b f^{(m)}$ がはいるためには、 $U_{\varepsilon_\mu}(f^{(m)})$ の boundary 上で $\bar{\partial}_b^{(m)*} \bar{\partial}_b f^{(m)}$ の normal -

component が消える必要がある。しかし各 step で $U_{\varepsilon_n}(f^{(n)})$ は異なる。 C^∞ かどうかは、チェックできるが boundary 上で normal component が消えるかどうか チェックするのは、困難。



しかし問題を、全て boundary 方向に reduction する。
 (a)_b - 問題に帰着させ Kuramishi の Nash-iteration のルールにのせる。そうすると boundary condition が、おなじ、から自由に上のことが出来る。

半線型熱方程式の解の爆発

最近の進展

北大 理 儀我美一

半線型熱方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(u)$$

を考える。ここで例えは $f(u)$ が $u > 0$ について単調増加かつ凸また $\int_1^\infty \frac{du}{f(u)} < \infty$ とすれば、初期値問題、初期値境界値問題とも、初期値によっては局所解は有限時間しか持続できず、ある時刻 T で、 $u(x, t)$ の最大値は無限大になってしまう。この現象を解の爆発とよぶ。また T を爆発時刻という。解の爆発がどこかおこるぬかとという問題は、今から20年近く前に活発に研究された。近年は、爆発時刻付近での解の様子とこのことに焦点があてられている。Weisslerにより最初に指摘されたように、爆発は空間方向について一様にはおこらない。空間の点で爆発時刻近くで解が局所有界に在るな点を爆発点とよぶ。今回は、爆発点における漸近挙動とその応用としての爆発点の分布状況についてふれた。

Incidence Matrices (Algebra) for 't-designs' on $H(d, q)$

0. Motivations.

- Wilson "Incidence Matrices of t-designs" Linear Alg. and its Appl. 46 (1982)
- Kreher "An Incidence Algebra for t-designs with Automorphisms" J.C.T.(A) #2 (1986)
- 荒川 "一般化した結合行列について" 修論
- 一通の仕事と他の Θ -polynomial scheme と考える.
 現在考えているのは Hamming scheme における Wilson の仕事に対応する部分
- Θ -polynomial scheme の combinatorial な定義又は性質
- 't-design' と考えられる poset と Θ -polynomial scheme との関係
- coding theory における 様々な bound と 自己同型群を持つ場合を考える

Θ -polynomial scheme と Delsarte's t-design.

$\mathcal{X} = (X, \{R_i\}_{0 \leq i \leq d})$: symmetric association scheme

$E_i \ (i=0, 1, \dots, d)$: primitive idempotents. A_i : adjacency matrix

DEF. \mathcal{X} : Θ -polynomial scheme w.r.t. the ordering E_0, E_1, \dots, E_d

$\Leftrightarrow \exists v_i^*(x) \in \mathbb{C}[x] \ \deg v_i^* = i \quad E_i = v_i^*(E_1) \quad (\text{multiplication by } 0)$

DEF. $Y \subset X$

$(a_0, a_1, \dots, a_d) = \text{inner distribution} \quad a_i = |Y \times Y \cap R_i| / |Y|$

$\Theta = (\theta_j(i)) \quad E_j = \sum \theta_j(i) A_i$

$(b_0, b_1, \dots, b_d) = -\frac{1}{|Y|} (a_0, \dots, a_d) \Theta$

Y : t-design [Delsarte] $\Leftrightarrow b_1 = b_2 = \dots = b_t = 0$

t-design [Delsarte] = $J(v, k) \Leftrightarrow$ t-design [Combinatorial]
 $H(d, q) \Leftrightarrow$ orthogonal array of strength t

$\exists \Theta$ -polynomial scheme τ は 自然な order τ $\{E_0\}$ にある

Known Θ -polynomial scheme には τ の poset による整理がある

$L = \bigcup_{i=0}^d X_i \quad \alpha \in X_i \ \beta \in X_j \quad \alpha \leq \beta \Rightarrow i \leq j$

$Y \subset X_d$ t-design $\Leftrightarrow \forall \alpha \in X_t \quad |\{y \in Y \mid \alpha \leq y\}| = \text{一定}$

1. $[t]$ -design. t -design.

DEF.1 $d, q \in \mathbb{N}$ $Q: q$ -elt set, $D: d$ -elt set

$$H(d, q) = (L = \bigcup_{j=0}^d X_j \text{ (disjoint)}, \leq) \quad \text{Hamming poset}$$

$$J \subset D \quad X_J = Q^J \quad (\text{i.e. } Q^J = \{ \alpha : J \rightarrow Q \})$$

$$X_i = \bigcup_{|J|=i} X_J \quad X = X_d \quad L_i = \bigcup_{j=0}^i X_j \quad L = L_d$$

$$\alpha_1 \in X_{J_1} \quad \alpha_2 \in X_{J_2}$$

$$\alpha_1 \leq \alpha_2 \iff J_1 \subseteq J_2 \quad \alpha_2|_{J_1} = \alpha_1$$

$$\alpha \in X_J \quad \text{we denote} \quad J = D(\alpha)$$

DEF.2 $t \leq k \leq d$

(1) $Y \subset X_k$: $[t]$ -design or $[t]$ - $((d, q), k; \lambda)$ design

$$\iff |\{y \in Y \mid \alpha \leq y\}| = \lambda : \text{const. for } \forall \alpha \in X_k \quad [\text{Nagao-Atsumi}]$$

(2) $Y \subset L$: $\{t\}$ -design or $\{t\}$ - $((d, q), \lambda_1, \dots, \lambda_t)$ design

$$\iff |\{y \in Y \mid \alpha \leq y\}| = \lambda_i : \text{const for } \forall \alpha \in X_i \quad i=1, \dots, t$$

註). $Y \subset X_k$: t -design or t - (d, k, λ) design

$$\iff Y \subset X_k : [t]$$
- $((d, 1), k; \lambda)$ design

$Y \subset X$: orthogonal array of strength t .

$$\iff Y \subset X : [t]$$
- $((d, k), d; \lambda)$ design

DEF.3 A, B, C finite sets

$$\text{Mat}(A, B) = \{ X : A \times B \rightarrow \mathbb{C} \} \ni X, \alpha \in A, \beta \in B \quad X[\alpha, \beta] : \text{val.}$$

$$X \in \text{Mat}(A, B) \quad Y \in \text{Mat}(B, C) \quad \text{Then} \quad X \cdot Y \in \text{Mat}(A, C)$$

$$(XY)[\alpha, \gamma] = \sum_{\beta \in B} X[\alpha, \beta] Y[\beta, \gamma] \quad \alpha \in A \quad \gamma \in C$$

DEF.4 In $H(d, q)$

$$(1) A \leq L \quad \mathbb{1}_A : A \rightarrow F \quad \mathbb{1}_A[\alpha] = 1 \quad \forall \alpha \in A, \quad \mathbb{1}_X = \mathbb{1}_i$$

- (1) $W_{ij} \in \text{Mat}(X_i, X_j)$ $W_{ij}[\alpha, \beta] = \begin{cases} 1 & \alpha \leq \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
- (2) $\hat{W}_{ij}^u \in \text{Mat}(X_i, X_j)$ $\hat{W}_{ij}^u[\alpha, \beta] = \begin{cases} 1 & \alpha \wedge \beta \in X_u \quad \exists x \in X \text{ s.t. } \alpha, \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
- $\alpha \in X_{J_1}, \beta \in X_{J_2} \rightarrow D(\alpha \wedge \beta) = \{s \in J_1 \cap J_2 \mid \alpha[s] = \beta[s]\}$
 $\alpha \wedge \beta \mid D(\alpha \wedge \beta) = \alpha \mid D(\alpha \wedge \beta)$
- (3) $Y \subset U$ $N_i[\omega, y] = \begin{cases} 1 & \alpha \leq y \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
 $N_i \in \text{Mat}(X_i, Y)$
- (4) $Y \subset X_k$ $C_Y[\alpha, y] = \begin{cases} 1 & \alpha = y \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
 $C_Y \in \text{Mat}(X_k, Y)$
- So: $N_i = W_{ik} C_Y$

LEMMA 1. $0 \leq i \leq j \leq t \leq k \leq d$

(1) $W_{ij} W_{jk} = \binom{k-i}{j-i} W_{ik}$

(2) $Y \subseteq X_k$ $[t] - ((d, q), k, \lambda)$ -design

$\Leftrightarrow N_t \mathbb{1}_Y = W_{tk} C_Y \mathbb{1}_Y = \lambda \mathbb{1}_t$

(3) $Y \subseteq X_k$ $[t] - ((d, q), k, \lambda)$ -design

$\Rightarrow [i] - ((d, q), k, \lambda_i)$ design

with $\lambda_i = \binom{d-i}{t-i} q^{t-i} \lambda / \binom{k-i}{t-i} = \binom{d-i}{k-i} q^{t-i} \lambda / \binom{d-t}{k-t}$

So in particular, it is a $[t] - ((d, q), \lambda_1, \dots, \lambda_t)$ -design

with $\lambda_i = |Y| \binom{d-i}{k-i} / \binom{d}{k} q^i$

PROOF. (1) $W_{ij} W_{jk}[\alpha, \beta] = |\{r \in X_j \mid \alpha \leq r \leq \beta\}| = \binom{k-i}{j-i}$

(2) Clear. $(N_t \mathbb{1}_Y)[\alpha] = |\{y \in Y \mid \alpha \leq y\}| = \lambda$

(3) $\lambda \cdot \binom{d-i}{t-i} q^{t-i} \mathbb{1}_i = \lambda W_{it} \mathbb{1}_t = W_{it} N_t \mathbb{1}_Y = W_{it} W_{tk} C_Y \mathbb{1}_Y$

$= \binom{k-i}{t-i} W_{ik} C_Y \mathbb{1}_Y = \binom{k-i}{t-i} N_i \mathbb{1}_Y$

2. Fisher-Ray-Chaudhuri-Wilson inequality

Basic idea $|Y| \geq \text{rank } N_t \geq ?$ (a constant indep. with Y)

• $Y \subset X_k$ $[t]$ - $((d, q), k, \lambda)$ -design

LEMMA 2 $\binom{k-j}{i-j} N_j = W_{ji} N_i$

So $U_j \subseteq U_i$ if $j \leq i \leq t$ where $U_i = \mathcal{R}(N_i)$ the row space of N_i
 $|Y| \geq \text{rank } N_t \geq \text{rank } N_i \geq \text{rank } N_j$

LEMMA 3
$$N_i N_j^T = \sum_{u=0}^{\min(i,j)} \lambda_{i+j-u} \hat{W}_{ij}^u = \frac{\lambda}{\binom{d-t}{k-t} q^{k-t}} W_{ik} W_{jk}^T$$

PROOF. $(N_i N_j^T)[\alpha, \beta] = |\{y \in Y \mid \alpha \leq y, \beta \leq y\}| = \begin{cases} \lambda_{i+j-u} & \text{if } \exists x \in X_k \begin{matrix} \alpha \leq x \\ \beta \leq x \end{matrix} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

LEMMA 4 Let $U_i = \mathcal{R}(W_{ik})$ $i \leq k$

$x_0 \in X_d$ $\tilde{X}_i = \{\tilde{\alpha} \in X_i \mid \tilde{\alpha} \wedge x_0 \in X_0\}$

Let $[\tilde{\alpha}]$ denote the row i in W_{ik} corresponding to $\alpha \in X_i$

Let $\tilde{U}_i = \langle [\tilde{\alpha}] \mid \tilde{\alpha} \in \tilde{X}_i \rangle$ Suppose $q \geq 2$

\Rightarrow (1) $\dim \tilde{U}_i = \binom{d}{i} (q-1)^i$

(2) $U_i = U_{i-1} \oplus \tilde{U}_i$

PROPOSITION 5. Let $Y \subset X_k$ be a $[2s]$ - $((d, q), k, \lambda)$ design with $\lambda \neq 0$ Suppose $q \geq 2$. Then

$$|Y| \geq \binom{d}{0} (q-1)^0 + \dots + \binom{d}{s} (q-1)^s$$

PROOF $|Y| \geq \text{rank}(N_{2s}) \geq \text{rank}(N_s) = \text{rank}(N_s^T N_s)$
 $= \text{rank}(N_s N_s^T)$

$$\begin{aligned}
|Y| \geq \text{rank}(N_S N_S^T) &= \text{rank} \left(\frac{\lambda}{\binom{d-t}{r-t} q^{k-t}} W_{Sk} W_{Sk}^T \right) = \text{rank}(W_{Sk} W_{Sk}^T) \\
&= \text{rank}(W_{Sk}^T W_{Sk}) = \text{rank}(W_{Sk}) = \dim(\mathcal{R}(W_{Sk})) \\
&= \sum_{i=0}^s \binom{d}{i} (q-1)^i
\end{aligned}$$

• YCL $\{t\} - ((d, q), \lambda_1, \dots, \lambda_t)$ design.

LEMMA 6 $\alpha \in X_i, \beta \in X_j, D(\alpha) \cap D(\beta) = \emptyset \quad i+j \leq t$
 (1) $\lambda_i^j = |\{y \in Y \mid \alpha \leq y, D(\beta) \cap D(y) = \emptyset\}|$ const.
 (2) $\lambda_i^j + q \lambda_{i+1}^{j-1} = \lambda_i^{j-1} \quad j \geq 1$

DEF 5 $\hat{N}_i^u \in \text{Mat}(X_i, Y) \quad N_i^u[\alpha, y] = \begin{cases} 1 & \alpha \wedge y \in X_u \exists x \in X_s \text{ s.t. } \alpha \leq x, y \leq x \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$

LEMMA 7 $i+j \leq t$

$$N_i \hat{N}_j^u T = \sum_{v=0}^{\min(i, j)} \binom{j-v}{u-v} \lambda_{i+u-v}^{j-u} \hat{W}_{ij}^v$$

PROPOSITION 8 Let YCL be a $\{2s\} - ((d, q), \lambda_1, \dots, \lambda_{2s})$ -design
 Suppose $\lambda_s^s \neq 0$ Then

$$|Y| \geq \text{rank } N_s = \binom{d}{s} q^s$$

PROOF Since $0 \leq \lambda_i^j = \lambda_i^{j-1} - q \lambda_{i+1}^{j-1} \leq \lambda_i^{j-1}, \lambda_s^i \neq 0 \quad 0 \leq i \leq s$

$$N_s \hat{N}_s^0 T = \lambda_s^s \hat{W}_{ss}^0$$

$$N_s \hat{N}_s^1 T = s \lambda_{s+1}^{s-1} \hat{W}_{ss}^0 + \lambda_s^{s-1} \hat{W}_{ss}^1$$

$$N_s \hat{N}_s^s T = \sum_{v=0}^{s-1} \binom{s-v}{u-v} \lambda_{2s-v}^0 \hat{W}_{ss}^v + \lambda_s^0 \hat{W}_{ss}^s$$

Hence $I = \hat{W}_{ss}^s \in \langle N_s \hat{N}_s^u T \mid 0 \leq u \leq s \rangle$

Thus $\exists M \in \text{Mat}(Y, X_s)$ s.t. $I = N_s M$

Hence $|Y| \geq \text{rank } N_s = \binom{d}{s} q^s$

COR. 9. (Nagao)

Let $Y \subseteq X_k$ be a $[2S]$ - $((d, q), k, \lambda)$ -design with $\lambda \neq 0$

If $k+t \leq d$ $|Y| \geq \binom{d}{s} q^s$

PROOF. $\alpha \in X_s$. Since $\lambda_s \neq 0$, $\exists y \in Y$ st $\alpha \leq y \in X_k$.

So $\exists \beta \in X_s$ s.t. $D(\beta) \cap D(y) = \emptyset$.

Hence $\lambda_s \neq 0$

3. Other Results.

PROPOSITION 10. The following are equivalent:

$$(1) N_i^T N_i N_j^T N_j \in \langle N_\ell^T N_\ell \mid \ell = 0, \dots, k \rangle$$

for all $[t]$ - $((d, q), k, \lambda)$ design $Y \subseteq X_k$ with $i+j \leq t \leq k$

(2) t, q, k satisfy one of the following

(i) $t=0$ or 1

(ii) $q=1$ i.e. $J(d, k)$, t -design

(iii) $k=d$ i.e. $H(d, q)$, orthogonal array

DEF 6 $x_0 \in X \subseteq L = H(d, q)$

$$\Delta_{q, x_0} = \Delta : H(d, q) \rightarrow H(d, q-1)$$

$$\alpha \in L = H(d, q) \quad \bar{L} = H(d, q-1)$$

$$\Delta \alpha = \bar{\alpha} \quad \bar{\alpha}[S] = \begin{cases} \alpha[S] & \alpha[S] \neq x_0[S] \\ \text{not defined} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{i.e., } D(\bar{\alpha}) = \{s \in D(\alpha) \mid \alpha[S] \neq x_0[S]\} \text{ and } \alpha|_{D(\bar{\alpha})} = \bar{\alpha}$$

PROPOSITION 11 (1) $\bar{Y} : \{t\}$ - $((d, q-1), \bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_t)$ -design

with $\bar{\lambda}_i = q^{-i} |Y| \Rightarrow \Delta^{-1}(\bar{Y}) \cap X$ orthogonal array of strength t

(2) $Y : \text{orthogonal array of strength } t$

$\Rightarrow \Delta(Y)$ is a $\{t\}$ - $((d, q-1), \bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_t)$ -design

with $\bar{\lambda}_i = q^{-i} |\Delta(Y)|$

談話会(1988/3/16)

運動量写像とゲルポイド

秋田大学・教育学部 三上健太郎

目的は Alan Weinstein (University of California, Berkeley) との共同の仕事 Moments and reduction for symplectic groupoids を運動量写像(momentum mapping)を key word としつつ、symplectic groupoids 研究の、三上の理解する発端および現状に触れながら概説することである。

準備として hamiltonian formalism を復習し、Souriau によって導入された運動量写像に関し、Noether の定理の成立、余随伴同変性(coadjoint equivariance)の同値命題、とくに Alan Weinstein の唱えた symplectic creed --- Everything is a lagrangian submanifold!、および簡約化定理(reduction theorem of coadjoint equivariant momentum mapping)について述べる。以上について、リー群の cotangent bundle は典型例であり、更に自明でない symplectic groupoid の例になっていることに言及する。

本論：

1) symplectic groupoids の定義から直接 base space は lagrangian submanifold であり、且つ Poisson manifold になることをまず紹介する。その事実は "symplectic creed に従って幾つかの Poisson structures (すべてと言えないのが誠に残念であるが) を symplectic geometry の範疇に取り込む仲介役を symplectic groupoids が果たす" ことを示すとの基本的な認識をここで強調したい。

2) symplectic groupoids への group action に関する運動量写像の存在、特に余随伴同変性について得られた結果を、これまで知られた結果との関連をも含めて概説する。

3) groupoid action と moment の定義を述べ、group action と運動量写像写像(momentum mapping)を groupoid action と moment に一般化した経緯、および moment に関する reduction theorem の成立を概説する。

最後に symplectic groupoids に関し、今現在、三上が興味を持っている問題、派生した問題 (base space の幾何学的構造の持ち上げ可能性、Poisson Lie group 上の double symplectic groupoid structure の構成の試み、等) について述べる。

Title of Talk

A remark on association schemes on finite groups.

Abstract

We define a certain group $HC(G)$ of any finite group G and use it to construct association schemes on G . More precisely, $HC(G)$ is the group of permutations of the set G which fix the identity element, preserve inverse, and permute the (complex-valued) irreducible characters of G .

Cheng Kai Nah