



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	Genomics and proteomics of sulfur-oxidizing bacteria predominant in freshwater lake environments [an abstract of dissertation and a summary of dissertation review]
Author(s)	渡邊, 友浩
Degree Grantor	北海道大学
Degree Name	博士(環境科学)
Dissertation Number	甲第11346号
Issue Date	2014-03-25
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/55442
Rights(URL)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/
Type	doctoral thesis
File Information	Tomohiro_Watanabe_review.pdf, 審査の要旨



学位論文審査の要旨

生物圏科学専攻：博士（環境科学）

氏名 渡 邊 友 浩

審査委員	主査	教授	福 井	学
	副査	教授	森 川	正 章
	副査	准教授	落 合	正 則
	副査	助教	小 島	久 弥

学位論文題名

Genomics and proteomics of sulfur-oxidizing bacteria predominant in freshwater lake environments

（淡水湖沼環境で優占する硫黄酸化細菌のゲノミクスおよびプロテオミクス）

系統的に極めて多様な化学合成硫黄酸化細菌（SOB）は、硫黄・窒素・炭素の循環をリンクする微生物として地球上に普遍的に生息する。このような特性に加え、その豊富な存在量から、海洋環境に生息するSOBは全球規模での元素循環に大きく貢献すると考えられている。このため、その生態を解明するために主要種の特定ならびにゲノム解析が行われてきた。蓄積してきたSOBのゲノム情報からは、系統ごとに異なる機能が解明されつつある一方で、多様な硫黄酸化経路の存在が見出されてきた。しかし、機能が類似する複数の経路や酵素の存在意義は十分に理解されておらず、重要な研究テーマの一つとなっている。一方で、陸域の元素循環に寄与する淡水湖沼のSOBは、海洋と比べて存在量が少ないことから研究が容易ではなく、現場に生息する系統すら未知である。このようなSOBのゲノムが解明されることによって、他の環境由来のSOBとの比較からSOB全体を俯瞰した進化過程の考察が可能になると期待される。本研究では、淡水湖沼に生息するSOBの系統を特定し、主要種の硫黄酸化経路の特徴をゲノムから見出すことを目的とした。また、プロテオーム解析によりその発現ならびに淡水湖沼のSOBに特有の性質を検討した。

淡水湖沼の主要なSOBを特定するために、部分循環湖の塩川ダム湖（山梨県）の嫌気水層の水試料、地理的位置の異なる5つの淡水湖沼（琵琶湖、オコタンペ湖、スカーレン大池、親子池、丸湾大池）の堆積物試料を対象として4つの硫黄酸化関連遺伝子のクローニング解析を行った。この結果、いずれの淡水湖沼においても海洋環境とは異なりベータプロテオバクテリア綱のSOBが優占することが示され、これらは不完全チオ硫酸酸化型のSOBであることが推定された。そして、嫌気水層と堆積物の主要種の1つを、それぞれ*Sulfritalea hydrogenivorans*と*Sulfuricella denitrificans*であると同定した。これらは塩川ダム湖の嫌気水層から単離されたSOBであり、単離源以外の淡水環境からもその存在が見出されている。以上より、これら2種を淡水湖沼のモデルSOBとして、それぞれの基準株であるsk43HとskB26の完全ゲノム配列を対象にゲノム解析を行った。

ゲノムの遺伝子構成から硫黄酸化経路を構築した結果、両株とも同じ硫黄酸化経路を有することが明らかとなった。これは、クローニングで解析した各硫黄酸化遺伝子の系統関係から推定された不完全チオ硫酸酸化型の経路であった。このことから、クローニング解析で種を特定できなかった他のベータプロテオバクテリアも同様の経路を有すると推察された。また、ゲノム解析によって亜硫酸を酸化する2つの経路の存在が明らかとなった。

次に、硫黄酸化関連遺伝子の発現を確認するためにskB26株を用いてプロテオーム解析

を行った。解析を行う際、skB26株が耐冷性であることに着目した。湖沼環境におけるSOBの基質の供給源は湖底で起こる硫酸還元が主であり、湖底付近はしばしば低温になる。したがって、低温への適応は湖沼環境においてSOBが基質にアクセスする上で重要な性質であると考えられる。skB26株を至適温度（22℃）と分離源の温度（5℃）で培養し、タンパク質量を比較することで低温への応答を硫黄酸化経路の発現と共に検討した。この結果、5℃においてリボソームタンパク質、RNAシャペロン、RNAヘリカーゼ、Sulfur relayタンパク質、そして脂肪酸生合成酵素の1つFabZの著しい増加が認められた。これらから推定される機能より、正確な翻訳の進行と膜流動性の維持が低温への主な応答であると結論した。一方で、硫黄酸化関連タンパク質はリボソームタンパク質に次いで2番目に存在量が多い機能群であることが明らかとなった。そして、チオ硫酸を硫酸まで酸化する一連の酵素群の発現が確認された。これは、SOXシステムによるチオ硫酸の不完全酸化、DSRシステムによる元素状硫黄酸化、そしてATP生成を伴うAPS経路を介した亜硫酸酸化によって構成されていた。

本研究で明らかとなった硫黄酸化経路は、クローニング解析において種を特定することができなかった他のベータプロテオバクテリアでも共通すると考えられる。実際にこのような経路を有するSOBが優占していたことを鑑みると、APS経路を介する硫黄酸化経路は、硫酸還元による基質の供給が制限される淡水湖沼環境に適応したSOBが共有する性質である可能性が示された。

本研究では、淡水湖沼環境で主要なSOBがベータプロテオバクテリアであることを初めて示した。さらに、優占種の一部を特定し、ゲノムおよびプロテオーム解析によって硫黄代謝に関する新たな発見を得た。以上は、未知だった淡水湖沼環境のSOBの生態解明に資するものである。

審査委員一同は、これらの成果を高く評価し、また研究者として誠実かつ熱心であり、大学院博士課程における研鑽や修得単位などもあわせ、申請者が博士(環境科学)の学位を受けるのに十分な資格を有するものと判定した。