



Title	札幌博物学会会報 第6巻 第1号 全1冊
Citation	札幌博物学会会報, 6(1)
Issue Date	1915-12-01
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/61257
Type	journal
File Information	TSNHS06_01.pdf



TRANSACTIONS
OF THE
SAPPORO NATURAL HISTORY SOCIETY.

FOUNDED IN 1891.

VOL. VI. Pt. 1.

札幌博物學會會報

明治二十四年創立

第六卷第一號

札幌博物學會印行

大正四年十二月

PUBLISHED BY THE SAPPORO NATURAL HISTORY SOCIETY.

SAPPORO, JAPAN.

DECEMBER, 1915.

NOTICE.

All communications should be addressed to the Sapporo Natural History Society in the College of Agriculture, the Tōhoku Imperial University, Sapporo, Japan.

注 意

本會に對する總ての書信は東北帝國大學農科大學内札幌博物學會に宛て發送せらるべし。

MATERIALS FOR A FLORA OF HOKKAIDO. V.

By

KINGO MIYABE

and

YŪSHUN KUDŌ.

北海道植物志料 V.

宮 部 金 吾

工 藤 祐 舜

45. **Hydrilla verticillata** Royle, Ill. Bot. Himal. t. 376 (1839); Caspary, in Pringsh. Jahrb. I. p. 494; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V. p. 659; Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin. III. p. 1; Aschers. u. Gürke, in Engl. u. Prantl, Nat. Pfl.-fam. II. 1. p. 250. f. 184. a, b; Körsh. Acta Hort. Peterop. XII. p. 394; Aschers. u. Graebn. Syn. Mitteleurop. Fl. I. p. 398; Kawakami, Bot. Mag. Tokyo XII. p. (225); Diels, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX. p. 220; Kom. Fl. Mansh. I. p. 237; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. p. 405; Nakai, Fl. Kor. II. p. 216.

Serpicula verticillata L. f. Suppl. p. 416.—*Hydrilla verticillata*, var. *Roxburghii* Casp. l. c.; Miq. Prol. Fl. Jap. p. 159; Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. p. 17; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 32.—*Hydrilla japonica* Miq. l. c.; Fr. et Sav. l. c. p. 18.

NOM. JAP. *Kuromo*.

HAB. *Yezo*. Prov. Iburi : Lake Osatsu (Y. Tokubuchi!¹⁾ 1893).—Prov. Kushiro : Lake Akan (Faurie! n. 10722, 1893; T. Kawakami!²⁾ 1897; J. Hanzawa!³⁾ 1904); Lake Tōro (J. Hanzawa! 1904).—Prov. Kitami : Lake Abashiri (Faurie! 1899).

DISTRIB. *Yezo*, Honshū, Kiushū, Riukiu, Formosa, Korea, Amur-region, Manchuria, China, Tropical Asia, Central Europe, Mauritius, Madagaskar and Australia.

As to the distribution of the species in the Japanese Archipelago, the Lake Abashiri is probably its northernmost locality.

46. **Vallisneria spiralis** L. Spec. Pl. ed. 1. p. 1015; Fr. et Sav. Enum. Pl.

1) 徳淵永次郎。 2) 川上瀧彌。 3) 半澤 洵。

Jap. II. p. 18; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V. p. 660; Aschers. u. Gürke, in Engl. Nat. Pfl.-fam. II. 1. p. 252. f. 185; Aschers. u. Graebn. Syn. Mitteleurop. Fl. I. p. 405; Britton and Brown, Ill. Fl. I. p. 93; Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin. III. p. 2; Hegi, Ill. Fl. Mitteleurop. I. p. 161. f. 75; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 33; Nakai, Fl. Kor. II. p. 217.

NOM. JAP. *Itomo*, *Sekishōmo*.

HAB. *Yezo*. Prov. Oshima: Ōnuma (Y. Tokubuchi! 1888); Junsainuma (K. Miyabe!¹⁾ 1899; S. Nishida!²⁾ 1913).—Prov. Ishikari: Lake Maoi (G. Yamada!³⁾ 1899).—Prov. Iburi: Lake Osatsu (Y. Tokubuchi! 1893).—Prov. Kushiro: Lake Tōro (S. Nozawa!⁴⁾ 1887); Lake Harutoru (K. Miyabe! 1894); Lake Akan (T. Kawakami! 1897; J. Hanzawa! 1904); Lake Kutcharo (K. Miyabe! 1915).

DISTRIB. *Yezo*, Honshū, Kiushū, Korea and widely distributed throughout Asia, Europe, Africa and North America.

47. *Calanthe nipponica* Makino, Bot. Mag. Tokyo XIII. (1899) p. 128; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 237.

C. trulliformis King et Pantl. var. *hastata* A. Finet, Bull. Soc. Bot. de France XLVII. (1900) p. 267.

NOM. JAP. *Kinsei-ran*, *Kinsei-ebine*.

HAB. *Yezo*. Prov. Ishikari: Sapporo (T. Hasegawa!⁵⁾ 1882); Nopporo (K. Miyabe! 1914); Manju (F. C. Greatrix! 1915).—Prov. Kushiro: Kutcharo, Huptainoshiri (K. Miyabe! 1915); Mt. Oakan (T. Kawakami! 1897).

DISTRIB. *Yezo*, Honshū, Shikoku, Kiushū.

48. *Cymbidium virens* Lindl. Bot. Reg. (1853) p. 24; Miq. Prol. Fl. Jap. p. 137; Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. p. 27; Yabe, Bot. Mag. Tokyo XVII. p. 143; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 241.

C. virescens Lindl. Bot. Mag. Misc. p. 37; Iinuma et Makino, Zōtei Somoku Zusetsu IV. pp. 1067 et 1186.—*C. Goeringii* Rchb. f. in Walp. Ann. III. p. 547.

NOM. JAP. *Shunran*, *Hokuro*.

HAB. *Yezo*. Prov. Shiribeshi: Isl. Okushiri (T. Kawakami! 1900; C. Suzuki!⁶⁾ 1914).

DISTRIB. Okushiri Island, Honshū, Shikoku, Kiushū.

49. *Dactylostalix ringens* Rchb. f. Bot. Zeit. XXXVI. (1878) p. 74;

1) 宮部金吾。 2) 西田彰三。 3) 山田玄太郎。 4) 野澤俊次郎。
5) 長谷川豊太郎。 6) 須崎忠助。

Pfitzer, in Engl. u. Prantl, Nat. Pfl.-fam. II. 6. p. 158.

Pergamena uniflora Finet, Bull. Soc. Bot. de France XLVII. (1900) p. 263 t. 8; Takeda, Hakubutsu-no-tomo VIII. n. 4. p. 16.

NOM. JAP. *Hime-hitoharan* (nov.).

HAB. *Yezo*. Prov. Ishikari : Mt. Nutakkanuishpe (A. Andō,¹⁾ 1907; Hideo Koizumi!²⁾ 1911).

DISTRIB. *Yezo*, Honshū.

50. *Dactylostalix maculosa* Miyabe et Kudo, sp. nov.

Dactylostalix ringens Makino, Bot. Mag. Tokyo XI. p. (413); Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 242? (non Rchb. f.)—*Pergamena uniflora* Makino, in Iinuma et Makino, Zōtei Somoku Zusetsu IV. pp. 1096 et 1210; Miyoshi and Makino, Atl. Alp. Pl. Jap. I. pl. 5. f. 28 (non Finet).

Rhizome horizontal, producing every year a tuber, a scape and a leaf, bearing a small bud at the end. Tuber almost perpendicular, slenderly elongate, tapering toward the end, villose throughout. Scape 16–20 cm in height, erect but ascending at the base, glabrous, usually with two cataphylls. Leaf one, subradical, petiolate, ovate or elliptical, 4–6 cm long, 3–4 cm broad, obtuse at the apex, round or obtuse at the base, membranaceous, 5–6 nerved on each side; petiole broadly winged, 1.2–2.5 cm long, 5–6 mm broad, many nerved. Flower solitary on the top of the scape. Outer perianth lineae-oblong, obtuse or acutish at the apex, 3-nerved, greenish in color, 18–20 mm long, 2.5 mm broad, the upper one a little broader and thicker. Inner perianth slightly shorter than the outer, linear-oblong, 3-nerved, acutish at the apex, greenish. Labellum shorter than the inner perianth, 14 mm long, obovate-orbicular, 3-lobed, whitish with purple dots; lateral lobes small, almost orbicular, tinged with a large dot; middle one largest, codate, round at the apex, a little crisped on the margin, 5-nerved, with 2 small dots at the base, 7 mm long, 10 mm broad. Gynostemium oblong, 1 cm long, 3.5 mm broad, 3-nerved, winged on the margin.

NOM. JAP. *Hitoharan*, *Ichiyōran*.

HAB. *Yezo*. Prov. Oshima : Moheji (S. Ninouye!³⁾ 1906 and 1907).

DISTRIB. Honshū and Southern part of Hokkaidō.

It is near to *Dactylostalix ringens* Rchb. f. from which it differs distinctly by its stouter stem and larger flowers, which have roundish labellum with conspicuous purple dots.

1) 安藤秋三郎。 2) 小泉秀雄。 3) 二ノ上七五三次郎。

51. **Liparis Krameri** Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. pp. 22 et 509 : Makino, Bot. Mag. Tokyo III. p. 7 ; Finet, Bull. Soc. Bot. de France XLVII. p. 262 ; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 252 ; Nakai, Fl. Kor. II. p. 224.

NOM. JAP. *Jigabachisō*.

HAB. *Yezo*. Prov. Ishikari : Nopporo (K. Miyabe ! 1914).—Prov. Iburi : Mt. Eniwa (K. Miyabe and S. Arimoto ! ¹⁾ 1912 ; M. Majima ! ²⁾ 1906).

DISTRIB. *Yezo*, Honshū, Shikoku and Korea.

52. **Orchis cyclochila** Maxim. Mél. Biol. XII. (1886) p. 548 : Finet, Bull. Soc. Bot. de France XLVII. p. 267 : Kom. Fl. Mansh. I. p. 511 : Nakai, Fl. Kor. II. p. 223.

Habenaria cyclochila Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. p. 516.—*Gymnadenia spec.* Miq. Prol. Fl. Jap. p. 139.—*Gymnadenia cyclochila* Korsh. Acta Hort. Peterop. XII. p. 396 ; Makino Bot. Mag. Tokyo, XI. p. (415) ; Inuma et Makino, Zōtei Somoku Zusetsu IV. pp. 1097 et 1121 ; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 1. p. 249 ; Makino and Miyoshi, Atl. Alp. Pl. Jap. I. pl. 7. f. 41.

NOM. JAP. *Kamomesō*, *Kamome-ran*, *Ichiyō-chidori*.

HAB. *Yezo*. Prov. Kushiro : Shoro (K. Nishikawa ! ³⁾ 1914).

DISTRIB. *Yezo*, Honshū, Korea, Manchuria.

53. **Thesium repens** Ledeb. Fl. Alt. I. p. 274 et Fl. Ross. III. p. 539 ; DC. Prodr. XIV. p. 648 ; Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 170 ; H. Takeda, Fl. Shikotan p. 484 ; Miyabe and Miyake, Fl. Saghal. p. 401.

NOM. JAP. *Kamayarisō*, *Hai-kanabikisō*.

HAB. *Yezo*. Prov. Hidaka : Mt. Apoi, Samani (K. Kondo ! ⁴⁾ 1912)

Kuriles. Isl. Shikotan : Shakotan (H. Takeda ! ⁵⁾ 1909).

Saghalin. Isl. Todomoshiri : Dainan (T. Miyake ! ⁶⁾ 1906) ; Kotan (T. Miyake ! 1906).—Kusunnai-Subdistrict : Kusunnai (Miyabe and Miyagi ! ⁷⁾ 1906).—Usutomanai-Subdistrict : Usutomanai (Miyabe and Miyagi ! 1906).—Toninai-Subdistrict : Chishinai (Miyake ! 1908).—Motodomari-Subdistrict : Mt. Nupuripo (Miyake ! 1907).

DISTRIB. *Yezo*, Southern Kuriles, Saghalin, Dahuria, Baical-region and Altai.

54. **Nuphar pumilum** Smith, Engl. Bot. t. 2292 ; DC. Prodr. I. p. 116 ;

1) 有元新太郎。 2) 眞島政吉。 3) 西川冠次郎。 4) 近藤金吾。
5) 武田久吉。 6) 三宅 勉。 7) 宮城鐵夫。

Ledeb. Fl. Alt. II. p. 274 et Fl. Ross. I. p. 85; Regel, Fl. Ussur. p. 18 et Pl. Radd. Polyp. p. 126; Korsh. Acta Hort. Peterop. XII. p. 304; Kawakami, Bot. Mag. Tokyo, XII. p. (224); Kom. Fl. Mansh. II. p. 219.

Nuphar japonicum DC. var. *subintegerrimum* Matsum Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 92 (non Casp).

NOM. JAP. *Yezo-kōhone*, *Nemuro-kōhone*.

HAB. *Yezo*. Prov. Kushiro: Lake Akan (T. Kawakami! 1897).—Prov. Nemuro: Otsuishi (K. Miyabe! 1884); Tomoshiri (K. Miyabe! 1884; S. Yamane!¹⁾ 1894); Shibetsu (K. Miyabe! 1884).

Kuriles. Isl. Kunashiri: Tōbutsu-mura, Kenitaushi (C. Yendo!²⁾ 1894).—Isl. Etorofu: Toshimoi (T. Kawakami! 1898).

DISTRIB. *Yezo*, Manchuria, Amur-region, Siberia and Europe.

55. *Cardamine Fauriei* Franch. Bull. Soc. Phil. Paris (1888) p. 85; H. Boiss. in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 792; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 152.

C. geumifolia Koidz. Bot. Mag. Tokyo XXVII. p. (564).—*C. geifolia* Koidz. in Matsum. Ic. Pl. Koishi. II, p. 25. Pl. 97.

NOM. JAP. *Yezo-wasabi*, *Mitsuba-tanetsukebana*.

HAB. *Yezo*. Prov. Oshima: Ichinowatari near Shiriuchi (Miyabe and Tokubuchi! 1890).—Prov. Shiribeshi: Isl. Okushiri, Aonai (S. Yokoyama!³⁾ 1891); R. Yoichi at Nakanosawa (T. Ishikawa!⁴⁾ 1893); Inaotoge (Y. Takenobu and K. Mimashi!⁵⁾ 1883; Y. Tokubuchi! 1888); Kumaishi (Miyabe and Tokubuchi! 1890).—Prov. Ishikari: Asahikawa (Hideo Koizumi! 1913); Kamuikotan (K. Miyabe! 1891); Yūbari (Y. Tokubuchi! 1893); Utashinai (Y. Tokubuchi! 1892).—Prov. Teshio: Oketo (T. Ishikawa! 1892); Uyenbetsu (T. Ishikawa! 1891).—Prov. Iburi: Shitsukari (T. Kawakami! 1892).—Prov. Kitami: Nayoro (S. Yokoyama! 1892); Okoppe (S. Yokoyama! 1892); Sarubutsu (T. Ishikawa! 1892).

DISTRIB. *Yezo* and Honshū.

56. *Cardamine nasturtiifolia* Boiss. in Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) p. 793; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 153.

C. yezoensis Maxim. in litt.; Matsum. Bot. Mag. Tokyo IV. p. 11.—*C. Miyahei* Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 153.

NOM. JAP. *Yezo-no-janinjin*.

1) 山根 榮。 2) 遠藤千尋。 3) 横山壯次郎。 4) 石川貞治。
5) 武信由太郎。 三増久米吉。

HAB. *Yezo*. Prov. Hidaka : Saruru-sandō (K. Miyabe ! 1884 : Tokubuchi ! 1892); Saruru (Y. Tokubuchi ! 1892 : Faurie, 1893) : Shoya (Y. Tokubuchi ! 1892).

DISTRIB. An edemic species.

57. *Cardamine tenuifolia* Turcz. Fl. Baic.-Dahur. I. p. 120 : Maxim. Mém. Biol. IX. p. 4; Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin. I. p. 44; Korsh. Acta Hort. Peterop. XII. p. 307; Palib. Fl. Kor. I. p. 27; Kom. Fl. Mansh. II. p. 362; Nakai, Fl. Kor. I. p. 56; Miyabe and Miyake, Fl. Saghal. p. 45.

Dentaria tenuifolia Ledeb. Fl. Alt. III. p. 43 et Fl. Ross. I. p. 130; DC. Prodr. I. 156 : Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 16; Rgl. et Tiling, Fl. Ajan. p. 47; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 45; Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 112.—*Dentaria tenella* Rgl. Fl. Ussur. p. 22, et Pl. Radd. Polyp. p. 176 (non Pursh.).—*Cardamine* Gmelin, Fl. Sib. III. p. 272. n. 41 t. 65.

NOM. JAP. *Hosoba-konronsō*.

HAB. *Yezo*. Prov. Kitami : Minami-sōya (Yanagisawa ! ¹⁾ 1911).

Saghalin. Mauka-Subdistrict : Mt. Mauka (T. Miyake ! 1907).—Tonnai-Subdistrict; Kimunai (T. Miyake ! 1908).—Russian Saghalin : Between Nuto and Chaiwo (T. Ishikawa ! 1912) : Dui and Arakai (Glehn 1861).

DISTRIB. Northern Yezo, Saghalin, Korea, Manchuria, Amur-region, Dahuria, and Siberia.

New to the Flora of Hokkaidō.

58. *Berchemia racemosa* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) p. 147; A. Gray, Bot. Jap. p. 384; Benth Fl. Hongk. p. 67; Maxim. Rhamn. Or. p. 5; Miq. Prol. Fl. Jap. p. 219; Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. I. p. 81; Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin. I. p. 127; Werberbauer Rhamn. in Engl. u. Prantl, Nat. Pfl.-fam. III. 5. p. 406 f. 199 A-C; Diels, Fl. Centr. China p. 458; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. p. 87; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 337.

NOM. JAP. *Kumayanagi*.

HAB. *Yezo*. Prov. Iburi : Tomakomai (Y. Kudō and T. Yoshimi ! ²⁾ 1915).

DISTRIB. Yezo, Honshū, Kiushū, Formosa, and China.

New to the Flora of Hokkaidō.

59. *Eritrichium nipponicum* Makino, Bot. Mag. Tokyo XVII. p. 51; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 525; Miyabe and Miyake, Fl. Saghal. p. 334. pl. X. f.

1) 柳澤 某。 2) 工藤祐舜。吉見辰三郎。

3-6.

NOM. JAP. *Miyama-murasaki*.HAB. *Yezo*. Prov. Hidaka. : Mt. Apoi, Samani (K. Kondo ! 1912).*Saghalin*. Motodomari-Subdistrict : Chikaporonai (T. Miyake ! 1907) : Mt. Nupuripo (T. Miyake ! 1907).DISTRIB. *Saghalin*, *Yezo* and *Honshū*.

60. ***Lonicera strophophora*** Franch. in Bull. Soc. Philomath. Paris, Sér. 7. (1886) p. 142 ; A. Rehder, Syn. Lonic. in 14th An. Rep. of Mo. Bot. Gard. p. 95 ; Makino, Bot. Mag. Tokyo, XIX. p. 148 : C. K. Schn. Laubholzk. II. p. 703 ; Matsum. Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 601.

Lonicera pilosa Maxim. Mél. Biol. X. p. 73 ; Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. p. 653 ; Kawakami, Dainippon Sanrinkwaihō. no. 219 (1901) p. 26, (non Willd.).—*Lonicera Amherstii* Dippel, Handb. Laubholzk. I. p. 263 f. 175 e. p. ; Makino, Bot. Mag. Tokyo XVII. p. 208.—*Caprifolium Amherstii* O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. I. p. 274. e. p.

NOM. JAP. *Arage-hyotanboku*, *Ohba-hyotanboku*.HAB. *Yezo*. Prov. Shiribeshi : Isl. Okushiri (Miyabe and Tokubuchi ! 1890 ; T. Kawakami ! 1900).DISTRIB. Island of Okushiri and Northern *Honshū*.

摘 要

45. *Hydrilla verticillata* Royle. くろも。

膽振國長都湖、釧路國阿寒湖及塘路湖、北見國網走湖等に産す。

46. *Vallisneria spiralis* L. いとも、せきしやうも。

渡島、石狩、膽振、釧路等の湖沼中に生ず。

47. *Calanthe nipponica* Makino. きんせいらん、きんせいえびね。

石狩、釧路、兩國に産す。

48. *Cymbium virens* Lindl. しゆんらん、ほくろ。

本道に於ては奥尻島のみに産す。圖は増訂草木圖説第四輯千六十七頁にあり。

49. *Dactylostalix ringens* Rchb. f. ひめひとばらん。(新稱)

根莖は匍匐し先端に大形なる芽を生ず。一莖一葉一花。莖は細纖、上部に於て益細し、花も亦比較的小形なり。外花被片三個、膜質、三脈を有し、内花被片は二個、一乃至三脈を有し、膜質、唇瓣は三淺裂し、兩側裂片は極めて小形、中央裂片は大形にして卵狀長橢圓形又は長橢圓狀披針形、鈍頭、數脈を有し、膜質、斑点を欠く。藥柱は中央部甚だ厚く兩側は薄くして翼狀をなす。本種は本道に於てはヌタクカムシユベ山に産す。

50. *Dactylostalix maculosa* Miyabe et Kudo. ひとはらん、いちえふらん。

根莖は匍匐し先端に小形なる芽を生ず。一莖一葉一花。莖は比較的太くして上部に至るも甚だしく細形とならず。花は前者より大形なり。外花被片三個、少しく厚くして綠色を呈し、三脈を有す。内花被片二個、厚くして綠色を呈し、三脈を有す、唇瓣は大形、三淺裂し左右の裂片は小形、殆ど圓形、白色、内に二個の紫色の斑点を有す、中央裂片は大形、心臟形、圓頭、白色にして基部に二個の紫色の斑点を有す。藥柱は扁平、其縁部は膜質、三脈を有す。本種は本道にては渡島國上磯郡茂邊地村に産す。圖は増訂草木圖説第四輯千九十六頁及び高山植物圖譜第一卷第五圖版(二十八號)にあり。

51. *Liparis Kramerii* Fr. et Sav. じがばちさう。

石狩國及び膽振國に産す。

52. *Orchis cyclochila* Maxim. かもめさう、かもめらん、いちえふちどり。

釧路國に産す。圖は増訂草木圖説第四輯千〇九七頁にあり。

53. *Thesium repens* Ledeb. かまやりさう、はひかなびきさう。

北海道本島にては日高國アボイ山に産し、又千島にては支古丹島に産す又樺太にも生ず。

54. *Nuphar pumilum* Smith. えぞかはほね、ねむろかはほね。

釧路國及び根室國に産す。

55. *Cardamine Fauriei* Franch. えぞわさび、みつはたねつけはな。

渡島、後志、石狩、天鹽、北見等に於て通常に之れを産す。小泉氏の *Cardamine geifolia* と命ぜしは本種に外ならず。圖は植物圖編第二編第二集第九十七圖なり。

56. *Cardamine nasturtiifolia* Boiss. えぞのじやにんじん。

日高國、猿留及び庶野地方に限り本種を産す。

57. *Cardamine tenuifolia* Turcz. ほそばこんろんさう。

北見國南宗谷に産し又樺太に生ず。

58. *Berchemia racemosa* Sieb. et Zucc. くまやなぎ。

膽振國苫小牧、農科大學演習林内に自生す。

59. *Eritrichium nipponicum* Makino. みやまむらさき。

北海道に於ては日高國アポイ山に産し、又樺太にも之れを産す。圖は樺太植物誌第十圖版にあり。

60. *Lonicera strophophora* Franch. あらびへうたんぽく、おほへうたんぽく。

後志國奥尻島に産す。



EIN NEUER RUESSELKAEFERSCHAEDLING FUER DIE SACHLINTANNE.

VON

Prof. Y. NIISIMA, *Ringakuhakushi.*


「とゞまつ」を害する象鼻蟲新種に就て

林學博士 新島善直

Mitte Februar dieses Jahres habe ich im forstlichen Versuchswalde zu Nopporo (Prov. Ishikari) viele abgestorbenen Sachlintannen *Abies sachalinensis* Mast. gefunden. Gleich untersuchte ich genau den Schaden und fand, dass er von Rüsselkäfern verursacht wurde. Die fast sternförmig gebohrten Larvengänge sind gleich unterhalb der Rinde. Es war meistens Stangenholz, welches beschädigt war. Die befallenen Bäume hatten grösstenteils schon früher durch Sturm, Frostriss und langhornigen Bockkäfern *Monochammus grandis* Waterh., welche darin gebohrt hatten gelitten; jedoch einige gesunde Bäume mit grünen Kronen waren auch von dem Insekt befallen worden. Der Schaden war gleich zu erkennen, denn Spechte hatten die Rinde frei gelegt. Der Schädling befand sich im Larvenzustande und kein vollkommen lebender Käfer war daher anzutreffen. Nur im ausgeflossenen Harz war ein unvollständig stark gelittener Käfer. Elytra und Halsschild waren gut erhalten. Später fand ich in Prof. Matsumuras entomologischen Sammlung ein aus Jozankei stammender Käfer. Die gefundenen Larven züchtete ich und Mitte Juli entschlüpften die Jungkäfer. Nach genauer Untersuchung musste ich feststellen, dass es sich um eine neue noch unbeschriebene *Pissodes*-Art handelt.

In Japan sind schon zwei *Pissodes*-Arten *nitidus* und *obscurus* beschrieben worden, aber diese neue Art hat keine Aehnlichkeit damit. Dem europäischen Harzrüsselkäfer, *Pissodes harzyniae* Hbst., ähnelt er durch Färbung und Flecken; jedoch bei der japanischen Art fehlt die Erhöhung der Elytra, sodann ist er auch grösser von Gestalt. Diese neue Art benenne ich *Pissodes japonicus*, nachstehend folgt seine Beschreibung.

Körper ohne Rüssel 7,6 mm l., Rüssel 2 mm l. schwarz mit zerstreuten hellgelblichen Schüppchen, Fühler fast in der Mitte des Rüssels eingelenkt. Hals-



Pissodes japonicus n. sp.

schild nach vorne stark verschmälert, Hinterecken fast rechtwinkelig, Hinterrand kaum zwei-buchtig; Scheibe dicht runzelig punktiert in der Mitte mit einer erhöhten Längslinie, beiderseits einen feinen punktartigen Schuppenfleck besitzend. Scutellum rund, grauweiss. Elytra am beiden Seiten fast parallel laufend, mit tief punktierten Streifen, die Punkte ungleich gross. Vorder- und Hinterquerbinde beide einfarbig, hellbräunlich, hauptsächlich auf dem 3. und 5. Zwischenraum stark gefleckt, der 4. schwach gefleckt, wogegen am Seitenrande der Vorderbinde ein hellgelblicher Fleck ist. Beine bräunlich schwarz, Vorderhüften in der Mitte sich einander nähern, aber nicht zusammenstossen.

摘 要

本年二月野幌林業試験場内に発生したる「とぶまつ」の害蟲たる一種の象鼻蟲を検し之を「とぶまつぞうむし」 *Pissodes japonicus* と名けたり、本害蟲は多くは少しく他の甲蟲或は風害等の爲め衰勢に傾きたる「とぶまつ」の樹幹に寄生し之を枯死せしむるものなり、

成蟲は体長 7,6 耗口吻 2 耗黒色にして淡褐の細毛を散布す、翅鞘上に存する此屬に殆んど通有なる前後二條の横斑は共に褐色を帶び其形状不規則なり、前脚の基節は僅に相離るゝのみなり、幼蟲は白色にして凡ろ 11 耗あり、穿孔は略ぼ星狀をなす。

A NEW BROWN-SPOT DISEASE OF THE LEAF
OF GLYCINE HISPIDA MAXIM.
CAUSED BY SEPTORIA GLYCINES sp. n.

By

TAKEWO HEMMI, *Nōgakushi.*

セプトリア屬一新種の寄生に因る大豆の
新病害褐紋病に就きて

農學士 逸見武雄

Glycine hispida Maxim. or soy bean is one of the most important leguminous crops in the Far East. In Hokkaidō it is most extensively cultivated, as the climate is well suited for its production. There are many destructive diseases, which attack the soy bean in our country and of which the investigations have already been done to a greater or less extent. But we have not yet heard of a destructive Septoriose on this important crop in our country. The only species of Septoria, which has been recorded as a causal fungus of a leaf-spot disease of the soy bean plant in mycological and pathological literatures, is **Septoria sojina** Thüm. *)

It was in the early summer of the last year that my attention was first drawn to a diseased appearance of the leaves of this plant in the experimental plots of our college and in the adjoining fields. The microscopical examination showed at once that it was due to a kind of Septoriose. My interest was naturally aroused leading me to inquire into the extent of the damage done in other bean fields about Sapporo, and I was impressed with the fact, that the loss due to the disease

*) Von Thümen: Symbolae ad Floram mycologicam austriacam. III p. 63' (1879).

P. Saccardo: Sylloge Fungorum, Vol. III p. 509 (1884).

P. Allescher, in Rabenhorst's Kryptogamen Flora II. Aufl. Die Pilze VI. Abt. Fungi Imperfecti. s. 858. (1901).

出田新, 日本植物病理學 p. 655 (1909-1911)

G. Briosi: Rassegna crittogamica dell'anno 1911, con notizie sulle malattie dei meliloti, dei latiri, del fieno greco, del trifoglio giallo, ecc. dovute a parassiti vegetali. In Bolletino ufficiale del Ministero di Agricolt., Ind. e Comm.; an. XI., fasc. 4-6; Roma, (1912). Ref. in Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, XXIII. s. 201. (1913).

was not a little, for every fields were more or less affected by it.

Later in the same year, during my botanical excursions in the Province Iburi in August and in the Provinces Kitami, Tokachi and Ishikari in September, I observed and collected the diseased leaves at several places. The fungus in question was first collected in 1913 by Prof. K. Miyabe in the Province Kitami and I could examine it through his kindness. These facts show that the disease is very common and very widely distributed throughout Hokkaidō. In August of this year, Prof. S. Itō found the same fungus in the Province Echigo in Honshū. Judging from the extent to which the fungus has spread in the field, we may also safely infer, that the disease had existed there for many years without drawing our attention, and in 1914 it happened to take somewhat the character of an epidemic.

As the disease was common in the vicinity of Sapporo, I had many opportunities of studying carefully its symptoms as well as the nature of its causal fungus; and in consequence, I have been able to recognize that the fungus in question is a new species which has passed undescribed up to the present time.

Symptoms of the Disease.

The disease appears first upon both sides of the lower leaves of young plants as brown or light reddish brown spots in the early summer. Those spots are slightly raised and angular and distinct in outline, being limited by veinlets, and are scattered irregularly over the surface. The color of the spots gradually turns into dark brown and finally into blackish-brown. They are comparatively large and are most commonly 2-3 mm. in diameter, but not seldom they exceed 5 mm. The margin of the spot is not especially bordered with a deeper color as in the other type of Septoriose. The spot is more or less hypertrophied. The old spots frequently turn into grey color from the central region, the close examination of which, especially with a magnifying hand lens, reveals exceedingly small dark-colored pycnidia scattered throughout. The spots become confluent often forming large irregular brown or dark-brown patches, and the diseased leaves also turn gradually into yellow or brown color from the margin, then become dry and fall off.

The disease then works toward the top of the plant, often causing the loss of so many leaves as to result in complete ruin of the crop. The disease spreads most rapidly in a damp warm weather or in places which are incompletely drained. But in the mid summer or in a dry region, the disease does not attack the upper leaves,

although the lower leaves may have become completely wilted and defoliated.

If the surrounding conditions are favourable to the growth of the fungus in September, the disease spreads again actively. In this case, the spots are not so angular, as in those in the early summer, and are more in number and smaller in shape. In the autumn, it is difficult to distinguish this disease, as the diseased leaves are generally attacked by many saprophytic fungi. The disease may not cause a great loss of the crop; but it may interfere with the general productiveness by diminishing its assimilating surface and sometimes by causing defoliation.

Causal Fungus.

A section through the diseased spot shows the hyphae to be ramifying in the tissue of the leaf, whose chloroplasts are destroyed. The hyphae are $2-4\ \mu$ in width. The pycnidia are formed under the epidermis and immersed into the tissue at the both sides of the leaf (mostly on the upperside). They are globose or conico-globose and measure $44-100\ \mu$ (commonly $60-70\ \mu$) in diameter. The wall of the pycnidium is rather thin, membranaceous and brown or dark brown in color. It has a short round papilla which is at first covered, then erumpent with a comparatively large mouth.

The spores are filiform, straight or mostly curved irregularly, smooth, hyaline and occasionally guttulate. When the spores are stained with iodine solution, it will be clearly observed that they consist of one to three, rarely of four cells. When it is mounted in water or potash, these septa may often be overlooked. Their measurement are $21.0-52.5 \times 1.4-2.1\ \mu$. The conidiophores are very short and I could not examine them exactly. Placed in a drop of water or nutritive media, the spores swell at first, showing the septa clearly, and then germinate within 24-50 hours in the room temperature, throwing out one or two germ-tubes from each cell at or near the septa or also at the ends of the spores. The germinating hyphae are hyaline and about $2-3\ \mu$ in width. The septation and branching then take place.

From the morphological characters of the spores and pycnidia, we may easily recognize our present fungus to be a species of *Septoria*. Up to the present time, I have not yet been able to obtain its ascospore stage. According to the description, *Septoria sojina* Thüm., which is the only species known to be parasitic on the leaves of *Glycine hispida*, is quite different from the present species in many points, especially in the measurement of the spores. The important charac-

ters of these two fungi are as follows:—

	Septoria soja Thüm.	Septoria sp.
1. Pycnidia	epiphyllous conico-globose	amphigenous globose to conico-globose 44–100 μ
2. Conidia	cylindrical to subcuneal 1 septate 12–18 $\times$ 4.5–5.0 μ	filiform 0–3 septate 21.0–52.5 $\times$ 1.4–2.1 μ
3. Spots	irregular in shape bordered	mostly angular unbordered

Other species of *Septoria* which are parasitic on the leaves of leguminous plants, differ from the present fungus also in the macroscopical or microscopical appearances. From the foregoing statements, I consider the present fungus to be a new species, and the following diagnosis is given.

Septoria Glycines Hemmi, sp. n.

Spots amphigenous, at first angular, brown to reddish brown, unbordered, at last dark brown or blackish brown, having greyish center, scattered or gregarious, often confluent, commonly 2–3 mm. in diameter; pycnidia amphigenous, mostly epiphyllous, scattered, globose or conico-globose, membranaceous, brown or dark brown, 44–100 μ in diameter, at first covered by epidermis, then erumpent; spores hyaline, filiform, more or less curved, or sometimes straight, smooth, guttulate, obscurely septated, 1–4 celled, 21.0–52.5 μ long, 1.4–2.1 μ broad.

Hab. On the leaves of **Glycine hispida** Maxim.

Hokkaido.—Prov. Ishikari: Sapporo (June 28; July 1; July 6; July 20; Sept. 8, 1914. T. Hemmi), Nopporo (July 4, 1910. T. Hemmi), Tsukisappu (July 19, 1914. T. Hemmi), Shimofurano (Sept. 25, 1914. T. Hemmi), Motomura (July 25, 1915. T. Hemmi).

Prov. Tokachi: Obihiro (Sept. 24, 1914. T. Hemmi).

Prov. Kitami: Nokkeushi (Sept. 22, 1914. T. Hemmi; Sept. 23, 1913. K. Miyabe).

Prov. Iburi: Kutchan (Aug. 23, 1914. T. Hemmi), Higashikutchan (Aug. 26, 1914. T. Hemmi).

Honshū.— Prov. Echigo: Uchino-Mura (Aug. 13, 1915. S. Ito).

I wish to express here my heartiest thanks to Prof. K. Miyabe to whom I am indebted for his valuable suggestions.

September 23, 1915

Phytopathological Laboratory,
College of Agriculture,
Tōhoku Imperial University,
Sapporo, Japan.

摘 要

余が當農科大學試作園内大豆圃の一部に一病害發生せしを發見したるは、昨大正三年六月なりしが、直ちに被害葉を檢鏡し、其原因全く *Septoria* 菌の寄生によるを認め、之れを調査せるに、未だ世に紹介せられざる病害菌たるを確め得たるにより、遂に新種と斷定し *Septoria Glycines* と命名したり。

其後予は近郊の農家に就きて被害狀況を調査せしに、何れも多少の發生を見ざるなく、其損害決して尠少にあらざるを知れり。之れより先き同一病原菌は、既に大正二年九月宮部博士によりて、北見國野付牛村に採集せられ、予も亦昨大正三年八月膽振國俱知安、東俱知安兩村に於て發病せる圃場を目撃し、同年九月北見國野付牛村、十勝國帶廣町、石狩國下富良野村等に於て採集したるに因て見れば、本道に於ける本病分布區域の廣汎なるは推して知るべし。更に本年八月同病原菌は伊藤誠哉氏によりて越後に採集せられたるを以て、廣く内地にも分布すること明らかとなれり。

本病の發生期は六七月の候にして、最初幼植物の下葉に褐色又は赤褐色の斑紋不規則に散生し、葉の兩面より認め得、病斑は漸次濃色となり、遂に黒褐色に變ず、而して葉の表面に於ては健全部より稍々膨起し、葉脈に限られて限界稍々鮮明なる不正多角形を呈すれども、特別なる周縁を有することなし。最

も老熟せる斑紋は、時を経るに従ひ、中央部少々灰褐色となる。斯くの如くにして、斑紋多數發生する時は、漸次癒合擴大して一大病斑を作るに至る、葉は爲に周縁より黄色又は褐色に變じ萎凋して遂に枯死落下す。本病は多く下葉に止まり上葉を襲ふ事なくして止むと雖、溫暖にして濕潤なる氣候若しくは排水不完全なる所に於ては、感染すること甚だしきものにして、激裂に上葉を侵害し、遂に全植物の發育を阻止せしむ。秋期發病せるものは斑紋極めて小形にして、多數散生し其形狀も亦一樣ならざるを常とす。

本病原菌の子殻は被害葉の両面に生ずれども、多くは表面に生じ、組織中に埋没し徑 44-100 μ (通常 60-70 μ) あり。胞子は絲狀にして、眞直なるものあれども、多くは不規則に彎曲し、平滑にして透明、時に油球を含有するものあり。一箇乃至四箇の細胞よりなり、長さ 21.0-52.5 μ 幅 1.4-2.1 μ なり。

本病原菌は如上の性質より明らかに *Septoria* 屬に隸屬せしむべきものなれども、既知種たる大豆の同屬寄生菌 *Septoria sojae* Thüm. なるものに比較するも、其性質種々の點に於て相一致せず、就中胞子の形狀及び大きさに著るしき差違あるを認む。



EINIGES ÜBER DEN MONGOLISCHEN KÄSE GENANNT NAITOFU.

VON

MASAYOSHI SATO, *Nōgakushi.*

蒙古の乾酪所謂奶豆腐に就て

里 正 義

Die Nahrung der Mongolischen Hirtenvölker besteht grösstenteils aus Produkten der Viehzucht. Das Hauptgericht ist Ziegeltee mit einer Zugabe von Hirsemehl, Salz, Butter und Milch. Als weiter wichtige Nahrungsmittel können ausser dem Ziegeltee noch die Butter, eine Art Quark und der aus dem bekannten Kumys destillierte Branntwein erwähnt werden. Die Milch ist daher unentbehrlich bei der täglichen Zubereitung der Speisen in der Mongolei.

Da während des Winters die zur Bereitung der verschiedenen Nahrungsmittel nötige Milch nicht ausreicht, benutzt man Naitofu, der in rohem Zustand oder, um ihm mürbe zu machen, gekocht sowie geröstet geniesst. Besonders auf der Jagd und auf Reisen pflegen die Mongolen der Käse unter dem Sattel zu haben.

Naitofu wird gewöhnlich im Sommer, da man die Milch reichlich erhalten kann, aus ganz oder nur wenig entrahmter Kuhmilch oder aus einem Gemenge von Schaf- und Ziegen-Milch hergestellt.

Die Bereitung von Naitofu ist die folgende:

Die Milch wird bei gewöhnlicher Temperatur dickgelegt und der Quark dann in einen Kochkessel gebracht, um den Rest der Molken einzudampfen und denselben klebrig zu machen. Hierauf füllt man ihn in rechteckige Holzgefässe, welche einige Tagelang an einen schattigen Ort stehen werden. Nach dieser Zeit wird der Quark so fest, dass man ihn herausnehmen kann. Diese Käse werden hierauf noch einige Tage im Sonnenlicht getrocknet und dann gelagert.

Die Form der mir vorliegenden Käse ist rechteckig, ihre Länge beträgt 16-19, ihre Breite 9-9,5, ihre Dicke 1,5-2 cm, das Gewicht schwankt zwischen 0,274

und 0,387 kg, sie sind von gelblicher Farbe.

Da ich in der mir zur Verfügung stehenden Literature keine Angaben über die Zusammensetzung von Naitofu fand, hielt ich es der Mühe wert, den von Herrn Prof. Dr. Hashimoto aus der Mongolei mitgebrachten Käse zu analysieren. Für das liebenswürdige Überlassen dieses Käses sage ich gleich an dieser Stelle Herrn Prof. S. Hashimoto meinen verbindlichsten Dank.

Die Untersuchungen wurden in folgender Weise ausgeführt.

Der Wassergehalt wurde durch Trocknen im Wassertrockenschrank bestimmt. Die Fettbestimmung erfolgte nach der Extraktionsmethode von Soxhlet und die Bestimmung des gesamtstickstoffes nach Kjeldahl. Zur Bestimmung der wasserlöslichen Stickstoffverbindungen werden nach Barthel 10g Käse mit wasser von 40°C, zu einem dünnflüssigen Brei verrieben, in einen 250 ccm Kolben hinein gespült und nach dem Erkalten bis zur Marke noch mit Wasser gefüllt. Nun lässt man ihn 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, schüttelt ihn während dieser Zeit öfters um und filtriert dann.

Von 25 ccm des Filtrates bestimmt man durch Eindünsten und verbrennen nach Kjeldahl den wasserlöslichen Gesamtstickstoff.

In 50 ccm des Filtrates bestimmt man ferner die löslichen Eiweisstoffe, indem man es mit 30 ccm Schwefelsäure 1 : 4 ansäuert und mit 20 ccm 10% Phosphorwolframsäure fällt, den Niederschlag nach 24 Stunden auf einem Filter sammelt, auswäscht und nach Kjeldahl verbrennt. Die Phosphorwolframsäure fällt nicht nur die Eiweisstoffe, sondern auch die basischen Zersetzungsprodukte. Durch Destillation mit Magnesia eines Teils des ersten Filtrats ermittelt man den Ammoniakstickstoffgehalt und zieht ihn von dem durch Fällung mit Phosphorwolframsäure erhaltenen stickstoff ab. Den Amidstickstoff erhält man aus der Differenz zwischen dem gesamten wasserlöslichenstickstoff und dem Ammoniakstickstoff plus den löslichen Eiweisstickstoff.

Die Untersuchungsergebnisse sind folgende.

Naitofu enthält:

11.630 % Wasser

22.400 % Fett

62.228 % Gesamtstickstoff

3.290 % Asche

99.548 %

Die wasserlöslichen Stickstoffverbindungen in der lufttrocknen Substanz sind:

1,981 % Gesamterlöslicher Stickstoff
0,259 % Ammoniakstickstoff
0,481 % Löslicher Eiweisstickstoff
1,244 % Amidstickstoff.

Mai, 1915.

摘 要

數年前農學博士橋本左五郎氏の滿蒙旅行より齎らし來られたる多數の畜産製造品中蒙古乾酪所謂奶豆腐に關し未だ記載せられたるものなければ同博士の談話、友人滿鐵社員高島農學士の通信並びに蒙古住民に關する文献に徴し余の分析結果を加へて聊か之れが製法成分を豫報すへし。

由來蒙古人の食物は大部家畜の生産物より製せらるものにして奶子茶、黃油。奶子酒、奶豆腐等は蓋し其の主なるものに屬せり、而して奶豆腐は乳汁の豊富なる夏期に於て極めて簡單なる方法によりて製造せらるものにして、即ち自然的乳酸醱酵によりて乳汁を凝固せしめて乳漿を分離し凝固乾酪素のみを掬ひ取りて之を釜に入れ煮沸攪拌して餘分の乳清を蒸發せしむると同時に粘性を増加せしめ後木箱に入れて暫時冷却固化せしめ尙日光に曝らして充分乾燥するに至りて之を器中に貯藏す。

奶豆腐の未だ乾燥不充分にして柔軟なるものは其の儘食用に供すれども乾燥固化せるものは煮沸し或は炙りて之を軟膨ならしめ後之れを食す、實に蒙古人は狩獵又旅行に際し必ず鞍下に之れを携ふると云ふ。

余の試験に供したる奶豆腐は長さ 16-19. 幅 9.-9.5 厚さ 1.5-2. 粒なる長方形にして 0.274-0.387 珎の重さを有し極めて硬く黄色を呈せり。

分析の結果水分 12.630%、含脂量 22.400%、含窒素物 62.228%、礦物質 3.290%、にして可溶性窒素化合物は氣乾量に對し全可溶性窒素 1.981%、アンモニア窒素 0.259%、可溶性蛋白窒素 0.481%、アミド窒素 1.244%、を有せり、但し一製品に就ての分析結果にすぎざるのみならず個々其の成分を異にするものなれば尙多數の成品に就て平均成分を得るにあらざれば之れを以て蒙古乾酪の成分なりと見做すこと能はざるや勿論なり。

茲に橋本博士並びに高島農學士の御好意を深謝す

大 正 四 年 五 月

~~~~~

# IMPFVERSUCHE MIT MELAMPSORA AUF JAPANISCHEN WEIDEN

VON  
TAKASHI MATSUMOTO  
(Mit 5 Textfiguren)

---

本邦柳類の銹菌に關する接種試験

松 本 巍

---

## Einleitung

Die Studien über die Weidenmelampsoren stammen fast ausschliesslich aus der jüngsten Zeit. Den wissenschaftlichen Nachweis des Wirtwechsels bei den Weidenmelampsoren verdanken wir E. ROSTRUP, P. NIELSEN und CH. FLOWRIGHT. Vor allem aber kommt H. KLEBAHN das Verdienst zu, den Wirtwechsel von zahlreichen Weidenmelampsoren nachgewiesen und in seiner Schrift von den wirtwechselnden Rostpilzen (1904) über den Zusammenhang zwischen den Aecidien und den Teleutosporen der wirtwechselnden Rostpilze die grundlegenden Begriffe geschaffen zu haben. Leider sind bisher in bezug auf die japanischen Weidenmelampsoren keine Infektionsversuche veröffentlicht worden. Deshalb habe ich im letzten Herbst auf Anregung und unter Leitung von Herrn Prof. Dr. MIYABE die vorliegenden Studien begonnen. Seiner freundlichst gewährten Mithilfe habe ich es in erster Linie zu verdanken, dass es mir möglich geworden ist, diesen kleinen Bericht zu vollenden. Ferner ist es mir eine angenehme Pflicht, für nützliche Ratschläge Herrn Dr. S. ITO. und Herrn Dr. KEN. MIYABE meinen besten Dank auszusprechen.

## 1. Zur Systematik.

Seit letztem Herbst habe ich unter Benutzung der Dissertation von N. HIRATSUKA, sowie der Arbeiten von P. DIETEL die in der Umgegend von Sapporo vor-

kommenden Rostpilze zum Gegenstand meiner Studien gemacht. In morphologischer Beziehung aber ist es sehr schwer, eine sichere Unterscheidung der Arten vorzunehmen. Nur die Aufklärung der Biologie im Verein mit morphologischen Untersuchungen kann genauere Resultate zu Tage fördern. Ohne die Schwierigkeiten zu verkennen, die die Bestimmung von morphologisch einander so nahe stehenden Pilzen bietet, habe ich dennoch versucht, eine Synopsis der Weidenmelampsoren aufzustellen.

A. Teleutosporen unter den Epidermiszellen entstehend.

a. Teleutosporen beidseitig.

Uredosporen auf der Unterseite der Blätter.

- 1) Uredosporen  $15-20 \times 12-15 \mu$ . Teleutosporen  $26-37 \times 8-13 \mu$ .

Auf *Salix opaca* ANDERS.

= *Melampsora Larici-opaca*. MIYABE et MATSUMOTO.

b. Teleutosporen gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter.

Uredosporen gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter.

- 2) Uredosporen  $15-22 \times 12-16 \mu$ . Teleutosporen  $18-40 \times 7-11 \mu$ .

Auf *Salix Miyabeana* v. SEEM.

= *Melampsora Larici-Miyabeana*. MIYABE et MATSUMOTO.

- 3) Uredosporen  $20-27 \times 13-20 \mu$ . Teleutosporen  $19-35 \times 7-13 \mu$ .

Auf *Salix babylonica* L. = *Melampsora coleosporioides* DIET.

c. Teleutosporen auf der Unterseite der Blätter.

a. Uredosporen auf der Unterseite der Blätter.

- 4) Uredosporen  $18-25 \times 13-19 \mu$ . Teleutosporen  $20-35 \times 10-19 \mu$ .

Auf *Salix nipponica* FR. et SAV. = *Melampsora microsora* DIET.

- 5) Uredosporen  $15-20 \times 14-18 \mu$ . Teleutosporen  $20-35 \times 10-19 \mu$ .

Auf *Salix padifolia* ANDERS.

- 6) Uredosporen  $15-27 \times 13-20 \mu$ . Teleutosporen  $40-58 \times 10-15 \mu$ .

Auf *Salix Urbaniana* v. SEEM.

β. Uredosporen beidseitig.

- 7) Uredosporen  $15-20 \times 12-19 \mu$ . Teleutosporen  $13-25 \times 6-15 \mu$ .

Auf *Salix multinervis* FR. et SAV. = *Melampsora humilis* DIET.

B. Teleutosporen unter den Epidermiszellen oder auch manchmal unter der Cuticula entstehend.

a. Teleutosporen beidseitig, aber gewöhnlich auf der Oberseite der Blätter befindlich.

a. Uredosporen auf der Unterseite der Blätter

- 8) Uredosporen  $13-19 \times 11-15 \mu$ . Teleutosporen  $30-58 \times 8-13 \mu$ .  
Auf *Salix viminalis* L. = *Melampsora Larici-epitea* KLEB.
- 9) Uredosporen  $14-18 \times 11-14 \mu$ . Teleutosporen  $30-55 \times 8-14 \mu$ .  
Auf *Salix daphnoides* VILL. = *Melampsora Larici-daphnoidis* KLEB.
- C. Teleutosporen zwischen Epidermiszellen und Cuticula entstehend.
- a. Teleutosporenlager auf der Oberseite der Blätter befindlich.
- α. Uredosporenlager beidseitig, aber meistens auf der Unterseite der Blätter.
- 10) Uredosporen  $16-22 \times 13-19 \mu$ . Teleutosporen  $26-37 \times 7-12 \mu$ .  
Auf *Salix Caprea* L. = *Melampsora farinosa* (Pers) SCHROET.
- b. Teleutosporenlager manchmal beidseitig.
- α Uredosporenlager gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter
- 11) Uredosporen  $18-29 \times 12-16 \mu$ . Teleutosporen  $20-30 \times 8-12 \mu$ .  
Auf *Salix jessoensis* v. SEEM.  
= *Melampsora yezoensis*. MIYABE et MATSUMOTO.
- D. Nur Uredosporen bekannt.
- a. Uredosporenlager auf der Unterseite der Blätter.
- 12) Uredosporen  $13-20 \times 12-15 \mu$ .  
Auf *Salix sachalinensis* FR. SCHM.
- b. Uredosporenlager beidseitig, gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter befindlich.
- 13) Uredosporen  $15-22 \times 13-18 \mu$ .  
Auf *Salix Buergeriana* MIQ.
- 14) Uredosporen  $15-20 \times 11-16 \mu$ .  
Auf *Salix purpurea* L.
- 15) Uredosporen  $14-19 \times 12-15 \mu$ .  
Auf *Salix Thunbergiana* BL.

## 2. Infektionsversuche.

Um den von H. KLEBAHN angegebenen Zusammenhang nachzuweisen, habe ich in diesem Jahre mit Weidenrostpilzen Versuche angestellt, die von *Salix daphnoides* VILL., *Salix opaca* ANDERS., *Salix Miyabeana* v. SEEM., *Salix Urbaniana* v. SEEM., *Salix viminalis* L. und auch *Salix jessoensis* v. SEEM. herkommen und mit Erfolg auf *Larix europaea* DC. und *Larix leptolepis* GORD. gesät wurden.

**Versuch 1.**

Aussaatmaterial: Das Einsammeln der Teleutosporen von den *Salix*-Blättern geschieht am bequemsten im Oktober oder November; das von mir zur Verwendung gelangte Material war jedoch im Beginn des Frühjahrs gesammelt worden.

| Aussaatmaterial                    | Infizierte Pflanze            | Datum     | Erfolg  |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| 1. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | <i>Larix europaea</i> DC.     | 28. April | 12. Mai |
| 2. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 28. April | 12. Mai |
| 3. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | <i>Allium Ceba</i> L.         | 28. April | ———     |
| 4. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | <i>Ribes rubrum</i> L.        | 28. April | ———     |
| 5. <i>Salix viminalis</i> L.       | <i>Larix europaea</i> DC.     | 1. Mai    | 14. Mai |
| 6. <i>Salix viminalis</i> L.       | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 1. Mai    | 14. Mai |
| 7. <i>Salix viminalis</i> L.       | <i>Allium Ceba</i> L.         | 1. Mai    | ———     |
| 8. <i>Salix viminalis</i> L.       | <i>Ribes grossularia</i> L.   | 1. Mai    | ———     |
| 9. <i>Salix daphnoides</i> VILL.   | <i>Larix europaea</i> DC.     | 1. Mai    | 15. Mai |
| 10. <i>Salix daphnoides</i> VILL.  | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 1. Mai    | 14. Mai |
| 11. <i>Salix daphnoides</i> VILL.  | <i>Allium Ceba</i> L.         | 1. Mai    | ———     |
| 12. <i>Salix daphnoides</i> VILL.  | <i>Ribes rubrum</i> L.        | 1. Mai    | ———     |

Bei diesen Infektionsversuchen wurden die *Larix*-arten stets mühelos infiziert, im Gegensatz dazu scheinen *Allium Ceba* L. und *Ribes* immer vollständig immun zu sein.

**Versuch 2.**

Gestützt auf diese erfolgreichen Versuche vermutete ich, dass noch weitere *Melampsora*-arten mit Lärchen-*Caeomasporen* in Verbindung stehen dürften.

| Aussaatmaterial                     | Infizierte Pflanze            | Datum   | Erfolg   |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL.    | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 3. Juni | 15. Juni |
| 2. <i>Salix jessoensis</i> v. SEEM. | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 3. Juni | ———      |
| 3. <i>Salix opaca</i> ANDERS.       | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 3. Juni | 16. Juni |
| 4. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM.  | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 3. Juni | 14. Juni |
| 5. <i>Salix Urbaniana</i> v. SEEM.  | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 3. Juni | 15. Juni |
| 7. <i>Salix viminalis</i> L.        | <i>Larix leptolepis</i> GORD. | 3. Juni | 15. Juni |

Es dürfte nicht unzweckmässig erscheinen, die Art der Versuchsanstellung kurz zu beschreiben. Ich arbeitete mit Topfexemplaren von *Larix*. Die pilztra-

genden Weidenblätter wurden in Wasser eingeweicht und dann bis zum nächsten Tage in einer Petri-Schale in feuchter Luft gehalten.

Nachdem die pilztragenden Blätter sich mit einer dichten Schicht gelber Keimschläuche bedeckt hatten, wurden die Blätter auf die Lärchennadeln gelegt, sodass die abfallenden Sporidien auf diese fallen mussten. Zum Schutze wurde über die Versuchspflanze eine Glasglocke gestülpt. Nach Verlauf von 3 Tagen wurden die Glocke und die Weidenblätter entfernt. Daraufhin traten auf der Lärche zunächst Spermogonien auf, die einen süßlichen Geruch ausströmten, später zeigten sich reichlich stäubende Caeomalager.

In morphologischer Beziehung ist es sehr schwer, eine sichere Unterscheidung der Caeomaarten vorzunehmen, da sie sehr gleichförmig sind.

### Versuch 3.

Bei den Rückinfektionsversuchen erzielte ich auf Weidenblättern massenhafte Uredoentwicklung.

Aussaatmaterial: Caeoma auf *Larix leptolepis*, welche aus Teleutosporen auf *Salix Miyabeana* v. SEEM. durch Aussaat am 28. April herangezogen worden waren.

| Infizierte Pflanze                 | Datum      | Erfolg         |
|------------------------------------|------------|----------------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL.   | am 31. Mai | ———            |
| 2. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | am 31. Mai | Uredo. 7. Juni |
| 3. <i>Salix viminalis</i> L.       | am 31. Mai | ———            |
| 3. <i>Salix opaca</i> ANDERS.      | am 31. Mai | ———            |

Bei diesen Infektionsversuchen wurde *Salix Miyabeana* stets ohne Schwierigkeit infiziert; dagegen schienen *Salix viminalis* und *Salix daphnoides* immer vollkommen immun zu sein.

### Versuch 4.

Aussaatmaterial: Caeoma auf *Larix europaea*, welche aus Teleutosporen auf *Salix daphnoides* VILL. durch Aussaat am 28. April herangezogen worden waren.

| Infizierte Pflanze                 | Datum      | Erfolg          |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL.   | am 7. Juni | Uredo. 16. Juni |
| 2. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | am 7. Juni | ———             |
| 3. <i>Salix opaca</i> ANDERS.      | am 7. Juni | ———             |
| 4. <i>Salix viminalis</i> L.       | am 7. Juni | Uredo. spärlich |

Bei diesen Versuchen wurde *Salix daphnoides* stets ohne Schwierigkeit und

*Salix viminalis* spärlich infiziert, dagegen schienen *Salix Miyabeana* und *Salix opaca* immer vollkommen immun zu sein.

### Versuch 5.

Aussaatmaterial: Caeoma auf *Larix leptolepis*, welche aus Teleutosporen auf *Salix viminalis* L. durch Aussaat am 28. April herangezogen worden waren.

| Infizierte Pflanze                 | Datum      | Erfolg          |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL.   | am 7. Juni | ———             |
| 2. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | am 7. Juni | ———             |
| 3. <i>Salix viminalis</i> L.       | am 7. Juni | Uredo. 16. Juni |

In diesem Falle wurde nur *Salix viminalis* ohne Schwierigkeit infiziert, dagegen schienen *Salix daphnoides* und *Salix Miyabeana* vollkommen immun zu sein.

### Versuch 6.

Aussaatmaterial: Caeoma auf *Larix leptolepis*, welche aus Teleutosporen auf *Salix opaca* ANDERS. durch Aussaat am 28. April herangezogen worden waren.

| Infizierte Pflanze                 | Datum      | Erfolg            |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL.   | am 7. Juni | ———               |
| 2. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM. | am 7. Juni | ———               |
| 3. <i>Salix opaca</i> ANDERS.      | am 7. Juni | Uredo. 17. Juni   |
| 4. <i>Salix viminalis</i> L.       | am 7. Juni | Uredo. 16. Juni ? |

In bezug auf dieses Experiment muss ich bemerken, dass wegen Mangel an Material einige bei den vorangegangenen Experimenten immun gebliebene Pflanzen verwendet worden sind, weshalb ich nicht mit Bestimmtheit angeben kann, ob *Salix viminalis* auf jeden Fall infiziert wird oder nicht.

### Versuch 7.

Um das bei Versuch 4 angegebene Resultat noch einmal festzustellen, führte ich folgenden Infektionsversuch aus.

Aussaatmaterial: Caeomasporen auf *Larix leptolepis*, welche aus Teleutosporen auf *Salix daphnoides* VILL. durch Aussaat am 3. Juni herangezogen worden waren.

| Infizierte Pflanze               | Datum       | Erfolg         |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL. | am 25. Juni | Uredo. 5. Juli |
| 2. <i>Salix viminalis</i> L.     | am 25. Juni | ———            |

In diesem Falle wurde *Salix daphnoides* reichlich infiziert, doch blieb *Salix viminalis* gänzlich immun. Der Pilz erscheint daher als eine biologische Art, die sich von *Mel.* auf *S. viminalis* abgezweigt hat.

### Versuch 8.

Ich habe mich ohne Erfolg bemüht, mit den Lärchencaeomasporien, welche aus Teleutosporien auf *Salix Urbaniana* durch Aussaat am 3. Juni herangezogen worden waren, auf den betreffenden Weiden die Uredosporien heranzuziehen.

### Versuch 9.

Mitten in den Vorversuchen fand ich zufällig unter den Weiden im botanischen Garten zu Sapporo zahlreiche Blätter von *Corydalis ambigua*, die reichlich stäubende Pilze trugen, während diese krankhafte Erscheinung an anderen Orten, wo keine Weiden vorhanden waren, sehr selten auftrat. So lag es nahe anzunehmen, dass das Caecoma mit bestimmten Weiden in Verbindung stehen dürfte. Darauf versuchte ich, aus dem Caecoma die Uredosporien auf *Salix*-Arten heranzuziehen.

| Infizierte Pflanze                  | Datum      | Erfolg         |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| 1. <i>Salix daphnoides</i> VILL.    | am 20. Mai | ———            |
| 2. <i>Salix jessoensis</i> v. SEEM. | am 20. Mai | Uredo. 2. Juni |
| 3. <i>Salix Miyabeana</i> v. SEEM.  | am 20. Mai | ———            |
| 4. <i>Salix opaca</i> ANDERS.       | am 20. Mai | ———            |
| 5. <i>Salix viminalis</i> L.        | am 20. Mai | ———            |
| 6. <i>Salix opaca</i> ANDERS.       | am 24. Mai | ———            |
| 7. <i>Salix viminalis</i> L.        | am 24. Mai | ———            |
| 8. <i>Salix jessoensis</i> v. SEEM. | am 25. Mai | Uredo. 5. Juni |
| 9. <i>Salix viminalis</i> L.        | am 25. Mai | ———            |
| 10. <i>Salix Caprea</i> L.          | am 25. Mai | ———            |

Bei diesen Versuchen wurde *Salix jessoensis* v. SEEM. stets ohne Schwierigkeit infiziert, dagegen schienen *Salix daphnoides* VILL. und andere Arten immer

vollkommen immun zu sein.

### Versuch 10.

Nach diesem glücklichen Erfolg führte ich die Infektionsversuche noch einmal in folgender Weise durch.

| Aussaatmaterial.                               | Infizierte Pflanze       | Datum   | Erfolg   |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| Sporidien auf <i>Salix jessoensis</i> v. SEEM. | <i>Corydalis ambigua</i> | 2. Juni | 13 Juni. |

### 3. Diagnose.

#### 1. *Melampsora yezoensis* MIYABE et MATSUMOTO. sp. n. (Fig. 1.)

Caemalager auf der Unterseite der Blätter vereinzelt, oben korrespondiert mit ihnen ein gelblicher Flecken, rundlich oder annähernd polyedrisch, 2.5—5 mm; orangegelb. Caemasporen rundlich oder etwas länglich, auch oval oder polyedrisch,  $15-20 \times 12-17 \mu$ ; Membran ziemlich dick ( $1.5-2.5 \mu$ ); farblos, stachelig; Inhalt orangegelb; Keimporen nicht sichtbar.

Uredosporenlager beidseitig, meistens auf der Blattunterseite, oberseits gelblich verfärbte Flecke bildend. Anfangs vereinzelt Punkte, die schwer zu erken-




Fig. 1. *Melampsora yezoensis* sp. n. ( $\frac{230}{1}$ )

nen sind, später zahlreiche kleine, die mitunter die ganze Unterseite der Blätter bedecken; orangegelb; Durchmesser 0.3—1 mm. Uredosporen meist oval oder ellipsoidisch, auch ziemlich rundlich oder länglich,  $18-29 \times 13-17 \mu$ ; Membran farblos, ziemlich dick,  $3-10 \mu$ ; stachelig, ohne glatte Stelle; Keimporen nicht erkennbar; Inhalt orangegelb. Zwischen den Uredosporen finden sich Paraphysen mit rundem Kopf und ziemlich dünnem Stiel; Länge 40—50  $\mu$ ; Durchmesser des Kopfes 12—19  $\mu$ .

Teleutosporenlager beidseitig, meistens auf der Blattoberseite. Anfangs blassbraun, zuletzt dunkelbraun, auf der Blattfläche zerstreut oder zu Gruppen wie Rost zusammenfließend; Teleutosporen meist zylindrisch oder keilförmig, selten unregelmässig, zwischen Cuticula und Epidermiszellen eingeklemmt,  $20-30 \times 8-12 \mu$ ; Membran hellbraun, gleichmässig dünn, oben nicht stark verdickt wie *Mel.* auf *Salix Caprea* L; Inhalt orangegelb mit vielen Öltropfen. Sporidien kugelig, 7—10  $\mu$ .

## Caeoma

auf *Corydalis ambigua*

## Uredosporen und Teleutosporen

auf *Salix jessoensis* v. SEEM.

|          |                              |                |               |
|----------|------------------------------|----------------|---------------|
| I.       | Sapporo.                     | 19. Mai. 1915. | T. MATSUMOTO. |
| III.     | Inaha, (Prov. Mino.)         | Okt. 1898.     | E. TOKUBUCHI. |
| II. III. | Maruyama, (Sapporo.)         | 3. Okt. 1895.  | N. HIRATSUKA. |
| II.      | Shiraishi, (Prov. Ishikari.) | 2. Okt. 1915.  | T. MATSUMOTO. |
| II. III. | Sapporo.                     | 12. Okt. 1915. | T. MATSUMOTO. |

2. *Melampsora Larici-Miyabeana* MIYABE et MATSUMOTO. sp. n.  
(Fig. 2.)

Caeomalager auf der Unterseite der Lärchennadeln vereinzelt, oberseits gelblich verfärbte Flecke bildend, rundlich oder etwas länglich, 0.5—1,5 mm; blass orangegelb, zuletzt staubig. Vor der Bildung der Caeomalager finden sich Spermogonien, die einen merklichen Honiggeruch ausströmen. Caeomasporen oval, rundlich oder annähernd polyedrisch,  $15-22 \times 12-16 \mu$ ; stachelig; Keimporen nicht sichtbar; Inhalt gelb.

Uredosporenlager beidseitig, aber meistens auf der Unterseite der Blätter befindlich; orangegelb; staubig, mitunter die ganze Unterseite der Blätter bedeckend. Uredosporen meist oval oder etwas länglich,  $15-21 \times 12-15 \mu$ ; Membran farblos, stachelig, ohne glatte Stelle; Inhalt orangegelb; Keimporen nicht sichtbar. Zwischen den Uredolagern finden sich Paraphysen mit keulenförmigem Kopf und ziemlich dünnem und langem Stiel, Länge 50—70  $\mu$ . Durchmesser des Kopfes 15—20  $\mu$ .




Fig. 2. *Melampsora Larici-Miyabeana* sp. n. ( $\frac{230}{1}$ )

Teleutosporenlager beidseitig, aber gewöhnlich auf der Blattunterseite zerstreut oder zu Gruppen zusammenfließend. Anfangs hellbraun, später dunkelbraun. Teleutosporen keilförmig oder prismatisch; unter den Epidermiszellen entstehend,  $20-40 \times 7-10 \mu$ ; Membran hellbraun, gleichmässig dünn, oben nicht stark verdickt; Inhalt orangegelb mit vielen Öltropfen. Sporidien kugelig, 8—10  $\mu$ .

## Caeoma

auf *Larix europaea* DC. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

auf *Larix leptolepis* GORD. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

Uredo- und Teleutosporen

auf *Salix Miyabeana* v. SEEM.

II. III. Sapporo, Okt. 1899. K. MIYABE.

III. Sapporo, (Bot. Gart.) 3. Nov. 1914. T. MATSUMOTO.

II. III. Toyohira, (Sapporo.) 12. Okt. 1915. T. MATSUMOTO.

3. *Melampsora Larici-opaca* MIYABE et MATSUMOTO. sp. n. (Fig. 3.)

Caeomalager auf der Unterseite der Nadeln von *Larix*, oberseits gelblich verfärbte Flecke bildend, rundlich oder annähernd polyedrisch, sehr klein, 0,5—1,5 mm; blass orangegelb. Vor der Bildung der Caeomalager finden sich Spermogonien, die einen merklichen Honiggeruch ausströmen. Caeomasporen rundlich, oval oder annähernd polyedrisch,  $15-20 \times 12-15 \mu$ ; Membran farblos, meist ziemlich dick, fein stachelig; Inhalt orangegelb; Keimporen nicht erkennbar.

Uredosporenlager auf der Unterseite der Blätter, orangegelb, klein, 0,25—1,5 mm; auf der Blattfläche zerstreut, staubig. Uredosporen meist oval oder etwas länglich, auch rundlich,  $12-19 \times 11-15 \mu$ ; Membran farblos, stachelig,

ohne glatte Stelle; Keimporen nicht sichtbar; Inhalt orangegelb.

Zwischen den Uredosporen finden sich Paraphysen mit keulenförmigem Kopf und ziemlich dünnem Stiel, Länge 50—60  $\mu$ ; Durchmesser des Kopfes 18—22  $\mu$ , des




Fig. 3. *Melampsora Larici-opaca* sp. n. ( $\frac{230}{1}$ )

Stieles 3—4  $\mu$ .

Teleutosporenlager beidseitig. Anfangs hellbraun, später dunkelbraun; auf der Blattfläche zerstreut oder zu Gruppen zusammenfliessend; klein, 0,3—1,5 mm. Teleutosporen länglich oder keilförmig, von der Epidermis bedeckt,  $26-37 \times 8-13 \mu$ ; Membran hellbraun, gleichmässig dünn, oben nicht stark verdickt; Inhalt orangegelb, mit vielen Öltropfen.

Caeoma

auf *Larix europaea* DC. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

*Larix leptolepis* GORD. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

## Uredo- und Teleutosporen\*


auf *Salix opaca* ANDERS.

- II. Sapporo, 29. Juli. 1895. N. HIRATSUKA.  
 II. III. Sapporo, (Bot. Gart.) 15. Okt. 1914. T. MATSUMOTO.  
 II. Toyohira (Sapporo.) 10. Okt. 1915. T. MATSUMOTO.

4. *Melampsora Larici-epitea* KLEB. (Fig. 4.)

Caeomalager auf der Blattunterseite der Lärchennadeln vereinzelt, oben korrespondiert mit ihnen ein gelblicher Flecken, rundlich oder länglich, blass orange-gelb. Vor der Bildung der Caeomalager finden sich Spermogonien, die einen merklichen süßlichen Geruch ausströmen. Caeomasporen rundlich, oval oder annähernd polyedrisch,  $13-21 \times 12-17 \mu$ ; Membran farblos, stachelig, meist ziemlich dick,  $1,5-3 \mu$ ; Keimporen nicht sichtbar.

Uredolager auf der Blattunterseite zerstreut, mitunter die ganze Unterseite der Blätter bedeckend, orangegelb, oberseits gelblich verfärbte Flecke bildend, Durchmesser  $0,3-1 \text{ mm}$ . Uredosporen meist rund oder etwas länglich,  $13-18 \times 11-15 \mu$ ; Membran farblos, stachelig, ohne glatte Stelle; Keimporen nicht erkennbar; Inhalt orangegelb. Zwischen den Uredosporen finden sich Paraphysen mit rundem Kopf und ziemlich dünnem Stiel, Länge  $40-50 \mu$ ; Durchmesser des Kopfes  $12-18 \mu$ , des Stieles  $3-4 \mu$ .

Fig. 4. *Melampsora Larici-epitea* Kleb. ( $\frac{230}{1}$ )

Teleutosporenlager beidseitig, meistens auf der Blattoberseite. Anfangs blassbraun, auf der Blattfläche vereinzelt oder zu Gruppen zusammenfließend,  $0,3-1,5 \text{ mm}$ . Teleutosporen meist keilförmig oder prismatisch, selten unregelmässig, unter der Epidermis oder manchmal zwischen Cuticula und Epidermiszellen eingeklemmt,  $30-58 \times 8-13 \mu$ ; Membran hellbraun, gleichmässig dünn, oben nicht stark verdickt; Inhalt orangegelb mit vielen Öltropfen. Sporidien kugelig,  $8-10 \mu$ .

## Caeoma

auf *Larix europaea* DC. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

*Larix leptolepis* GORD. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

## Uredo- und Teleutosporen

auf *Salix viminalis* L.

|          |                          |                 |               |
|----------|--------------------------|-----------------|---------------|
| III.     | Sapporo.                 | 8. April, 1896. | N. HIRATSUKA. |
| II. III. | Shiraishi. (bei Sapporo) | 9. Okt, 1915.   | T. MATSUMOTO. |
| III.     | Sapporo.                 | 2. Nov, 1914.   | T. MATSUMOTO. |

5. *Melampsora Larici-daphnoidis* KLEB. (Fig. 5.)

Der Rostpilz, der diese Weidenkrankheit verursacht, erscheint, wie schon bemerkt, als eine biologische Art, die sich von *Mel. Larici-epitea* KLEB. abgezweigt und nach einer bestimmten Richtung hin weiter entwickelt hat. In mor-




Fig. 5. *Melampsora Larici-daphnoidis* Kleb. ( $\frac{230}{1}$ )

phologischer Beziehung besteht daher fast vollständige Übereinstimmung mit der vorgenannten Art. Die auf *Salix daphnoides* aufgefundenene *Melampsora* brachte beim Ausaatversuche auf *Lalix leptoleps* Caeoma hervor. Bei den Rückinfektionsversuchen wurde *Salix daphnoides* schnell und reichlich, aber *Salix viminalis* spärlich infiziert, es kam jedoch auch manchmal vor, dass die letzteren immun blieben. Aus diesem Verhalten wurde geschlossen, dass die vorliegende *Melampsora* von *Melampsora* auf *Salix viminalis* L. verschieden sei.

## Caeoma

auf *Larix europaea* DC. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

*Larix leptolepis* GORD. (Diente zu erfolgreichen Infektionsversuchen.)

## Uredo— und Teleutosporen

auf *Salix daphnoides* VILL.**Zusammenfassung.**

Die vorliegende Arbeit befasst sich nur mit einzelnen *Melampsora*arten, weitere Studien werden jedoch später noch vorgenommen werden. Leider habe ich mich ohne Erfolg bemüht, mit den Lärchencaeomasporen auf *Salix Urbaniana* die Uredosporen heranzuziehen, aus diesem Grunde sehe ich mich verhindert, den diese Krankheit auf *Salix Urbaniana* erregenden Pilz als eine neue Art zu ver-

öffentlichen. Aber das Caeoma unterscheidet sich von dem der vorgenannten Arten dadurch, dass die Sporen merklich grösser sind. ( $15-24 \times 13-19 \mu$ .) Es erscheint daher ziemlich sicher zu sein, dass sie zu ihrer vollständigen Entwicklung der Lärchenblätter bedürfen.

Ferner glaube ich, dass ein Zusammenhang zwischen *Melampsora* auf *Populus*-arten und Caeomasporen auf *Chelidonium majus* L. besteht. Leider konnte ich in diesem Frühjahr nicht genügend Versuchsmaterialien sammeln. Diese Frage bleibt daher noch offen.

Weiter nehme ich an, dass die Erkrankung der *Salix Caprea* L. in Japan durch den gleichen Rostpilz hervorgerufen wird, den H. KLEBAHN als *Melampsora Larici-Capraearum* bezeichnet hat. Ich werde daher im nächsten Jahre in dieser Beziehung weitere Versuche anstellen und auch *Melampsora* auf *Salix babylonica* L., welche in Japan mit einer Art vertreten ist, sowie *Melampsora* auf *Salix purpurea* und weitem Weidenarten in den Kreis der biologischen Untersuchungen ziehen.

**Literatur.**

- P. DIETEL. Uredineae japonicae. Engler's Bot. Jahrb. 32. Band. 1 Heft. 1902.  
ED. FISCHER. Die Uredineae der Schweiz. 1904.  
W. B. GROVE. The British Rust Fungi. 1913.  
N. HIRATSUKA. On Melampsora. 1896.  
H. KLEBAHN. Die wirtwechselnden Rostpilze. 1904.  
„ „ Zeitschr. f. Pflanzenkr. 4.-5.-6.-8.-9 Bd.  
E. ROSTRUP. Plantepatologi. 1902.  
P. A. SACCARDO. Sylloge Fungorum. VII. IX. XI. XIV. XVII.  
G. WINTER. Die Pilze. 1 Abt. 1884.

Okt. 1915

Botanisches Institut der landwirtschaftlichen Fakultät  
der Kaiserlichen Universität  
zu Sapporo.

---

## 摘 要

本報文は本邦柳類の葉上に銹病を起す、メランブソラ屬に關する接種試験の結果を報告せるものなり。

元來該菌は世代交番を營むものにして、極僅少の種類を除きては、概ね植物分類學上甚だしく其の系統を異にする植物上に其の銹胞子の時代を經過するものなれば其の生態的考察も亦頗る困難にして、從て其の研究の發達も實に最近の事に屬す。

余はクレバーン氏の實驗に倣ひ、今春融雪を待て地上に越冬せるキヌヤナギ、エゾカハヤナギ、シロヤナギ、ナガバヤナギ、エゾヤナギ、及びオホバヤナギの各六種の葉上に發見せられたる冬胞子を接種材料に供して、下記各種植物の葉上に接種試験を行ひたり。

1. カラマツ 2. ドイツカラマツ 3. タマネギ 4. グースベリー及びカラント、

然るに旬日後、唯シロヤナギより蒔かれたるものを除きて、他は悉く落葉松葉上に橙黄色の銹子器を形成せり。更に余は此等銹胞子を逆に各柳葉上に接種せる結果、縦へ其の外部形態に於ては相互頗る相近似するものありと雖も、既に此等の間には判然たる分化現象存在せるものにして、各個凡て全く別種に屬す可きものなる事を確知せり。仍て余は精細なる調査に依り、キヌヤナギ及びエゾヤナギのものは既にクレバーン氏の發表せるものと大体に於て相一致すれども、ナガバヤナギ及びエゾノカハヤナギ上の二種は未だ全く先人の發表せざるものなる事を確めたり。

折しも該實驗に前後して、偶々余は當大學附屬植物園の柳樹の下に野生せるエゾノエンゴサクの葉上に夥甚の銹子器を發見したり。然るに此地を遠ざかるに従ひ、漸次被害葉の数は減じ、既に或場所に於ては縦へ該草の存在せるにも不拘、この病葉を認むる事能はざりき。されば余は必ずや該菌は或柳樹の銹菌と關係ある可きを推斷し、直に下記五種の柳類に接種試験を試みたり。

1. キヌヤナギ 2. エゾカハヤナギ 3. エゾヤナギ 4. ナガバヤナギ  
4. シロヤナギ

然るに旬日ならずして、シロヤナギ葉上には著しく夏孢子現はれたるも他は全く不感に終れり。

上述の實驗結果を概括せば、

1. *Melampsora yezoensis* MIYABE et MATSUMOTO sp. n.  
I.....エゾノエンゴサク II. III.....シロヤナギ
2. *Melampsora Larici-Miyabeana* MIYABE et MATSUMOTO sp. n.  
I.....カラマツ II. III.....エゾカハヤナギ
3. *Melampsora Larici-opaca* MIYABE et MATSUMOTO sp. n.  
I.....カラマツ II. III.....ナガバヤナギ
4. *Melampsora Larici-epitea* KLEB.  
I.....カラマツ II. III.....キヌヤナギ
5. *Melampsora Larici-daphnoidis* KLEB.  
I.....カラマツ II. III.....エゾヤナギ

以上の外、尙オホバヤナギは逆接種試験に於て十分なる結果を得ざりしため、本報文に於て此を發表する事能はざるも、既に落葉松上に其の銹孢子を生じたる事と、及び其の胞子の他に比して著しく大なる事とに依り、確に落葉松は該菌の中間宿主たる事を推認す。されば來春再び融雪を待て、バツコヤナギ、コリヤナギ、シダレヤナギ及び白楊屬の銹菌と共に、併せて接種試験を行ひ、他日改めて更に發表せん事を期す。

終に臨み、余は謹んで宮部教授の懇篤なる御指導に對し感謝の意を表す。

# アイヌの古代風俗の研究に就て

河 野 常 吉

---

## ON THE METHOD OF RESEARCHES ON THE ANCIENT CUSTOMS OF THE AINO.

TSUNEKICHI KŌNO.

---

何れの人種に對しても其過去の風俗を調査せんとするに當りては、第一其現代の風俗を視察し、第二現代人の語る所を聞取ること固より必要なりと雖も、之に據りて輕々古代を推測論斷せんとするは極めて危険なることなり。何となれば風俗は長き間には著しく變化するものにして其變化は到底現代人の能く知悉し得る所にあらざればなり。試に現に中等教育を受けつゝある我が子弟に向つて我が父の時代の風俗を問はば如何、明瞭に答へ得る者幾人かある、其間相距る僅に數十年に過ぎずと雖も士族の佩刀は全く廢せられ、頭髮の貌は婦女の一部分を除くの外は毫も舊態を留めず、帽子は新に西洋のものを模倣し、衣服にも袴の廢するあり洋服の加はるあり、履物にも雪駄廢れ洋靴行はれし等變化少なからず。其他冠婚葬祭より年中行事に至るまで皆多少の變化を見ざるなし、子弟の之を知悉せざるは當然と謂ふべし。況んや五百年の昔をや、況んや千年以前の昔をや。幸に専門學者等の攻究によりて或る程度までは之を知るを得ると雖も古代の風俗の如き尙明瞭ならざるもの甚だ多し。學者にあらざる普通人に至りては殆んど全く之を知らずといふも可なり。文明の域にある我等が我等の祖先に對してすら斯くの如し。然るに今他の未開人種に向つて其古代の風俗を知らんとす、其困雜推して知るべきにあらずや。予は今北海道にあるを以て茲にアイヌの古代風俗の研究に就きて聊か述る所あらんとす。

今日アイヌの風俗を研究する人に二種あり、(甲)は學術的に研究せんとする人、(乙)は一時の物好きに之を爲す人にして何れもアイヌの固有風俗を知る

に苦心せり。然かもアイヌの風俗の變化したることは大和人種の風俗の變化したるに比すべし。而してアイヌには文字なく記録なきを以て其過去を知ること極めて困難なるのみならず、遺跡遺物の調査も未だ十分ならざれば新に之を爲こと容易ならず、是に於て多くの研究者は現代の風俗を視察し現代アイヌの語る所を聞き、之に手に入り易き數種の書籍を參考して研究し、其得る所を以てアイヌの固有風俗の如く考へ、終には之を以て古代の風俗をも論斷せんとするの傾を生ぜり。一時物好きに調査する人は之を措き、學術的に研究する人にして尙往々此弊を免れざるものあり。彼の無稽なるコロボツクル説の一時勢力を得て世を風靡したる如きも全く之が爲めなり。

アイヌの固有風俗といふ言葉は屢々聞く所なれども、此語の意義は甚だ漠然たるものなり。多くの人は近年他人種の感化によりて變化したる風俗の外は之を固有の風俗と云ひて、祖先より傳來して渝らざる風俗なりと考ふるものゝ如くなれども、アイヌは其前に於ても他人種の感化により若しくは其他種々の事情によりて風俗を變化したることあるや疑なし。されば固有の風俗と信じたるものゝ内にも固有の風俗にあらざるもの亦必ず少なからざるべし。予は普通にいふ固有風俗なる語の甚だ好ましからざるを信ずるものなり。今左に二三の例を擧げて古代風俗の研究の容易ならざる一斑を證せんとす。

(第一例) アイヌの髮容 アイヌは現時散髮なるのみならず其語る所に據れば昔時も結髮したることなし。本年四月の人類學雜誌にアイヌ通なる吉田巖君が「男女とも大昔から被髮で頭上に結ぶ事は無かつた」と書かれしも尤なり。予は先年此事につきて調査したる事ありしに、秦檜丸(即ち村上島之丞)の蝦夷島奇觀に寛政十年今の渡島國上磯郡當別村より掘出したる土偶の圖を掲げ之に解説を加へたり、其解説中に曰く、

蝦夷子なければ神に祈りて子を生ずれば、生長の後髪を切らず、三組にし垂れ置ぬ、名てカモイヲドヒといふ、ムカワ夷ホインカル、クヌイ夷ベ、レケレ神髪なり、此外所々にあり。按るに是太古の容と思はる、上古斷裁の器なきときは亂垂となるを厭ひ三ツ組にせしなるべし。

由是觀之、百年前までは神に祈りて生れし者は生長の後髪を結びし習慣ありしこと明かなり。さればアイヌに古來全く結髪の例なしと謂ふこと能はざるべし、尙其以前に溯らば如何。日本書紀景行天皇の條には男女推結文身、爲人勇悍、是總曰蝦夷とあり、推結の二字は「かみをあげ」とも「かみをかうぶり」とも讀ませて判然せざれども、「かみをあげ」といふときは結髪なり。兎に角古代の髪容は輕々斷言すること能はざるべし。

本年六月の人類學雜誌に、鹽田弓吉君は、上川より出たる一土偶が結髪せる事を記されて予は面白く拜見せり。其土偶の製作者がアイヌなりや他の人種なりやは尙研究の上にあらざれば知る事能はずと雖も、其研究上にもアイヌが古昔結髪したる例ありしや否やと云ふことが一の必要資料たり。しかも其髪容は遺憾ながら未だ明瞭ならざるなり。

(第二例) アイヌの入墨 アイヌの入墨は現今婦女の口邊と手とに限ると雖も過去も然るべしと思ふべからず。昔時は稀に頬にも入墨したるものあることは天明八年古河辰の東遊雜記によりて知るべし。尙男子も入墨したる例あり、文化五年著述の渡島筆記には、「氣をたのむもの自ら其額に黥す」と記せり。又明治二十二三年頃北海道廳屬永田方正氏の調査によれば、厚岸アイヌ太田紋助曰く

男が手に入墨するは弓を射て熊に中る爲なり、幣を建て神に祈り右手に  
 (弓矢)を入墨す。

石狩アイヌ琴似又一郎曰く

男子は右手にのみ入墨す、是弓矢に巧ならんが爲なり。

小樽土人は唇傍に入墨せしもの多くありし、是は能辨を欲する爲に入墨せしと聞く。

右等の例を見れば昔時は種々の入墨をなせしことあるを知るべし。尙一層古代に溯らば如何、日本書紀に文身とあるを見れば男子も一般に文身せしやも知るべからず。

(第三例) 入墨に使用せし刃物 入墨の事を言ひたれば、序てに入墨に使

用せし刃物に就いて言はんに、其刃物<sup>マキ</sup>は現今小刀若しくは剃刀を用ふと雖も、彼等が斯かる金屬製の利器を得る能はざりし古代は如何、今日のアイヌ（北千島アイヌを除く）は皆其祖先が石器を使用せしことなしを斷言しつゝあり。されど蝦夷島奇觀には

ネモロ酋長シヨンコ云、古此島に刀子なき頃は石を碎き其利き片々を刃物となして用ひしとなん。一種アジ<sup>○黒曜石</sup>といふ黒玉石あり、利き事刃の如し、鐵石にもあり。今も深山に住む夷は石刀を用ひて切斷の器とせり。とあり、其他諸方面よりの研究によれば往古は石製の刃物を使用せしこと殆んど疑なきものゝ如し。而して近年ジョンバチエラー氏が十勝に於て入墨を指してアンチピリ（黒曜石の疵の義）と云ひし古語の残り居るを發見せられたるにより、昔時黒曜石の破片を以て傷つけて入墨したること最も明瞭なるに至れり。

（第四例） アイヌの衣服 アイヌの衣服の内其人種の自ら製作せしものにして今日着用するはアツシなりと雖も、昔時は多く獸皮を用ひたり、日本書紀に衣<sup>イ</sup>毛と云ふは即ち是なり。其他昔時の衣服の中には蕁麻<sup>イラクサ</sup>（蝦夷語アイ及びモーセの二種あり）の纖維にて織りたるイタラツペあり。鳥皮にて作りたるラブリあり。魚皮にて作りたるアクミあり、草にて作りたるケラあり、此等是一部のアイヌが製作して使用したるに過ぎざるべしと雖も兎に角彼等の衣服たりしものなり。然かも今日之を知る人甚だ多からず。而してアツシを發明して使用せし年代は全く不明に屬せり。

アイヌの古代の衣服に裳ありしや否や、之を調査せしが不明なり。<sup>ユウカラ</sup>古謡を見ればホシとて脚半の如きものを着けたることあるは明かなるも、裳を用ひし證跡は予未だ之を見ず。或る蝦夷風俗圖（書名を記せず）にエリモクルと云ふ軍師の容貌を描きたるに下肢に袴の如きものを穿ち居り、圖解には「頭巾は竹<sup>コンジ</sup>にて編み葡萄皮を毛となし<sup>アイヨツヘ</sup>鎧は竹にて細繩を以てつなぐと云ふ、其上に着たるはホクユクウル<sup>○熊皮衣</sup>と申して熊の皮なり」など記しありたり。蝦夷の風俗を知りし人の書きしものゝ如く思はるゝと雖も、單に之に據りて袴の如きものを着用せりとまでは信ずる能はず。尙ほ研究を要すべきものなり。

以上は數例を挙げしに過ぎずと雖も、亦以てアイヌの古代風俗の調査の困難なる一斑を察するに足らん。若し輕々調査して論斷せん歟、必ず錯誤を生ずべし。依て更に調査上注意すべき件々を記して参考に供せん。


(一) 今日普通のアイヌに就きて過去の風俗を調査せば必ず誤りを生ずる恐あり。正直にして物識りたる老アイヌに就いて膽長に聞取るべし。

(二) アイヌも地方によりて多少風俗を異にし、口碑も亦同じからざるものあれば、成るべく廣く各地を調査するを要す。

(三) アイヌ語を學ばば調査上甚だ便利なるべし。予が如きはアイヌ語の素養なきを以て常に不便を感じつゝあるものなり。

(四) アイヌには文字なく、其記録は皆他人種殊に大和人種の手に成りしものにて、其内には今日アイヌの知らざる有益の記事少なからざれば、普く之を調査すること肝要なり。有りふれたる數種の書籍を讀みしのみにて安心すること勿れ。

(五) 遺跡遺物を成るべく廣く調査すべし。遺物を掘る場合の如き、自ら鍬を取らば遺物を比較的完全に獲ると共に、其存在の状態を知るを得て大に裨益する所あらん。



# はこべの酵素に就て

農學士 田所哲太郎

農學士 有泉方松

---

## ON THE ENZYMES OF STELLARIA MEDIA.

TETSUTARO TADOKORO

and

MICHIMATSU ARIIDZUMI.

---

### 緒 言

はこべ (*Stellaria media* (L.) Vill.) は石竹科 (Caryophyllaceae) に屬する倭草にして好んで弱き光線及び適度の濕氣を有する土地に生ず其用途殆ど知られざるも時としては人畜の食料とせられ又屢々鳥類の食料に供せらる。其用途尠きの故を以てか從來之に關する研究多からず只ウオルフ氏の其灰分に對する報告を有するに過ぎず。其成分は殆ど一般の他の生草と異ならざる可きも之を鳥類の食料と爲す事屢々なるは畢竟新鮮なるものを得易きに因るものゝ如し。即はこべは其一代を經過するに僅に二乃至三箇月を要するに過ぎざれば其幼植物を採るに便利にして且本州地方に於ては凍結せる儘越冬し早春枝條を繁茂するものなればなり。

植物体中に種々の酵素の存在するは明かなる事實にして従て植物体を生食する時は此等酵素中の或者は適當なる事情の下に其作用を現はすに至る可し。故に若し植物体中に蛋白質、脂肪或は炭水化物等を分解する酵素存在する時は此を生食すれば其等の酵素中或者は其働を逞うして動物の消化作用を助成す可し。生草に關して此種酵素の研究を行ひたる者數ふるに暇有らず然れどもはこべに就ては未だ斯の如き研究有りしを聞かず此れ余等の此研究を企圖せし所以に外ならず。

はこべの中に含有せらるゝ酵素に就ては消化作用に關係を有するものゝ外

尙數種の酵素に就ても其作用の強弱を測定し得たるを以て併せて其結果を次に述んと欲す。

### 供試酵素溶液の調製

新鮮なるはこべ五〇〇瓦を乳鉢内に磨碎し水を加へて全量を二〇〇〇珎となしトルオール一〇珎を加へて二四時間放置して後壓搾濾過し濾液を尙一回濾紙を以て濾過し之を供試液となしたり。

### 酵素の試験

#### 一、エレプシン (Erepsin)

此酵素は ペプトン、アルブモージェ等を分解してアミノ酸を生ずるも眞正蛋白質を分解せざるものなり。故に此酵素の存否を決定せんとせばペプトン溶液に酵素液を作用せしめ其ペプトンを溶解する量を測定するものなるが次の試験を行ひて之を比較對照せり、

- a. 酵素液 二〇珎及二％ペプトン溶液二〇珎
- b. 煮沸酵素液二〇珎及二％ペプトン溶液二〇珎
- c. 酵素液 二〇珎及水 二〇珎

各混合物にトルオール一珎を加ふ（煮沸酵素液は酵素液を沸湯中に一〇分間浸漬して後之を取り出して冷却したるものなり）

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事四八時間にして之を取り出し少量の醋酸及食鹽を加へ煮沸して濾過し濾紙上の沈澱は濾紙と共にケルダール氏法によりて其全窒素含量を測定し之を凝固性窒素として示し又濾液を一〇〇珎に充たし其二五珎を取り之に硫酸を加へて五％に達せしめ二五％の磷ウオルフラム酸液五珎を加へて生ずる沈澱を二四時間放置して後濾過し沈澱は五％の硫酸を以て洗ひ濾紙と共にケルダール氏法によりて其全窒素含量を測定す。次に磷ウオルフラム酸沈澱を濾別して得たる濾液にバリタの適量を加へて過剰の磷ウオルフラム酸を沈澱せしめ濾過して其濾液を取りケルダール氏法によりて其窒素含量を測定して此等を原液中の量に改算したるに其結果次の如し。

| 窒素の種類         | 窒素含量 (觔) |      |      |
|---------------|----------|------|------|
|               | a        | b    | c    |
| 凝固性窒素         | 2.8      | 2.8  | 2.4  |
| 濾液中の窒素        | 61.0     | 60.4 | 17.8 |
| 燐ウオルフラム酸沈澱の窒素 | 45.3     | 48.0 | 9.6  |
| 燐ウオルフラム酸濾液の窒素 | 15.7     | 12.4 | 8.2  |

燐ウオルフラム酸によりて沈澱せられざる形に變じたる窒素の量を濾液中の窒素の量に比較し百分率を以て之を示せば

a 26.6%, b 20.5% にして其差 6.1% なり

以上の結果を見るに酵素の作用を受けてアミノ酸に變じたるペプトンの量少なきを以てエレプシンの作用は微弱なりと云ふ可し。

## 二、リパーゼ (Lipase)

トラカントゴムの1%水溶液一〇〇觔にリチネ油三觔を加へて充分に振盪し之に酵素を作用せしめリチネ油の分解によりて生ずる酸をアルカリ液を以て滴定したるが其試験は次の如くに行へり

- 酵素液 二五觔及リチネ油エムルジオン二五觔
- 煮沸酵素液二五觔及リチネ油エムルジオン二五觔
- 酵素液 二五觔及水 二五觔

各混合物にトルオール一觔を加ふ

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事四八時間にして之を取り出し各に九五%の酒精五〇觔及エーテル五觔を加へフェノールフタレインを指示薬として一〇分一規定苛性曹達液を以て滴定せり其結果次の如し。

|                                             | a     | b     | c     |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 中和に要せし <sup>1</sup> / <sub>10</sub> 規定液 (觔) | 10.8  | 8.9   | 6.5   |
| オレイン酸としての量 (觔)                              | 304.1 | 250.6 | 183.0 |

よりて a と b との差は一、九毫なり之をオレイン酸として示せば五三、五毫の酸を生したる事となる故にリパーゼの存在を證明するに足る可し。

### 三、アミラーゼ (Amylase)

澱粉糊に酵素を作用せしめ生ずる還元糖を定量して之を試験する事通常の法に従へり即次の如し

- a. 酵素液 二五毫及二%澱粉溶液二五毫
- b. 煮沸酵素液二五毫及二%澱粉溶液二五毫
- c. 酵素液 二五毫及水 二五毫

各混合物にトルオール一毫を加ふ

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事四八時間にして之を取り出し食鹽及醋酸少量を加へて煮沸し濾過し濾液を炭酸曹達を以て中和し全量を一〇〇毫となし其二〇毫を取りてベルトラン氏法により還元糖を定量せり其結果次の如し。

|                  | a     | b    | c    |
|------------------|-------|------|------|
| 還元糖 (葡萄糖として) (毫) | 28.6  | 2.2  | 2.6  |
| 同上一〇〇毫中の量 (毫)    | 143.2 | 11.1 | 12.9 |

上の結果より a と b との差は  $143.2 - 11.1 = 132.1$ , 即一三二、一毫の差を生じたるを見る此れ明にアミラーゼの存在を示すものなり。

### 四、ウレアーゼ (Urease)

尿素の溶液に酵素を作用せしめ此處に生したるアンモニヤを定量したるが其方法次の如し

- a. 酵素液 二五毫及一%尿素溶液二五毫
- b. 煮沸酵素液二五毫及一%尿素溶液二五毫
- c. 酵素液 二五毫及水 二五毫

各混合物にトルオール一毫を加ふ

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事四八時間にして之を取り出し適量の鹽酸を加へて其作用を止め置き次に苛性曹達を加へて殆ど中和するに至らしめ之に酸化マグネシウムを加へてアルカリ性を呈するに至らしめ發生するアンモニヤを一〇分一規定硫酸液一定量中に蒸餾して後一〇分一規定苛性曹達液を以て過剰の酸を滴定し尿素の分解によりて生じたるアンモニヤの量を測定したり、其結果次の如し

|                   | a    | b   | c   |
|-------------------|------|-----|-----|
| 硫酸液に相當する窒素の量 (匁)  | 8.9  | 7.8 | 5.1 |
| 窒素に相當するアンモニヤの量(匁) | 12.0 | 9.5 | 6.2 |

上記の結果より a 及 b 間に於けるアンモニヤの量の差は二、五匁なるを見る故にウレアーゼの作用は微弱なりと云を得可し。

### 五、エムルシン (Emulsin)

アミグダリン溶液に酵素を作用せしめ其分解によりて生ずるベンザルデヒード及びシヤン化水素を検出し且生ずる還元糖を定量して試験する事次の如し

- 酵素液 二五匁及二%アミグダリン溶液二五匁
- 煮沸酵素液二五匁及二%アミグダリン溶液二五匁
- 酵素液 二五匁及水 二五匁

各混合物にトルオール一匁を加ふ

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事四八時間にして之を取り出し生じたるベンザルデヒードは其臭によりて之を検し、又シヤン化水素は混合液の一小部を取り苛性曹達を加へ次に少量の硫酸第一鐵を加へて煮沸し鹽酸を加へて酸性となし一滴の鹽化第二鐵液を加へベルリン青の成否によりて之を検出し、又還元糖の定量には液の半量を取り之に少量の食鹽及醋酸を加へて煮沸し濾過し其濾液に炭酸曹達を加へて中和し水を加へて一〇〇匁となし其中二〇匁を取りてベルトラン氏法により還元糖を定量し後之を原液中の量に改算したり其等の結果を總括するに次の如し

|                | a     | b  | c  |
|----------------|-------|----|----|
| ベンザルテヒードの反應    | 正     | 負  | 負  |
| シヤン化水素の反應      | 正     | 負  | 負  |
| 還元糖（葡萄糖として）（糖） | 130.5 | 微量 | 微量 |

上の結果を見るに強力なるエムルシンの存在明なりとす。

#### 六、植物性キマーゼ (Plant Chymase)

植物性キマーゼがカゼインに對する作用は動物性キマーゼに類せるが故に  
此名在る所にして乳汁に酵素液を作用せしめ其凝固反應を觀察したり其方法次の如し

- 煮沸酸素液四珄、牛乳二〇珄及五%鹽化カルシウム二珄
- 酵素液 四珄、牛乳二〇珄及五%鹽化カルシウム二珄
- 酵素液 四珄、牛乳二〇珄及水 二珄
- 水 六珄、及牛乳二〇珄

上記試験液を四〇度の定溫器中に置く事六時間にして凝固せる部分を濾別し水洗し濾紙の儘ケルダール氏法により窒素含量を測定したるが其結果次の如し

|         | a   | b    | c    | d   |
|---------|-----|------|------|-----|
| 窒素含量（糖） | 6.1 | 43.3 | 10.2 | 3.4 |

上の結果を見るに酵素液のみにては牛乳を凝固せしむる作用比較的少なきも之に鹽化カルシウムを加ふる時は其作用著しく増加するを見たり而して其凝固の起るは鹽化カルシウムに因るものならざるは單に牛乳に鹽化カルシウムを加ふるも凝固せざるによりて識別せらる、尙酵素液の濃度と凝固に要する時間との關係を試験したるに次の如し

酵素液に水を加へて種々に稀釋し之を以て前記bに於けるものと同様の試験液を作り尙トルオール一滴を加へて定溫器中に置いて凝固の初まる時間を測

定するに大略次の如き成績を得たり。

| 酵素液の濃度   | 凝固初まる迄に経過せし時間 |
|----------|---------------|
| 原液の 25 倍 | 12 時間         |
| „ 50 „   | 18 „          |
| „ 100 „  | 24 „          |
| „ 200 „  | 32 „          |
| „ 2000 „ | 48 „          |

#### 七、ペルオキシダーゼ (Peroxydase)

過酸化水素の存在に於てピロガロールの水溶液に酵素を作用せしめ此處に生ずるブルプロガリンを秤量して酵素の作用を試験したるが其方法次の如し。

- 酵素液 二〇珎、二％ピロガロール溶液二〇珎及〇、五％過酸化水素二〇珎
- 煮沸酵素液二〇珎、二％ピロガロール溶液二〇珎及〇、五％過酸化水素二〇珎
- 酵素液 二〇珎、二％ピロガロール溶液二〇珎及水 二〇珎

以上の混合物に各トルオール一珎を加ふ

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事二四時間にして此處に生ずるブルプロガリンの沈澱を豫め秤量し置きたる濾紙上に集め之を乾燥秤量したり其結果次の如し

|               | a     | b   | c   |
|---------------|-------|-----|-----|
| ブルプロガリンの量 (珎) | 100.7 | 1.9 | 1.1 |

此結果を見るに a と b との差は  $100.7 - 1.9 = 98.8$ , 即八九、八珎にして明にペルオキシダーゼの存在を示せり。

#### 八、オキシダーゼ (Oxydase)

オキシダーゼの試験法はペルオキシダーゼに於けると殆同様に於て唯試験溶液に過酸化水素を加へざるを異とするのみなり即次の如し

- 酵素液 一〇珎及二％ピロガロール溶液二〇珎

b. 煮沸酵素液一〇銑及二％ピロガロール溶液二〇銑

c. 酵素液 一〇銑及水 二〇銑

各混合物にトルオール一銑を加ふ

上記試験液を四〇度の定温器中に置く事二四時間の後此處に生じたるブルプロガリンを前同様に秤量したり其結果次の如し

|               | a    | b   | c   |
|---------------|------|-----|-----|
| ブルプロガリンの量 (銑) | 14.9 | 4.0 | 1.2 |

此結果を見るに a と b との差は僅かに一〇、九銑に過ぎず故にオキシダーゼの作用は極めて微弱なるを知る可きなり。

#### 九、カタラーゼ (Katalase)

カタラーゼは過酸化水素に作用して酸素を發生するものなるが故に之を試験するには先づ過酸化水素溶液に酵素を作用せしめて後之を過マンガン酸加里液を以て滴定し酵素を作用せしめざる時の過マンガン酸加里液の用量を比較するか或は過酸化水素溶液に酵素を作用せしめて其際游離する酸素の容量を測定するものなり、今最初の試験結果を掲ぐれば次の如し

a. 酵素液 一〇銑及〇、五％過酸化水素溶液三〇銑

b. 煮沸酵素液一〇銑及〇、五％過酸化水素溶液三〇銑

c. 酵素液 一〇銑及水 三〇銑

上記各混合物を室温に放置する事三時間に於て之を一〇分一規定過マンガン酸加里液を以て滴定したり

|                                | a     | b     | c    |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| $\frac{1}{10}$ N過マンガン酸加里液の量(銑) | 18.89 | 19.37 | 1.17 |

此を以てカタラーゼの作用著しからざるを知る、尙他の試験を行ひたるが其方法次の如し

a. 酵素液 一〇銑及〇、五％過酸化水素二〇銑

b. 煮沸酵素液一〇珩及〇、五%過酸化水素二〇珩

c. 酵素液 一〇珩及水 二〇珩

上記各混合物を水を充たしたるユチオメーターに連結し四〇度の定温器中に置く事四時間、其間に發生したる酸素の容量を時々觀測したり其結果次の如し

| 試 験 液 | 發 生 し た る 酸 素 の 容 積 (珩) |         |         |         |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|
|       | 一 時 間 後                 | 二 時 間 後 | 三 時 間 後 | 四 時 間 後 |
| a.    | 1.4                     | 4.8     | 6.9     | 9.3     |
| b.    | 0.1                     | 0.1     | 0.1     | 0.1     |
| c.    | 0.1                     | 0.1     | 0.1     | 0.1     |

此結果を見るにカタラーゼの作用は著しからざる事前試験に於て認めたと同様なり。

## 摘 要

はこべを磨碎して水を以て浸出したる浸出液中に含有せられたる酵素に就き試験を行ひたり其結果次の如し

- 一、ウレアーゼ、オキシダーゼ及カタラーゼの作用は極めて微弱なり
- 二、エレブシン及リバーゼの作用は著しからず
- 三、アミラーゼ、エムルシン、植物性キマーゼ及ペルオキシダーゼの作用は強大なり

# 白血球の喰脂現象に就て

里 正 義

## ÜBER DIE FETT-PHAGOZYTOSEN DER LEUKOZYTEN

VON

MASAYOSHI SATO

1837 年 Donne 氏の婦人乳に於て一小體を認め Henle 氏の之を初乳球と命名して以來其の起原並びに生理學的意義に於て多くの學說あり現時にありては單に脂肪球の集合体にあらざるものなることは明かにしてゐる問題となれるは其の發現を乳腺表皮細胞の退行變性又は腺胞の脂肪浸潤に求むるものと其の由來を白血球の喰脂作用に歸するものとの二說にして前說を主張するものは初乳球の形態並びに乳腺の組織學的所見より後說に左袒するものは喰脂並びに喰菌現象より各々其の對說を主張せり余亦最近組織學的、化學的並びに生物學的見地より初乳球の由來に關して之れが研究をなし初乳球の正体を白血球に歸するに至たり此等に關する發表は之れを後文に譲り生物學的研究の一助として試験したる白血球の喰脂現象に於て稍々興味ある結果に到達したれば之れが大要を記載すべし

## 試 驗 方 法

從來白血球の喰脂現象に就ては蛙の背部淋沍囊中に或は海猿及び家兎の腹腔に或は鼠の皮下に乳汁を注入し一定時間の後淋沍液腹腔液と混ぜる乳汁又は血液を採集し以て白血球の喰脂の有無を検し未だ硝子管内に於て之れが試験を試みたるものなし余は最初海猿の腹腔及び蛙の背部淋沍囊中に乳汁を注入して異なりたる時間の経過によつて前者よりは腹壁を切開して腹腔液(乳汁と混在)をビベットにて採集し後者よりは注射針を用ひて漿液(乳汁と混在)及び血液を吸取しメチレン青、ギームザ液及びブルチッカ液によつて生体染色を行ひ以て從

來の試験結果を確め次で硝子管内に於て之れが試験を遂行せり而して硝子管内試験用としての白血球を採集する爲めには余は普通ブイオンを用ひ其の 20 c.c 乃至 35 c.c を海狸の大きさに従つて腹腔内に注射し十二時間以上を經過したる後腹腔液を採集したり（注射後十二時間乃至二十四時間を經過したる場合にはブイオンは吸収せられるより採集直前或は採集直時に既定の方法をとる必要あるも余の試験したる際は既に他の用途に供試したる海狸を使用したるに起因せるか却て十二時間以上を經過したる場合に於て常に良好なる結果を得たり）而して腹腔液を採集するには豫め 4% の枸橼酸曹達を腹腔液の豫定採集量の五分の一の割合に於て試験管内に盛り腹壁を切開しピペットを用ひて採集し直ちに管を振蕩して枸橼酸曹達液と混和し後遠心法によりて之れを沈降せしめ上液を捨て残留したる白血球を生理的食鹽水を以て洗滌し再び遠心分離器にかけ普通三回の洗滌にて純粹の白血球のみを得たり用にのぞみて之れに生理的食鹽の培量を加へ以て白血球原液とせり此の外犢牛の体側並びに腹壁の毛を去り荒唐を塗布して水泡をつくり之れより漿液を採集して上法と同法により白血球原液をつくりたり

喰脂現象検査に當たりては余は遠心沈澱用の尖底小管を用ひ之れに血清及び其他の液量は 0.2 c.c として之れに一定量の乳球（數回豫備試験を繰り返へし一個の白血球に對し約十個内外の割合）を加へ次で白血球原液 0.02 c.c—0.03 c.c を加へよく攪拌して動物体温と同一の水浴中に靜立せしめ（この同一定時間を置いて脂肪球の浮上を防止するため攪拌せり）三十分間及び一時間後に其の白血球の一部を釣取してメチレン青ゲームザ液及びブルチッカ液を以て生体染色を行ひ以て喰脂數を測定せり而して乳球及び白血原球液を秤量するには余は毛細管ピペットを使用せり

注1. コンプレメントとして用ひたる能働血清は腹腔液を採集する前心臟より注射針を以て之を採集し遠心分離器を用ひて血清を分離せり但し犢牛の体側に生ぜしめたる水泡より採集したる白血球に就て喰脂現象を試験したる場合に用ひたる血清は牛の頸動脈より血液を採り靜置して分離したるものを用ひたり

2. 非能働血清は上法によつて得たるものを攝氏五十六度に三十分間加温して之を得たり

3. 乳清は乳汁を再三遠心分離器にかけ以て脂肪球を除去したるものを用ひたり

4. 卵白は之を充分攪拌して後濾過し蒸餾水を加へて血清と殆んど同一濃度として之を用ひたり

5. 試験經過中不洗滌乳球とあるは乳汁を遠心分離器にかけ分離したる乳皮より一定量を釣取したるものにして純粹の乳球のみにあらずして以外の各成分を抱合しをること勿論なり而して洗滌乳球とあるは上法の如くにして得たる乳球を生理的食鹽水を加へ遠心分離器にかけ食鹽水の透明となるまで再三洗滌したるものなり

6. 測定白血球數は海獺の腹腔に乳汁を注射したる場合にありては單核並びに多核白血球を合せば 500 個を測定し以て之等の數に對する單核並びに多核白血球の比率を定め蛙の背部淋巴囊中に乳汁を注射して得たるものにありては單核多核各百個、硝子管内試験にありては單核白血球 100 個多核白血球 500 個の測定を以て原則とせり、但試験經過の都合上止むなく時に之れより少數或は甚だしく小數の白血球を測定せり而して此等白血球の百分率を算し次で喰脂せざる白血球を以て喰脂せる白血球數を除して得たる數を以て余は之を喰脂率となしたり

(注)測定單核白血球中には大單核白血球移行形並びに小淋巴球の全部を含む

## 試 驗 經 過

### I 海獺腹腔内に於ける白血球の喰脂現象

試験 I. 大正四年七月七日午前十時十五分乳汁 30 c.c 注射(海獺の重量 210 瓦) 同日午後一時十五分即ち注射後三時間目に採集

| 測定白血球 | 500個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 甚だしく喰脂したる結果所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|---------------------------------|--------------|
| 單核白血球 | 199" | 40% | 55個    | 28% | 144個   | 72% | 0,292 | 51個                             | 92,7%        |
| 多核白血球 | 301" | 60% | 238"   | 77% | 63"    | 23% | 3,426 | 112"                            | 47,1"        |

試験 2. 大正四年七月七日午前十時二十分乳汁 30 c.c 注射 (海猿の重量 200 瓦) 同日午後四時廿分即ち注射後六時間目に採集供試の結果一般に小淋巴球多數存在し大單核白血球並びに多核性白血球甚だ少なし但し小淋巴球を除いては殆んど全く喰脂し其の約半数は乳汁中に見る初乳球と區別すること能はざりき

試験 3. 大正四年七月七日午前十時三十分乳汁 30 c.c 注射 (海猿の重量 215 瓦) 同七月八日午後二時半即注射後二十八時間目に採集但し乳汁は殆んど吸收せられて極めて少量を得たるに過ぎず供試の結果小淋巴球を除いて殆んどすべて喰脂せられたるも其の大部分は生体染色により核の形不明にして單核と多核とを區別すること能はず測定白血球 (小淋巴球を含む) 四十五個中 34 個喰脂し其の中初乳球と區別すること能はざる形を呈するもの二十六個を有せり

試験 4. 大正四年七月七日午前十一時乳汁 35 c.c 注射 (海猿の重量 225 瓦) 同七月九日午前十一時即ち注射後四十八時間目に採集

| 測定白血球 | 500個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率    | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 178個 | 36% | 170個   | 96% | 8個     | 4%  | 21,250 | 36個                  | 21,2%        |
| 多核白血球 | 322" | 74" | 87"    | 27% | 235"   | 73% | 0,370  | 8"                   | 2,5"         |

試験 5. 大正四年七月七日午前十一時三十分乳汁 35 c.c 注射 (海猿の重量 225 瓦) 同七月十日午前十一時三十分即ち注射後七十二時間目に採集

| 測定白血球 | 500個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 219" | 44% | 43個    | 19% | 176個   | 81% | 0,233 | 6個                   | 14,6%        |
| 多核白血球 | 281" | 56" | 50"    | 18% | 231"   | 82% | 0,216 | 0                    | 2,5"         |

試験 6. 大正四年七月九日午後二時三十分乳汁 20 c.c 注射 (海猿の重量 150 瓦) 同七月十日午後二時三十分即ち注射後二十四時間目に採集

| 測定白血球 | 500個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 233" | 47% | 155個   | 67% | 78個    | 33% | 1,987 | 50個                  | 21,5%        |
| 多核白血球 | 267" | 53% | 67"    | 25% | 200"   | 75" | 0,331 | 0                    | 0            |

試験 7. 大正四年七月十九日午前九時三十分乳汁 30 c.c 注射(海狸の重量 200 瓦) 同日午後一時三十分即ち注射後四時間目に採集

| 測定白血球 | 459個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 58"  | 13% | 37個    | 64% | 21個    | 36% | 1,762 | 4個                   | 6,9%         |
| 多核白血球 | 401" | 87" | 190"   | 47% | 211"   | 53" | 0,900 | 0                    | 0            |

試験 8. 大正四年七月二十日午前九時三十分乳汁 30 c.c 注射(海狸の重量 200 瓦) 同日午後一時三十分即ち注射後四時間目に採集

| 測定白血球 | 500個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 58"  | 12% | 37個    | 64% | 21個    | 36% | 1,762 | 1個                   | 1,7%         |
| 多核白血球 | 442" | 88" | 228"   | 51" | 214"   | 49" | 1,065 | 0                    | 0            |

試験 9. 大正四年七月二十二日午前九時三十分乳汁 30 c.c 注射(海狸の重量 210 瓦) 同日午後三時三十分即ち注射後六時間目に採集

| 測定白血球 | 500個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 76"  | 15% | 54個    | 77% | 22個    | 27% | 2,455 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 | 424" | 85" | 296"   | 72" | 128"   | 28" | 2,312 | 0                    | 0            |

試験 10. 大正四年七月二十三日午後五時三十分乳汁 30 c.c 注射(海狸の重量 200 瓦) 同二十四日午前九時即ち注射後十七時間目に採集

| 測定白血球 | 459個 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 64"  | 14% | 21個    | 33% | 43個    | 67% | 0,488 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 | 395" | 86% | 123"   | 31" | 272"   | 69" | 0,715 | 0                    | 0            |

試験 11. 大正四年七月二十五日午後五時三十分乳汁 30 c.c 注射(海狸の重量 200 瓦) 同七月二十六日午前八時三十分注射後十五時間目に採集

| 測定白血球 | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率             | 喰脂せるもの | 百分率             | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|-----|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 70  | —      | 40 <sup>個</sup> | 57,1%  | 30 <sup>個</sup> | 42,9% | 1,333                | 0            |
| 多核白血球 | 70  | —      | 33 <sup>個</sup> | 47,1%  | 47 <sup>個</sup> | 52,9% | 0,892                | 0            |

(注) I より II に至たる試験に當たり腹腔注射用としての乳汁は遠心器にて分離し上層沈渣共檢鏡の結果所謂初乳球の存在せざるものを用ひたり

今上記試験結果中各種白血球の喰脂率並び所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せるものゝ數並びに後者の喰脂白血球に對する百分率を表示すれば次の如し

| 試験番號   | 喰脂率<br>(單核白血球) | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率      | 喰脂率<br>(多核白血球) | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1      | 0,262          | (51 <sup>個</sup> )   | 92,7%             | 3,426          | (112 <sup>個</sup> )  | 47,1%        |
| 2      | —              | —                    | —                 | —              | —                    | —            |
| 3      | —              | —                    | —                 | —              | —                    | —            |
| 4      | 21,250         | (36 <sup>個</sup> )   | 21,2%             | 0,370          | (8 <sup>個</sup> )    | 2,5%         |
| 5      | 0,233          | (6 <sup>個</sup> )    | 14,6 <sup>個</sup> | 0,216          | (0)                  | 0            |
| 6      | 1,987          | (50 <sup>個</sup> )   | 21,5 <sup>個</sup> | 0,331          | (0)                  | 0            |
| 7      | 1,762          | (4 <sup>個</sup> )    | 6,9 <sup>個</sup>  | 0,900          | (0)                  | 0            |
| 8      | 1,762          | (1 <sup>個</sup> )    | 1,7 <sup>個</sup>  | 1,065          | (0)                  | 0            |
| 9      | 2,455          | (0)                  | 0                 | 2,312          | (0)                  | 0            |
| 10     | 0,488          | (0)                  | 0                 | 0,715          | (0)                  | 0            |
| 11     | 1,333          | (0)                  | 0                 | 0,892          | (0)                  | 0            |
| 平均(合計) | 3,507          | (148 <sup>個</sup> )  |                   | 1,136          | (120 <sup>個</sup> )  |              |

## 結 果

1) 海獺の腹腔に乳汁注射の結果白血球の喰脂作用の行ふことは事實にして時に同一小形の或は大小不同の乳球を以て填充せられ一見初乳期間並びに泌乳後期の乳汁中に見る所謂初乳球と殆んど區別し能はざる形態をとるものあり而して之等の形態中に見る同一の小形或は大小不同小形の脂肪球を以て填充せらるゝは小形の脂肪球の白血球の喰脂に容易なるによるか或る一部學者の唱ふる

が如く白血球に抱合せられたる後に至たりて細分せらるるによるものなるや明かならず

2) 喰脂の結果白血球は其の大きさを増し其の小形なるものにありては直徑  $16\mu$  にして其の大なるものにありては  $34.2\mu$  に及べり而して普通海狸白血球の常態に於ける大きさは余の多數測定の結果小淋巴球、大單核白血球、移行型並びに多核白血球を總括して小形のものは  $3.6\mu$  大形のものは  $18\mu$  にして  $16\mu$  内外のもの最も多數を占むるより喰脂の結果直徑に於て二倍乃至三倍内外に増大せるを見る而して充分脂肪球を以て填充せられたるものにありて時に  $40\mu$  乃至其れ以上の大きさに達したるものを測定せり

3) 喰脂したる脂肪球の爲めに多形核のものにありて核は一方に壓せられて分核互に相融着し恰かも單核の如き状態となり或は分離せられて散在し甚だしく喰脂したるものにありては普通生体染色にありては核の存在不明にして單核大白血球なるや多形核白血球なるや判然せざるものあり大單核白血球にありても亦核の壓せられて少々不整形となり多形分核の融着したるものと殆んど區別すること能はざるものあり但し一般に大單核白血球に於ける核は染色の度少々多核のものより淡きと及び精細に検査することにより大略區別することを得可し

4) Cohn 氏の唱ふるが如く生体に於て多形核白血球に見る中性染色顆粒の其の喰脂の進むに従ひ漸時消失することは事實なるも全く消失するものなるや分核の壓せられて融着する際其の間に抱合せらるものなるや明かならず

5) 喰脂作用を有するは大單核白血球、移行型並びに多核性白血球にして一般にエオジン嗜好白血球は稀れに喰脂し小淋巴球は喰脂作用なし而してメチニコフ氏の所謂 Makrophagen なる單核大白血球と mikrophagen なる多核性白血球との一定時間内に於ける喰脂の差異は十一回試験中(中二回を除く)唯一回多核白血球に於て喰脂率の大なりしに止まり平均に於て單核白血球の喰脂率は 3.507 多核白血球は 1.136 にして且單核白血球中には喰脂作用なき小淋巴球をも含みをるものなれば前者は甚だしく後者を凌駕せるを見る且つ多數の脂肪球

を抱合し初乳期間並びに泌乳後期乳中に見る所謂初乳球と區別し能はざる型を有するものは復大單核白血球に於て著しく多きを見るも單に喰脂の一現象によつて之れを見る時は Makrophagen, Mikrophagen なる區別的差異を設くること能はざるが如し

6) Bab 氏は海獺の腹腔に乳汁を注射する時は炎症の初期に於ては多核性白血球現出し次で單核白血球の現出すると稱したるも余の試験によるに多くの場合に於て氏の結果を肯定したるも時に否定するが如き結果に到達したるより海獺並びに其他の事由によつて差異あり確論すること能はざるが如し

## II. 蛙の背部淋巴囊中に乳汁を注射し試験したる白血球の喰脂現象

試験 1. 大正四年八月五日蛙の背部淋巴囊中に約 5 c.c の乳汁注射而して注射後二十時間目に血液檢鏡

| 測定白血球 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率  | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |       |
|-------|--------|------|---------|------|------|----------------------|--------------|-------|
| 單核白血球 | 100個   | 46個  | 46%     | 54個  | 54%  | 0,852                | 20個          | 43,5% |
| 多核白血球 | 100''  | 41'' | 41''    | 59'' | 59'' | 0,695                | 7''          | 1,7'' |

四十八時間目に血液檢鏡

| 測定白血球 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|--------|------|---------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 100個   | 52個  | 48個     | 48%  | 1,083 | 19個                  | 36,5%        |
| 多核白血球 | 100''  | 49'' | 51''    | 51'' | 0,961 | 8''                  | 0,691        |

## 結 果

蛙の背部淋巴囊中に乳汁を注射したる結果は試験數僅かに二回に過ぎず従つて種々の關係に就て知悉すること能はざるも白血球の喰脂現象に關しては海獺の腹腔に乳汁を注射して得たる場合と少しも異ならず且つ注射後二十時間にして血液中に脂肪球を採りたる白血球の多數遊送せらるを見る（二十時間前既に遊送せらるや否やは明かならず）而して單核並に多核白血球の喰脂上に於け

る差異は二回の平均に於て前者の喰脂率は 0,968 後者の喰脂率は 0,828 にして多数の大小不同の脂肪球を以て填充せられ所謂初乳球と異ならざる形態となりたる者も亦前者に於て著しく多く且つ喰脂の結果白血球は甚だしく其の大きさを増し中には  $40\mu$  或は其れ以上に達したるものを見ることを得たり

### III. 硝子管内に於て試験したる白血球の喰脂現象

試験 1. 大正四年七月二十日午後四時四十分ブイオン 30 c.c 注射同二十一日午前九時即ち注射後十六時間半目に白血球採集

乳汁 0,2 c.c + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球 | 500個  | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率    | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|-------|--------|-------|---------|--------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 76''  | 54個    | 71%   | 22個     | 2,9%   | 2,455 | 2                    | 3,7%         |
| 多核白血球 | 424'' | 40''   | 9,4'' | 384''   | 90,6'' | 0,104 | 5                    | 12,5''       |

試験 2. 大正四年七月二十一日午後四時ブイオン 30 c.c 注射同二十二日午前九時即ち注射後十七時間目に白血球採集

乳汁 0,2 c.c + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|--------|-----|---------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 500個  | 293個   | 59% | 207個    | 42% | 1,415 | 0                    | 0            |

試験 3. 大正四年七月二十三日午後四時ブイオン 30 c.c 注射同二十四日午前九時即ち注射後十七時間目に採集

i) 乳汁 0,2 c.c + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 33個   | 33%     | 67個   | 67%  | 0,493                | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 151'' | 30''    | 349'' | 70'' | 0,335                | 0            |

試験 4. 大正四年七月二十六日午後四時ブイオン 30 c.c 注射同二十七日午前九時即ち注射後十七時間目に白血球採集

i) 乳清 0,2 c.c + 不洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球       | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------------|--------|-----|---------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 100個  | 38個    | 38% | 62個     | 62% | 0,511 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 500'' | 217''  | 43% | 283''   | 57% | 0,767 | 0                    | 0            |

ii) 能働血清 0,2 c.c + 不洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球       | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------------|--------|-----|---------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 100個  | 85個    | 85% | 15個     | 15% | 5,667 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 500'' | 367''  | 73% | 133''   | 27% | 2,759 | 0                    | 0            |

試験 5. 大正四年七月二十八日午後四時ブイオン 30 c.c 注射同二十九日午前八時即ち注射後十六時間目に白血球採集

i) 乳清 0,2 c.c + 不洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球       | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------------|--------|-----|---------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 443個  | 8個     | 18% | 36個     | 82% | 0,222 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 399'' | 54''   | 16% | 345''   | 84% | 0,157 | 0                    | 0            |

ii) 能働血清 0,2 c.c + 不洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間三十分間

| 測定白血球       | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率    | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------------|--------|-----|---------|-----|--------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 100個  | 87個    | 87% | 13個     | 13% | 6,692  | 7個                   | 8,0%         |
| 多核白血球 500'' | 481''  | 96% | 19''    | 4%  | 25,316 | 16''                 | 3,3''        |

試験 6. 大正四年八月十六日午後五時ブイオン 30 c.c 注射同十七日午前十時三十分即ち注射後十八時間半目に白血球採集

i) 乳清 0,2 + 洗滌乳脂球 + 白血球原液 0,03 反應時間一時間

| 測定白血球       | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------------|--------|-----|---------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 100個  | 38個    | 38% | 62個     | 62% | 0,613 | I                    | 2,6%         |
| 多核白血球 500'' | 232''  | 46% | 268''   | 54% | 0,862 | 0                    | 0            |

ii) 初乳々清 0,2 c.c + 不洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球       | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せざるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------------|--------|-----|---------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 100個  | 70個    | 70% | 30個     | 30% | 2,333 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 500'' | 413''  | 83% | 87''    | 17% | 5,259 | 0                    | 0            |

## iii) 初乳々清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|--------|-------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 100個   | 60%   | 40個     | 40%   | 1,500 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 | 500''  | 398'' | 80''    | 102'' | 20%   | 3,902                | 0            |

## iv) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|--------|-------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 100個   | 58%   | 42個     | 42%   | 1,381 | 3                    | 5,2%         |
| 多核白血球 | 500''  | 400'' | 80''    | 100'' | 20%   | 4,000                | 1,0''        |

## v) 生理的食鹽水 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|-------|--------|------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球 | 100個   | 33%  | 67個     | 67%   | 0,492 | 0                    | 0            |
| 多核白血球 | 500''  | 78'' | 16%     | 422'' | 84%   | 0,161                | 0            |

試験 7. 大正四年八月十八日午後五時ブイオン 30 c.c 注射同十九日午前九時即ち注射後十六時間目に白血球採集

## i) 乳清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100    | 27%  | 73個     | 73%   | 0,372 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500    | 62'' | 12%     | 438'' | 88%   | 0,142                | 0            |

## ii) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳脂 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 42%   | 58個     | 58%   | 0,724 | 2                    | 4,8%         |
| 多核白血球  | 500''  | 244'' | 49''    | 256'' | 51%   | 0,957                | 3            |

## iii) 卵白 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 41%  | 59個     | 59%   | 0,695 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 99'' | 20''    | 401'' | 80%   | 0,247                | 0            |

## iv) 生理的食鹽水 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 26% | 74個    | 74% | 0,351 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 62" | 438"   | 88% | 0,142 | 0                    | 0            |

試験 8. 大正四年八月二十日午後四時ブイオン 30 c.c 注射同二十一日午前九時即ち注射後十七時間目に白血球採集

i) 乳清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 18% | 82個    | 82% | 0,220 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 36" | 464"   | 93" | 0,078 | 1                    | 2,8%         |

ii) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 50%  | 50個    | 50% | 1,000 | 1                    | 2,0%         |
| 多核白血球  | 500"   | 229" | 271"   | 54" | 0,845 | 2                    | 0,9"         |

iii) 卵白 0,2 c.c + 洗滌乳法 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 17% | 83個    | 83% | 0,205 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 92" | 408"   | 82" | 0,225 | 0                    | 0            |

iv) 生理的食鹽水 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 25% | 75個    | 75% | 0,333 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 34" | 466"   | 93" | 0,073 | 0                    | 0            |

試験 9. 大正四年八月二十一日午後三時三十分ブイオン 40 c.c 注射同二十二日午後九時即ち注射後十七時間半目に白血球採集

i) 乳清 0,2 c.c + 洗滌乳脂 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-----|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 29% | 71個    | 71% | 0,409 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 83" | 417"   | 83" | 0,199 | 0                    | 0            |

## ii) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 45個   | 45%     | 55個   | 55%  | 0,818                | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 135'' | 27''    | 365'' | 73'' | 0,370                | 0            |

## iii) 卵白 0,2 c.c + 洗滌乳脂 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 15個   | 15%     | 85個   | 85%  | 0,176                | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 105'' | 21''    | 395'' | 79'' | 0,266                | 0            |

## iv) 生理的食鹽水 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|---------|-------|------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 5個   | 5%      | 95個   | 95%  | 0,053                | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 31'' | 6''     | 469'' | 94'' | 0,066                | 0            |

試験 10. 大正四年八月二十三日午後五時ブイオン 30 c.c 注射同二十四日午前九時即ち注射後十六時間目に白血球採集

## i) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 脂喰せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 44個   | 44%     | 56個   | 56%  | 0,785                | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 370'' | 74''    | 130'' | 26'' | 2,846                | 0,5%         |

## ii) 非能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率  | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 23個   | 23%     | 77個   | 77%  | 0,299                | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 216'' | 43''    | 284'' | 57'' | 0,761                | 0            |

試験 11. 大正四年八月廿五日午後五時ブイオン 30 c.c 注射同二十六日午前九時即ち注射後十六時間目に白血球採集

## i) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|--------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 63%  | 37個    | 37%  | 1,703 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 255" | 51"    | 245" | 1,041 | 0                    | 0            |

ii) 非能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-----|--------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 19% | 81個    | 81%  | 0,235 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 53" | 11"    | 447" | 0,119 | 0                    | 0            |

喰脂白血球 50 個の喰脂肪球數

|       | 能働血清中 | 非能働血清中 |
|-------|-------|--------|
| 單核白血球 | 124個  | 78個    |
| 多核白血球 | 117"  | 79"    |

試験 12. 大正四年八月二十六日午後五時ブイオン 30 c.c 注射同二十七日午前九時即ち注射後十六時間目に白血球採集

i) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|--------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 86%  | 14個    | 14%  | 6,143 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 286" | 57"    | 214" | 1,336 | 0                    | 0            |

ii) 非能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|--------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 40%  | 60個    | 60%  | 0,667 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 195" | 39"    | 305" | 0,639 | 0                    | 0            |

試験 13. 大正四年八月三十日午後四時ブイオン 30 c.c 注射同三十一日午前九時即ち注射後十七時間目に白血球採集

i) 能働血清 0,2 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せるもの | 百分率 | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|------|--------|-----|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 40%  | 60個    | 60% | 0,667 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500"   | 421" | 84"    | 79" | 5,329 | 0                    | 0            |

## ii) 乳清 0,2 c.c + 洗滌乳脂 + 白血球原液 0,03 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 |       | 喰脂せるもの | 百分率  | 喰脂せざるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|-------|--------|------|---------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個  | 38個    | 38%  | 62個     | 62%  | 0,613 | 2                    | 2,7%         |
| 多核白血球  | 500'' | 235''  | 47'' | 265''   | 53'' | 0,887 | 2                    | 0,9''        |

試験 14. 大正四年八月三日午後一時芫菁塗布同四日午前九時水泡より白血球採集

## 牛能動血清 0,1 c.c + 洗滌乳球 + 白血球原液 0,02 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率   | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|-------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 42%   | 58個     | 58%   | 0,724 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 221'' | 44''    | 279'' | 56''  | 0,792                | 0            |

試験 15. 大正四年八月五日午後三時芫菁塗布同六日午前九時水泡より白血球採集

## 牛能動血清 0,1 c.c + 洗滌乳球 + 白血球血液 0,02 c.c 反應時間一時間

| 測定白血球數 | 喰脂せるもの | 百分率   | 喰脂せざるもの | 百分率  | 喰脂率   | 所謂初乳球と區別し能はざる形を呈せしもの | 喰脂白血球に對する百分率 |
|--------|--------|-------|---------|------|-------|----------------------|--------------|
| 單核白血球  | 100個   | 80%   | 20個     | 29%  | 4,000 | 0                    | 0            |
| 多核白血球  | 500''  | 465'' | 93''    | 35'' | 7''   | 13,287               | 0            |

今各種白血球の喰脂率を表示すれば次の如し

|           |       | 喰 脂 率 |        | 試験回数 |
|-----------|-------|-------|--------|------|
|           |       | 單核白血球 | 多核白血球  |      |
| 生理的食鹽水    | 洗滌乳球  | 0.299 | 0.123  | 3    |
|           | 不洗滌乳球 | —     | —      | —    |
| 卵 白       | 洗滌乳球  | 0.359 | 0.319  | 3    |
|           | 不洗滌乳球 | —     | —      | —    |
| 乳 清       | 洗滌乳球  | 0.445 | 0.434  | 5    |
|           | 不洗滌乳球 | 0.362 | 0.462  | 2    |
| 非動モルモツト血清 | 洗滌乳球  | 0.430 | 0.506  | 3    |
|           | 不洗滌乳球 | —     | —      | —    |
| 乳 汁       | 洗滌乳球  | 1.473 | 0.220  | 2    |
|           | 不洗滌乳球 | —     | —      | —    |
| 能動モルモツト血清 | 洗滌乳球  | 1.678 | 2.091  | 8    |
|           | 不洗滌乳球 | 6.350 | 14.068 | 3    |
| 牛能動血清     | 洗滌乳球  | 2.362 | 7.041  | 2    |
|           | 不洗滌乳球 | —     | —      | —    |
| 初乳々清      | 洗滌乳球  | 1.500 | 3.902  | 1    |
|           | 不洗滌乳球 | 2.333 | 5.259  | 1    |
| 平均 (合計)   |       | 1.599 | 3.130  | (33) |

## 結 果

1) 白血球の喰脂現象は硝子管内 (in vitro) に於ても生体内 (in vivo) に於けると同様之を試験することを得べし

2) 白血球の喰脂率は單核多核何れにありても生理的食鹽水中に於て最も小にして乳清、卵白、非能働血清、乳汁、初乳々清、能働血清の順位にあり

3) 白血球の喰脂作用は三十三回の試験の結果單核白血球の平均喰脂率 1,599 なるも多核白血球にありては 3,130 の高率を示すのみならず硝子管内試験に於ては生体内試験に於けるが如く無數の脂肪球を抱容し恰かも初乳並びに泌乳後期乳に見る所謂初乳球と區別し能はざる形に至たれるもの甚だ少なく且つかゝる形をとりたるものは絶對數にありては單核大白球より多核白血球に於て稍々多き等生体内試験に於けると其の趣きを異にす但し一個の白血球体内に抱客せられたる乳球の數は單核白血球に於て多核白血球より多きのみならず所謂初乳球様形を呈する白血球出現の喰脂白血球に對する百分率亦前者に於て大なるを見る且つ多核白血球の單核白血球に比し其の喰脂率の大なるも單核白血球中には全々喰脂作用なき小淋瀝球を含むと硝子管内試験に於ては生体内に於けるが如く長時間白血球の活力を保つこと能はざれば直ちに多核白血球に於て大なりとの結論を下し能はざること勿論なり

4) コンプレメントとして用ひたる物質の如何に關せず白血球の喰脂率は洗滌乳球より不洗滌乳球の場合に於て大なるを見る之れ蓋し不洗滌乳球の白血球に接着することの容易なるによる

5) 卵白中に於ける白血球の喰脂作用は喰菌作用と其の趣きを異にせり (卵白中に於ては白血球は殆んど喰菌せず後報牛乳のオブツニンに關する小著参照)

6) 能働血清中にありては非能働血清中に於けるより喰脂率大なり

7) 初乳々清中にありては能働血清中に於ける場合に次で喰脂率大なるは之れ蓋し初乳々清にありては白血球の活力を盛ならしむ血清の存在と脂肪球をして白血球に接着を容易ならしむ媒介体即アルビューシンの含量多きによる

8) 4. 5. 6. 7. より白血球の喰脂率は白血球の活力を増加せしめ同時に乳球をして白血球に接着を容易ならしむ媒介体の存在する時に於て高きを見る之れ蓋し細菌の如き生体に於けると其の趣きを異にする所にして又血清中にアゾオブソニンの存在を見ざることを立證すること明かなり

9) 牛より得たる白血球に就ての試験回数は極めて少きも海猿より得たるものと同様の関係を有すること明かなり

## 總 括

1) 白血球の喰脂現象は硝子管内に (in vitro) 於て生体内 (in vivo) に於けると同様に之を試験することを得べく且つ喰脂現象の種々の感作に對する関係を探究することを得可し

2) 白血球の喰脂作用の進むと共に單核大白血球にありては核の變化を來たし多核中性染色顆粒白血球にありては顆粒の消失及び分核融合の結果恰かも單核白血球と多數の白血球に就て試験したるものにあらざれば區別し能はざるが如き状態となるものあり而して顆粒の消失は分核融着の際其の中に抱合せらるゝものなるや白血球の退行に起因するものなるや明かならず

3) 單に白血球の喰脂作用より之を見るときはメチニコフ氏の所謂 Makrophagen 及 Mikrophagen の區別的差異を設くこと能はざるが如し

4) 生体内試験の結果單核多核何れの白血球にありても時に小形の乳球のみを抱合し稀れに注射に用ひたる乳汁中に含有せられざるが如き小形の乳球の存在するを見る之れ蓋し白血球体内に於て分割せらるるによるものなるや否やは未だ明かならず

5) 白血球の喰脂作用は白血球の活力を増大ならしめ乳球をして白血球に接着を容易ならしむ媒介体の存在に於て最も大にして喰菌現象と稍々其の趣きを異にせり

6) 2. 3. 4. 5 より血清の透過アルビューシンの含量高き初乳期並びに泌乳後期の乳汁中に於て大小不同の時に極めて小形の脂肪球の無數に喰脂せられたる

白血球の存在せる由故を明かにすることを得可く（初乳期間並びに泌乳後期乳中には白血球の透過し來たること多し）又血清中にアゾオブソニンの存在せざることも亦立證し得可し

引用書並びに参考書は後報に譲る

大正四年十一月



## 故農學士川上瀧彌君略傳

川上瀧彌君は明治四年一月廿四日を以て山形縣飽海郡松嶺町に生る。松山藩士川上十郎氏の二男なり。幼時より讀書を好み八九才の頃より附近の山野を跋涉して草木類を採集し其腊葉を作り又は其寫生を試み或は蝶蛾類を捕へて標本を作製し以て自ら樂とせり。明治十三年君齡十才の時腸窒扶斯に罹り遂に惡性癱瘓質斯に變症し右脚の膝關節屈曲して伸びざるに至り、十五年十月東京大學病院に入院し ドクトル、スクリツバ の治療を受け大手術を受くる事三回、在院二百廿日にして漸く退院する事を得、病脚少しく跛するも歩行に支障なきを得るに至れり。

明治廿一年鶴岡中學校の開校せらるゝや君直に入學し其二年級に編入せらる。在校中君の植物に對する研究の志益々深きを加へ、熱心以て植物の採集に従ひ其廿四年笈を負ふて札幌農學校豫科に入學されし時には己に六七百種の莊内産植物標本を携へ來られしに見るも如何に君が孜々として此事に當られたるかを察知するに足らん。豫科五年、本科四年合計九ヶ年の在學中君は學科課程履習の餘暇全力を植物學の研鑽に注ぎ一日として之を怠らず其結果論文として表はるゝもの頗る多し。君の植物學上の最初の論文は「夏日旅行中採集せる植物目録」と題せるものにして廿五年夏期休業中渡島國福山、膽振國長万部、靜刈等に於て採集したる植物の目録なりき、之は當時豫科の機關雜誌たりし「蕙林」に掲載せしものにして尙同誌上にて「植物雜錄」「烏海山に植物を採るの記」等を發表せり。君が來札以來須臾も其研究を怠らず只管其完成を期せられしは故郷莊内の植物目録にして其材料を補充せんが爲め廿七年歸省し翌廿八年より三ヶ年間に亘りて「莊内産顯花植物」なる題下に東京植物學雜誌上に連載せられ其種類の數は實に千〇廿一の多きに達せり。

明治廿九年君が本科に進まるゝや益々植物學研究及び植物探險に努められあらゆる機會を求めて其目的を貫徹せしめん事を期せられたり。當時北海道廳に於て高山に於ける氣象觀測の舉ありしかば君は請ふて其御用人夫となり三十

年には釧路國雌阿寒山、卅二年には利尻山に各八月一ヶ月を山上に暮し職務に服する傍ら植物を採集し又親しく其分布の状態を調査し歸札後其結果を「釧路國阿寒地方採集記」及び「利尻島に於ける植物分布の状態」と題し東京植物學雜誌上にて公にせり。而して利尻植物に關する論文は東京植物學會の懸賞論文に應募して提出せるものにして審査の結果當選し銀牌を授與せられしものなり。之より川上瀧彌君の令名廣く吾植物學界に擴まれり。明治卅一年夏期休業中は北海道廳の囑託を受け千島擇捉島に航し其森林植物の調査に従事し其結果は本會第七十二回月次會(三十二年十月)に於て講演され又「擇捉島の森林樹種及び其分布」と題し植物學雜誌上に掲載せられたり。尙植物分類に關する論文にして川上君が學生時代に發表したるものに「*Neottia kamtschatica* Spreng. サカネラン」及び「メアカンフスマとテウカイフスマに就て」の二文あり。

川上君は札幌農學校在學中は植物病理學を專攻され卒業後も終始植物病害に關する研究に留意し其遂行に努力せられたり。

卒業論文としては本邦農業に重大の關係ある稻のイモチ病に就て研究せられ有益なる研究尠しとせず、該論文は後札幌農學會報に掲載され今日に至るも稻熱病に關する最も重要なる參考論文として一般に認めらるゝものなり。

君は明治卅三年札幌農學校を卒業せらるゝや直ちに北海道廳囑託となり本道重要樹木の分布効用識別に關する調査に従事し奉職僅かに一年に過ぎずと雖も其間に於て「北海道森林植物圖説」を出版し本道樹木研究史上に大に貢獻する處ありたり。該書は現今に至るも本道産重要樹種の名稱、形狀、材質、効用、分布等を知る最良の著書の一たるを失はず。又此期間「奥尻島の森林植物」及「北海道森林植物樹葉識別法」なる二論文を公にす。

明治三十四年熊本縣立熊本農業學校教諭に任せられ在職二年教務の傍ら當時九州に於て最も人の注意を惹きたる桐樹の天狗巢病及七島蘭の鼈甲病の研究に従事し兩者共に其病原菌は學界未知の種類なる事を確めたれば天狗巢病菌には *Gloeosporium Kawakamii* Miyabe, 鼈甲病菌には *Kawakamia Cyperi* (Miyabe et Ideta) Miyabe の學名を附せり此二研究は裳華房より夫々單行本として發

行せられたり。尙此間「陸稻に寄生する顯花植物」と題する論文と「農學校用植物生理學教科書」の著述ありたり。

明治卅六年十月臺灣總督府に轉任し農事試験に關する事務及び國語學校講師を囑託せられ翌卅七年一月臺灣總督府技師に任じ農商課勤務を命ぜられ爾來十有二年農事試験場技師を兼任しては植物病理部長となりて病害研究の基を樹て農務商工務林務の各課に兼勤しては専ら同島有用植物の調査に力を用ゐられ野生護謨樹の如き有益なる發見尠しとせず。然れども君が特に心血ををゝぎて完成を期せられしは殖産局博物館及び臺灣植物誌なりとす。幸に早田博士の如き有力なる植物學者の協力を得たるを以て君は専ら材料の蒐集に従事し幾度か新高其他の諸高山峻嶺蕃地を踏破し又附屬島嶼を巡歷して其植物調査を遂行し苦心努力の結果集められたる標本中學界未知の新種極めて多く其内君が功勞に酬ひんが爲め其姓の種名に附せられしもの實に數十種に及べり。

川上君の臺灣に於ける研究は多方面に亘り其趣味の廣く其造詣の深きは君の著述によりて知る事を得べし。君の臺灣に於ける植物病理學上の著述としては「柑橘病害論」「甘蔗の寄生顯花植物」「甘蔗病害論」「臺灣農作物病害目錄」(鈴木力治氏共著)、「茶樹腫萎病」「食用黑穗菌」等あり。又有用植物に關しては「臺灣野生護謨樹」「印度種護謨樹に就て」「護謨樹の栽培法」「木綿樹」「臺灣有用植物」「規那樹栽培の歴史」「臺灣農業植物誌料」等あり。更に臺灣產植物及其分布に關しては「臺灣植物目錄」の外「臺灣新高山採集紀行」「澎佳島の植物」「新高山頂の植物」「A New Malus of Formosa」(小泉氏共著)「西澤島の植物」等の著述あり。明治四十四年六月官命に依て南洋諸島及東印度に出張し巡遊十一ヶ月炎暑を冒し時に病軀を提げ、屈せず撓まず諸般の調査に従事し又無數の南洋有用植物標本を携へ歸り克く其使命を完ふせり。此行瓜哇島に於て植物採集を試み幾何もなく新種の發見をなせるが如き君の以て大に得意とせる處なりき。其調査に係るものは南洋土產として講演に著述に廣く發表せられ「椰子の葉蔭」の外「瓜哇視察複命書」「南洋視察談」「博物學上より見たる馬來印度旅行談」「On Some Celebes Plants」等の著あり。彼の「椰子の葉蔭」は君の掉尾の大著にして

茲に君の天才が遺憾なく發揮せられしを見る。單に植物學者としての觀察に止らず事苟も臺灣の産業上に裨益する處ありと認めたるものは細大漏さず綿密に之が視察を遂げ之を君が獨得の趣味多き彩筆を以て詳記されたるものにして曾て好評嘖々たりし「花」と共に永く愛讀せられ世を裨益する處多かるべし。

今年六月臺灣始政第二十回紀念日に際し紀念事業の一として南洋產物陳列の議あり。君主として之が任に當り刻苦精勵能く短日月の間に之が整理を了し公開するを得たり。此間に於ける過勞は遂に君の健康を害し同月二十六日病床に就き七月中旬漸く輕快に赴きたるも君が主管に屬する新紀念博物館の開館式近づきたるを以て病を押して其準備に努め將に明日を以て開館せんとするに至れる八月十九日積日の勞遂に發して館内に卒倒し八月二十日午後六時四十分溘焉として逝けり。君か忠實にして責任を重んずる精神は遂ひに君をして職務に殉ぜしむるに至れり。此を以て特旨により正五位に叙せらる君洵に死して餘榮ありと云ふべし。君が遺骨は君の生涯と因縁誠に淺からざる札幌に送られ其郊外圓山々麓の高燥にして氣清き處に君の母校を望みて葬られたり。

君資性誠實、篤厚、友情に富み、親に仕へて至孝、骨肉に盡すに信敦、常に修養を怠らず人と交はるに好意を以てし一人の敵ありしを聞かず。公人としては責任を重んじ職務に忠實にして苟もせず。學者としては篤學精勵、其事に當るや規圖精密、用意周到之を實行するや耐忍不撓の精神を以てす。君が趣味亦頗る廣く文藻に富み秀吟多し。令閨榮子氏は快活にして淑徳の譽高く君を助けて渝る事なく君が臺灣に於ける功績は又實に夫人に負ふ處尠しとせざるなり。

而して今や君が學益々進み君が經驗愈々深きを致し其臺灣産業界に貢獻する處益々多大ならんとせし秋突如として君の易簣に遇ひしは誠に痛惜に堪へざる處にして獨り君の遺族親戚知友等の爲めのみならず又國家産業の發達學術の進歩の上より見るも實に大損失たるを失はざるなり。

宮 部 金 吾 識

---

## 本 會 記 事

(自大正四年二月至大正四年十月)

大正四年二月より大正四年十月迄例會を開催すること四回其講演題目及び大要は下の如し。

○第百八十八回、大正四年二月二十日、本學經濟學教室に於て開會。

1. 象鼻虫科に屬する針葉樹の害虫に就きて。 林學博士 新島善直君  
野幌林業試験場に發生せる **とどまつ** の立枯を起す一種の象鼻虫に就て述べらる。先一般針葉樹の害をなす象鼻虫に就て述んとて *Hylobius* 及び *Pissodes* の生活史を詳細に述べられ其樹木に對する害の異同を比較し *Hylobius* **まつのおほぞうむし** の幼虫は木の根株を食害するのだから幼虫は林業上の害をなさないけれども、成虫は三年生位の稚樹に付いて其液汁を吸収するので、大害をなす。*Pissodes* の幼虫は主として松の苗木又は生長の盛な枝條に付て食害するけれども *Pissodes* **まつのながぞうむし** の成虫の食害は二次的のもので一旦他に害せられた木に付く害虫である、野幌試験場の**とどまつ**の害虫は全く *Pissodes* に屬すべきものである。

2. 北海道の鹿に就て。

河 野 常 吉 君

北海道の鹿は昔は随分多かつたものである。土人は其肉を食ひ皮は着物として其餘分は運上屋によつて内地に送るのである。土人が鹿を捕獲するには**あまつぼ**等を用ふ、**あまつぼ**の張方は獸類に依て異り、熊には緩く、鹿には強く張るのである、北海道の鹿は冬は雪の少い日高、膽振、十勝地方に居り、夏は其他の地方に去來する、八、九月の候交尾し十ヶ月間腹に居つて翌年の十月頃一頭の子を産む。鹿の増減は古き記録に記載されてあるが、其重なる原因は鹿の渡海して南部地方に入りしと云ふこと其一で、多くの疑ふべき點がある。次に大雪で凍死したこと最も眞に近く、鹿の敵なる狼が南部地方から狩立てられて本道に入つた所謂渡狼の増加に依れりとする説あるも狼の渡海は信じて難い但し

狼の増加は多少鹿の減少の因をなせるものであつたに違なからふ。

明治になつて開拓使時代となつて鹿獵規則など設け其繁殖に意を注いだが實際は濫獲されたのである、且明治十二年二月大雪あり鹿多く減少した、十勝利別の如き鹿の死体累々として流れ水を飲むことが出来ぬほどであつた。それで十五年になつては全く減少する様になつた。

鹿の輸出的産物としては、鹿角が第一であるこれは藥品として支那の湖南湖北其他の地方に入つたものである、鹿角の價は袋角を第一とし生角これに次ぎ落角を下等品とする、落角の多くあつたのは十勝地方で落角採集の方法は實に亂暴で野火を付けて集めたものである、今日十勝地方の高原の地味の悪いのは此の落角拾の野火が大なる原因をなしてをる。鹿皮は價は上皮一枚一圓中皮七圓下皮四十五錢位である。角は生角百斤二十五圓拾角百斤五圓、袋角一斤七八圓のものであつた。

かくして北海道の鹿は減少したので、狩獵法施行規則第十九條では全く鹿獵を禁じた<sup>○</sup>て其後多少繁殖したが、明治二十三年の改正で又許したので三十五年頃には殆ど全く無くなつたのである。

奥尻島の鹿は明治九年に開拓使で放置したので随分繁殖して居たがこれも今日では全く無くなつた。

○第百八十九回、大正四年三月六日、經濟學講堂に於て本會及びカメラ會聯合の講演會を開き左の諸氏の講演ありたり。

### 3. 南洋植物採集談、

渡 瀬 次 郎 君

旅行の順序に従て新占領南洋諸島に於ける植物採集談を爲せり、而して各島何れも滞在日數少なりし爲め充分なる採集を爲し能はざりしも先づ Truk 島にては Barrier 中の各小島何れも Mangrove 樹林に取圍れ次は古々椰子林及海岸植物地帯なり此の地帯中の主なるものとして *Barringtonia speciosa*, Breadfruit (*Artocarpus incisa*), *Pandanus* 其他種々の植物を挙げ之れに蘭科植物羊齒類等種々の著生植物の見らるゝあり又山林を爲せる植物及土人家屋附近に栽培せる食用果樹類に付きて述べ Ponape 島に於ては往航は同島の植物園の如き所に栽培

又は移入せる植物を専ら採集し歸航には深く森林中に赴き土人の家に泊りて採集し歩きたる爲め木生羊齒の森林、丈餘に達せる *Alpinia*. 其他眞の熱帶的氣分を現はせる植物景觀に接し多數の穫物を得來たりし事 Kusaie に於ては時間及天候の都合上充分採集し能はざりしも城趾附近に巨大なる *Banyan tree* あるを見又 Jaluit 島は Atoll なる爲め其處に生せる植物も他と異なり又其種類極めて少なく主なるは古々椰子、*Pandanus*、等の外クサトベラ、モンパノキ、ミズガンビ *Guettarda speciosa* 等の灌木にして之等が Coral reef の上を被ひ居れり。更らに西航して Angaur に至りては此島は小島なれ共燐鑛の産する島として有名なものにして植物が一面に繁茂して其植物も亦東方諸島と大に異なる處ある爲め採集物甚だ多く又燐鑛を採掘せる跡地に水が溜りて羊齒其他特殊なる植物の生ぜるを見たり Palau は大島にして此處には三日間滞在し *Andesite* よりなる島上の植物と *Elevated lime stone* 上の植物は夫々異なり後者は海上に突出せる爲め土人を用ひてボートにて漕ぎ廻りながら採集を爲したり。尙 Yap, Saipan を經て歸著せるも病氣の爲め採集等は爲さず、最後に旅行中觀察せる植物中の特有なるもの即椰子及 *Mangrove* に付き述べられたり椰子には *Cocos nucifera*、(古々椰子) *Coelococcus amicarum* (Ivory nut) *Areca catechu* (檳榔樹) *Licistera chinensis* ノヤシ *Nippa fruticans* 等ありて各其の形態用途等に付き述べ又 *Mangrove* 林には *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Bruguiera polyrrhiza*, *Lumnitzera* sp., *Sonneratia acida*, *Xylocarpus granatum* 等ありて各其等の形態、氣根及び呼吸根の狀態果實の胎生なるもの等に就き其の實物標本を示して説明する所ありたり。尙當日は採集せる多數の腊葉標本並 フォルマリン漬標本を陳列して之れが説明を爲せり。

#### 4. 南洋新占領地の話

農學士 野澤俊次郎君

南洋の新占領地は東西2,000哩南北1,000哩に亘る廣き海洋上に散存する *Mariana*, *Karolin*, *Marshall*. 三群島で此等の島は珊瑚礁であるか、又は火山を包むに珊瑚礁を以てしたるもので、其面積は千島擇捉島に等しき僅 1,200 方哩なるも熱帶圏内に存在するが爲め天恵多く千島の比でないのである。Karolin 群島は

東西 1,800 哩南北 350 哩海上の面積 600,000 方哩 大、小 600 餘島 48 個の小群島團から成立し島上の面積約 500 方哩の群島の總稱である其中 Truk, Kusaie, Ponape, Yap, 諸島の如き大なるものは玄武岩、石灰岩、及び珊瑚礁から構成され、其他は海面上僅かに數呎に過ぎない珊瑚島が多い、此等大なる島には海拔 2,000—3,000 呎の高き山あり四季濃厚な深綠色に彩られて居る、十月より翌年四月までは北東風の襲ふ所となりて雨量多く氣溫は四季を通じて華氏 80 度内外を上下して居る此の氣溫と雨量とは植物を繁茂せしむる主因となり島は殆んど深林である、人種は錯雜して居る、且つ廣き海面に分布せる小島であるから其風俗習慣等一定せず大体に於て土人は現今は穩和であるが以前は各部敵味方となつて喧嘩争闘をしたものであると。

Marshall 群島は Karolin 群島の東に横はる群島で Ratak (日の出島の意十三島) Ralick, (日没島の意十一島) の二列の珊瑚礁島から成立て居る其面積約 350 方哩氣候は大陸から最も隔絶して居るので太平洋中最も良好なる所である殊に十一月から四月迄は北東貿易風に吹かれ頗る清涼の健康地である、去りながら人民は怠惰である。

Palau 群島は新占領地の最西端にある群島である其面積 200 方哩 Babeldaob 島が最大であつて、其面積全島の半以上に及で居る、此島には樹木繁茂し且つ其樹質建築及び造船材として良好である、人口は面積に比し甚だ少なく僅かに 3,600 人に過ぎない、以前は 40,000 人以上あつたが流行病の爲め激減したものである。

Mariana 群島は小笠原島を離る南方 1400 哩で弧形を畫き列をなして南北の長さ 600 哩に亘り大なる島が 17 ありて、多數の小島が附屬して居る其面積 250 方哩米領 Guam 島の南方に海深 5,000 尋以上に達する有名なる Mariana 深淵あり、山は總て火山質で現に六座の活火山がある、此の群島は 1,520 年 Magellan に依て發見され其當時人口約 40,000 人に達して居たろうだが現今では 13,000 人位である其内 10,000 人内外は米領に住し我領地には僅に 3,000 人位である。南洋の物産。磷鑛石、Copra を主要なるものとし、其他玳瑁、高瀬貝、黒蝶貝、

無刺海參等である、磷鑛は Palau 群島の Angaur, Pililu, 兩島並に西 Karolin Feys 島三島に産し其鑛量 200,000 噸乃至 350,000 噸の推算である、Copra は Marshall 群島の年産 4,000 噸を第一とし其他東 Karolin, Mariana, 西 Karolin, Palau の順序として 2,000 噸の産出ある。

#### 5. 南洋新領土の農業的價值

農學士 明 峰 正 夫 君

南洋新領土は數百の小島嶼より成り其面積は極めて狭く且各島間の距離甚だ遠隔せるを以て交通の不便これに伴ふて大に之を農業生産地として見れば其價值甚だ少きものゝ如きも、其純然たる熱帶圏内に存在することに依つて其價值著しく大となる。其價值ある所謂に就ては之れを二つに分つを得べし。一は生産上の價值なり從來本邦中熱帶圏内に位するは僅に臺灣の南端に過ぎずして而も熱帶植物中是處に十分なる發育を見ること能はざるもの少からずして研究上に於ける價值に於て遺憾の點少からざりき幸に新領土の風土は殆んど如何なる熱帶植物の生長にも適するを以て將來熱帶植物に關する研究地として最も價值あるものと見做すべし。更に之れを生産上より見るも世人の想像するが如く價值少きものに非ず、從來熱帶地方原産の植物生産物にして本邦に輸入せらるゝものゝ内新領土に於て適當なる耕作法を行ふことに由りて、之れが供給の一部を補ふことは容易なるべし特に乾燥椰子仁の如きは現在の生産額に於ても既に約六千噸に達し將來之れが栽培の獎勵をなすときは現在に五倍するの産額を見るは決して難事に非ざるべし、尙此外各種植物の栽培に由りて其生産的價值を高め得るは勿論又數萬噸に達する磷鑛及び無數の水産物あり新領土の生産的價值決して小なりと云ふべからず。

然らば將來に於て如何なる方針の下に新領土の農業を經營すべきやと云ふに土地及び土人に對しては從來獨逸政廳の採りし方針に據り土人の土地所有權を尊重し土人を基礎としての農業を營むを可とすべし。土人は愛すべきの民なり、才能ある民なり、労働者として適當なる民なり。之れを善導し之れを利用して、新領土農業の發達を計るは將來採るべきの方策ならん。然れども新領土の農業を全く土人の手に委するは又策の得たるものに非ず之れが開發を促すが爲めに

は官業としては從來 Ponape 島に行はれたるが如き植物試験園を設置して有用植物の選擇に力め且つ模範的農業の經營に由りて範を土人に垂るゝの必要を感ずると同時に又民業としては從來官有地として耕作に適する土を選びて本邦人の確實なるものに貸下げ又は賣渡し以て一方に於て富源を開發し一方に於ては土人に對し範を示すの必要あるを信ず新領土は土地氣象、労働者等の農業要素に於ては頗る優良なる位置を占め加之衛生上極めて佳良なるの土地なれば邦人は是處に移住して事業を經營するには何等の若痛を感ずることなきは明なり。

○第百九十回、大正四年四月二十四日、經濟學講堂に於て開催

6. 樹木の風に對する屈折運動

農學士 前川 徳 次 郎 君

本年二月二十四日札幌を襲ひたる吹雪のため多くの樹木の風に面せる側に沿ひ樹幹より樹枝に亘り三稜形の固き雪柱を生じたり、この雪柱は裂風の爲め樹が運動を起せしにより多くの横走せる罅隙を生じたり、この罅隙は風に原因する樹木の屈折運動を語るものにして、氏はこの罅隙を分ちて三種とせり、則ち(1)は樹木全体の運動によりて樹幹の基部が地表の雪層に入らんとする部分に現はれたる物にして最も多く認められたり。(2)は樹幹及び樹枝に生ずる罅隙にしてこれは比較的少部分に限られたり。(3)は枝の分岐せる叉狀部に生ずる罅隙にして其方向種々あり又屢々見らるゝ所のものなり。

7. Clinographic net クリノグラフィック、ネット、に就きて、

理學士 中 島 欽 三 君

鑛物の結晶は元來記號等に依つて表はす方法あるも一寸判定に苦むことがある。そこで鑛物の結晶を圖面上に表すことは最も必要なることであると先 clinographic projection クリノグラフィック、プロゼクション、に就て結晶圖の書き方を從來知られたる數氏の例に就て述べられ、habit は結晶の歴史を談る重要なものであるが clinographic projection は此の habit を充分に表すことが出来ない、従て之れに依て新に發見した鑛物を圖に表すことは困難であるとして、其不備の點三ヶ條を述べられ、最後に自己の考案になる clinographic net に就て詳述し其作圖の方法を示さる。

○第百九十一回、大正四年九月二十五日、經濟學講堂に於て開催

8. 南洋旅行談

西 田 彰 三 君

先南洋新領土植物研究の歴史を述べ次に新領土の地理的關係の概要を説き、其植物景觀の概觀を述べて言はく。

Mariana は小笠原群島と Karolin 群島とを連結するものにて其間に於ける主要素の推移は注意に値す。

即ち Cocos nucifera の北限は Mariana 群島の北端 Maug 島(北緯 20 度)と見るを得べく我小笠原(北緯 27 度)に達せず臺灣の南端紅頭嶼(北緯 22 度)に其少量を見るのみなり。

Mangrove は Guam (北緯 14 度)を以て北限とすべく Saipan. 小笠原に達せず我琉球(奄美大島北緯 28 度)臺灣に Brugiera gymnorhiza, Rhizophora mucronata, の兩種の少量を見るは、北赤道流の進路に影響するものなるべく。盛なる Mangrove 帶を見るべきは Truk 島以南の Karolin 群島にあるを覺ゆ。

Bread fruit (*Artocarpus communis*) は Mariana 群島北端の Assongsong 島を以て限度とし太平洋諸島固有のものにして我琉球臺灣小笠原に及ばず、之れ其分布が潮流に依るものにあらざるを以てなるべく、Karolin 群島中 Truk を以て最も豊富とし Ponape, Kusaie 之れに次ぎ Jarut は地質地形の關係より其發生に不利で、Palau, Yap は雨量の少きにより貧弱なり。

Pandanus は南洋諸島一般に能く分布し其種類も又豊富なるものゝ如く、其最も普通に行き渡れるは *Pandanus tectorius* 及び其變種なり。概觀するに、南洋新占領土の植物景觀は熱帶としては貧弱なる發達をなせるものなるべく其原因の主なるものは、地質時代のあまりに古からざると大暴風の數次に渡る慘害と野火に依るものなべく、熱帶森林として稍々見るべきは Angaur 島の森林及び之れと同様の關係にありと認めらるゝ Palau 島の外椽諸島特に其礫質土壤の地點なり。Karolin 群島の濕度は Kusaie 最も多く(年平均 6,472 耗)を計り Ponape, Truk, Yap (平均 3,520 耗)之れに次ぐものにして、西 Karolin は既して雨量少く Palau, Angaur 最も少量である従て昔時に於ける森林植物の發生は東

Karolin に發育宜しく西 Karolin に宜しからざりしものゝ如かりしも東方に大暴風時として至り西方に平穩なりしたため比較的 safety に古昔の森林を保存したるものなるべし。

暴風の慘害が此等諸島の植物景觀を貧弱ならしめたるは Kusaie, Ponape 諸島に於て見るを得べく其島を被ふ植物は比較的壯年樹なり。唯 Banyan tree 等の氣根の多き老樹は此の風害に抵抗して殘存し、一頭地を抽きて遠くより眼に入り又 Sonneratia 其他の Mangrove 及び Pandanus 等多枝狀の氣根又は板狀根を有するに依り比較的老樹多し。

次に Mangrove に關する生態的觀察の一二を述べ淡水との關係は從來比較的重視せられたる傾きありとて其反證を Truk, 秋島並に Jaluit 島の如き全然鹽湖にありて全く淡水の注入なき地點に該植物の發生せりと云ふに挙げ、これに關する詳細なる研究の必要を談じ海岸に於ける Mangrove 林の外縁は泥土に非ず細砂を混ぜる泥土なり、之れに下れる氣根は波浪のために其先端磨して魂狀となり其安定の位置に固着せられたる後に於て纖細なる根を下して固着す。Mangrove 林の増大擴張は主として母樹より落下する幼植物の其下に押着するに依つて形成せらるゝものにて、多くの場合流れて前進する事は比較的少く、此は唯一二の短き胚軸を發生する種類及び遠處に運ばるゝ時に於てのみ起る所なるべし。故に Mangrove 林は前方壯樹の群に於て最も盛に子實を着生し其外縁に幼植物の發生盛なるを見る。斯る地帯は約 5—6 M にして此内方には遙に丈に於て特高き Mangrove の老樹帶あるを見るべし、是其樹齡將に枯死に近き者にして、前進の壯樹林は正に此の老樹林に依つて形成せられたるものなるべし。更に其後方内陸に達する數町若しくは數十町の間は一樣平頭の灌木性老樹なり是其地帯は漸く泥炭質と化し、老樹の高きもの既に枯死し次に發生せる壯樹は地味の不良なるに依つて一樣に低性なる發育を遂くるに止まれるに由るものなるべし。外縁壯樹林の發育する地點は普通水深 1—2 尺滿潮時に於て 4 尺を越へざるべし。而して實驗するところに依れば 6—7 尺の高處より落下する Rhizophora の子實は其矢の如き根端に依つて百發百中砂泥に挿着せり、而し

進前ニ壯樹林の平均樹高約 12 尺なるに見れば多くの場合に於て落下せる子實の母樹下に挿着せらるゝや言ふ迄もなし、Mangrove の水面に現はるゝ氣根の高さは満乾潮線高低に依るものにして Truk は低く Palau は概して高さものゝ如し、以上の觀察は満潮線低き Truk に於て行ひたるものにして、他の印度馬來地方の如き其差著しき地方に於ては或は母樹下挿着の比較的困難なるかを思はしむるものあも、しばらく記して識者の研究に待つ。同じく Mangrove をなすものに於ても *Sonneratia acida* のみは主として河口若くは入江の岸等淡鹹兩水の混合する地點に産す、Karolin 群島中何れの諸島にも産すれども獨り Angaur に産せざるは其淡水供給の道なきによるべく Jaluit 島に其産なきも亦同一因に歸すべし。其呼吸根は Truk, Ponape, Kusaie のものは短く 1—2 尺に止まるも、Palau 島産のものは 3—4 尺に達す、此は該島の満干潮の差比較的大きく前記諸島のうれが少なるに起因するものにて、此關係は他の Mangrove に於けると同様なり。Kusaie 本島に於て *Sonneratia* の遠く海中に生ぜるは頗る異觀にして殊に珊瑚礁の外縁近くに於ても巨大なものゝ殘存せるあり、是恐らくは本島の漸次沈降しつゝあに由るものにして、其初め淡水混交の海岸に生じたる該樹も陸地の沈降と共に遠く沖合に位置し、多數の他の樹株は生存上不利の状態に陥り枯死せるも獨り此の二株のみ今日迄尙殘存するものなるべし。而して斯く海中の深所に生育する該樹に於ては最早呼吸根の水面に發生するを見ず。

*Cocos nucifera* の分布が從來諸家の論述せる如く其原因を人爲的なりとなすには讃するを得ず。新占領土諸島に於て觀察せるところに依るに人爲的造林は勿論、元種の渡來種なるは明にして、一も固有種を見るなく、全く印度種と Mexico 種なる以上、彼の北赤道流は遠く Mexico 地方より西流し來り Mexico 種の渡來を助けたるものなるべく印度種は馬來を通じて傳來せるものなるべし。此の關係を現在に於て觀察し得べきは、(1) 新成珊瑚礁上に發生しつゝある椰子林に見るを得べく、Kusaie の Lelo 島南岸の新礁に於て他の草木の一本だも無き礁上に先第一に一本の椰子の木の發生せるを見たり。(2) 更に Karolin 群島に於て略同一緯度にあり、潮流の影響も同様の状態にありながら Palau の外椽結

晶石灰岩礁上には一の椰子樹も見ることなし、此は要するに該岩礁の基脚が波浪に依り撃碎せられ凹入し Cocos の果實が漂着するも容易に着生せられざるに依るものなるべく、只僅に一部海岸 Coral sand の形成せられたる海岸に於てのみ貧弱ながら椰子林の形成せらるゝを見たり、Angaur の沿岸撃浪破壊の直角的岸崖も亦同一の關係に依り Cocos 發生の不良なるを見るべし。(3) Mariana 群島中活火山にして現に噴煙しつつある無人島にして Cocos の發生盛なるを見るは其第三の理由なり。

南洋新占領地に於ける大なる果實種子を有するものは、食用種にあらざれば海洋浮遊性のものなり、前者は固有種を見ることなく其渡來は主として人爲的に依れるや言を待たず、後者は多數の固有種を有し傳來としては最も廣き分布を有するものなり。要するに太平洋諸島の植物の自然分布は主として海流と鳥とによつて遂けられたものにして、大形種子の分布は實に前者に歸すべきものとす。

次に Palau, Yap 兩島に於ける Nepenthes の二種に就て其觀察せる點を述べ壺内の液汁は或は乾燥に對する保護の目的を並有するにあらざるなきかを疑はしむる點を、其發生の場所の主として乾燥性の地點なること、及び雨中と乾天に依て壺上の蓋子の開閉性運動あることに就て述べらる。

最後に小笠原 Saipan, Truk, Ponape, Kasaie, Jaluit 等の植物を旅行の順に従て概説し Yap, Palau の植物景觀に及ぼし、Palau の火山岩より成る主島は Yap の植物分布と同一系統に屬すべきものなるも其外縁を形成する結晶性石灰岩諸島の植物景觀は獨特のものなるべく、雨水の浸潤少きと空氣の乾燥せるとに依り母岩の崩壊少く従て此處に發生する植物は樹高概して低きも能く特殊の種類を藏し海面を壓して密生せり。

Angaur の植物は要するに Palau 群島の外縁珊瑚礁若しくは礫上に發達せる植物區景として見るを得べく其森林は莊觀幽邃なるものなり。

東 Karolin の Truk, Ponape, Kusaie 三島は地形概して高峻なる火山岩島にして雨量も他の諸群島に越えて多量なるにより、其植物生育の甚旺盛なるべきに、

此等諸島は既述の如く屢々大暴風の慘害を受けたるに由り昔日の壯觀を見るは唯 Ponape, Kusaie の豁谷に残存する森林に過ぎず。然れども其低性珊瑚礁上の植物は雨量の豊なるにより他の諸群島の夫れれに比し遙に發育旺盛にして且種類にも富む。

Marshall 群島は低性珊瑚礁にして且雨量も東 Karolin 諸島に比し遙に少量なるよりに、其植物は一般に貧弱なる發達をなし、從て特異なる種類は唯二三を見るに過ぎず、又 Mariana 群島は比較的新しき火山群島なるにより植物の發生も亦豊ならず、然かも其南北に渡る 200 里の列島が緯度の差と潮流の影響とにより漸遷的景觀を呈するは亦甚獨特なり。

終りに新占領土經營に關する特論ありしも茲に略す。



#### 正 誤

第五卷第三號 225 頁にある大島正滿君の地方准會員とあるは地方正會員の誤りに付き訂正す。

發行所

石狩國札幌區東北帝國大學農科大學內  
札幌博物學會

印刷所

石狩國札幌區北一條西三丁目二番地  
文榮堂活版所

印刷者

石狩國札幌區北一條西三丁目二番地  
山中國松

發行者  
編輯者

石狩國札幌區北一條西七丁目三番地  
河野常吉

大正四年十二月一日發行  
大正四年十二月五日印刷

## 目 次

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 宮部金吾、工藤祐舜—北海道植物誌<br>料 V.....                   | I  |
| 新島善直—とまづを害する象鼻蟲<br>新種に就て.....                  | 10 |
| 逸見武雄—セプトリア屬—新種の寄<br>生に因る大豆の新病害褐紋病に<br>就きて..... | 12 |
| 里正義—蒙古の乾酪所謂奶豆腐に就<br>て.....                     | 18 |
| 松本巍—柳類の銹菌に關する接種試<br>驗.....                     | 22 |

### (以上 歐 文)

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 河野常吉—アイヌの古代風俗の研究<br>に就て..... | 38 |
| 田所哲太郎、有泉方松—はこべの醗<br>酵に就て.... | 43 |
| 里正義—白血球の喰脂現象に就て...           | 52 |
| 宮部金吾—故農學士川上瀧彌君略傳             | 70 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 本會記事 (自大正四年二月至大正四<br>年十月) | 73 |
|---------------------------|----|

## CONTENTS.

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| K. Miyabe and Y. Kudo,—Materials<br>for a Flora of Hokkaido V.....                                                                                    | I  |
| Y. Niisima,—Ein neuer Russelkäfer-<br>schadling für die Sachlintanne.                                                                                 | 10 |
| T. Hemmi,—A New Brown-Spot<br>Disease of the Leaf of <i>Glycine</i><br><i>hispida</i> MAXIM. caused by <i>Septoria</i><br><i>Glycines</i> sp. n. .... | 12 |
| M. Sato,—Einiges über den mongoli-<br>schen Käse genannt <i>Naitofu</i> . ...                                                                         | 18 |
| T. Matsumoto,—Impfversuchen mit<br><i>Melampsora</i> .....                                                                                            | 22 |

### (Articles in Japanese.)

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| T. Kōno,—On the Method of Resear-<br>ches on the Ancient Customs of<br>the Aino.....             | 38 |
| T. Tadokoro and M. Ariidzumi,—On<br>the Enzymes of <i>Stellaria media</i> ...                    | 43 |
| M. Sato,—Über die Fett-Phagozy-<br>tosen der Leukozyten. ....                                    | 52 |
| K. Miyabe,—A Brief Biography of<br>the Late TAKIYA KAWAKAMI, <i>Nō-</i><br><i>gakushi</i> . .... | 70 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Proceedings of the Society (Feb. 1915<br>—Oct. 1915) ..... | 73 |
|------------------------------------------------------------|----|