HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	本邦產花蚤科の研究 （第四追補）
Author(s)	河野, 廣道
Citation	札幌博物学会会報, 13(1), 29-31
Issue Date	1933-07-31
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/64046
Type	journal article
File Information	Vol.13No.1_006.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

DIE MORDELLIDEN JAPANS (COL.)

(VIERTER NACHTRAG)

VON

HIROMICHI KÔNO

Glypa malaccana PIC

Glypa malaccana PIC, L'Echange, XXVII, p. 90 (1911); MIWA, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXIII, p. 10 (1933).

Fundort: Okinawa (Ins. Iriomete, nach Y. MIWA).

Verbreitung: Malacca, Formosa, Ins. Iriomete.

J. N.: *Kôto-obihananomi.*

Mordella composita WALKER

Mordella composita WALKER, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), II, p. 286 (1858); MIWA, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXIII, p. 10 (1933).

Fundort: Okinawa (Ins. Iriomete, nach Y. MIWA).

Verbreitung: Ceylon, Formosa, Ins. Iriomete.

J. N.: *Koshun-hananomi.*

Mordella splendens MIWA

Mordella splendens MIWA, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXIII, p. 10 (1933).

Fundort: Okinawa (Ins. Iriomete, nach MIWA).

J. N.: *Kinboshi-hananomi.*

Mordellistena signatella MARSEUL

Mordellistena signatella MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr. (5), VI, p. 476 (1876).

Fundort: Okinawa (Ins. Iriometa, 1 ♂, V. 1932, S. HIRAYAMA).

J. N.: *Futaobi-himehananomi.*

Mordellistena hirayamai n. sp.

Dunkelbraun, teilweise verdunkelt; Scheitel dunkel, Fühler schwarz, 4 basalen Glieder gelb, Halsschild mit 4 grossen dunklen Makeln, Flügeldecken grösstenteils schwarz, an der Basis rotbraun. Behaarung dunkel, goldgelb schimmernd; 4 grosse Makel des Halsschildes, ein grosser hakenartiger Basalmakel und ein grosser dreieckiger Makel hinter der Mitte jeder Decke schwarz.

Jedes Fühlerglied ein wenig länger als breit, das 3te Glied klein, nur halb

[Transact. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XIII, Pt. 1, 1933]

so lang wie das 2te, das 4te etwas grösser als das 3te, die folgenden bedeutend grösser als das 3te, die 5.–10. fast gleich lang. Halsschild so lang wie breit, an den Seiten nach vorn schwach verjungt, an der Basis zweibuchtig, die Hinterecken rechtwinklig. Schildchen kurz, bedeutend breiter als lang. Flügeldecken ziemlich dicht punktiert. Pygidium 3 mal so lang wie das Analsegment. Hinterschiene ein wenig länger als das erste Hintertarsenglied, mit 3 stark schrägen Einkerbungen, der innere Endsporn fast 4 mal so lang wie der äussere. Das erste so wie auch das 2te Hintertarsenglied mit je 2 Einkerbungen, das 3te ohne solche.

Körperlänge: 3 mm.

M. signatella MARSEUL ähnlich, aber Zeichnung und Fühlerbildung anders.

Fundort: Okinawa (Ins. Iriomete, 1 ♀, V. 1932, S. HIRAYAMA).

J. N.: *Hirayama-himehananomi.*

Mordellistena pelecotomoidea PIC

Mordellistena pelecotomoidea PIC, Deutsch. Ent. Nat.-Bibl., II, p. 189 (1911).

Das Tierchen ist bisher nur aus Formosa bekannt. Bei mir auch liegen ein Exemplar aus Okinawa vor.

Fundort: Okinawa (Ins. Iriomete, 1 ♀, V. 1932, S. HIRAYAMA).

Verbreitung: Formosa, Ins. Iriomete.

J. N.: *Kiiro-himehananomi.*

Mordellistena chibi KÔNO

Mordellistena chibi KÔNO, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., XII, p. 156, Pl. IV, f. 7, 17 (1932).

Diese bis jetzt nur aus Honshu bekannte Art wurde kürzlich von Herrn H. YAKU in Hokkaido erbeutet.

Fundorte: Hokkaido (Sapporo, 4 Ex., 11/VII. 1932, H. YAKU); Honshu.

J. N.: *Chibi-himehananomi.*

Anaspis (Nassipa) karafutona n. sp.

Schwarz; Mundteil und 3 oder 4 basalen Fühlerglieder gelbrot, Beine schwarzbraun bis schwarz. Behaarung fein, bräunlich, gleichmässig angeordnet.

♂. Fühler viel kürzer als der halbe Körper, das 3te und 4te Glied gleich lang, länger als das 2te, das 5te kürzer als das 4te, die 7.–10. Glieder perlschnurförmig, Halsschild bedeutend breiter als lang, an der Basis schwach zweibuchtig, Hinterwinkel rechtwinklig. Schildchen dreieckig. Flügeldecken an der Basis so breit wie das Halsschild, gleichmässig fein gerunzelt. Das 3te Bauchsegment in der Mitte vorgezogen und trägt am Ende 2 gerade Anhänge, welche an der Basis eng zusammen stehen, nach hinten zu divergieren und die Spitze

den Hinterrand des 4ten Bauchsegmentes etwas überragen. Das 4te Bauchsegment einfach. Voderschenkel verdickt. Das 2te Vordertarsenglied viel breiter und reichlich 2 mal so lang wie das erste, das 3te etwas grösser als das erste. Die Endsporne der Hinterschiene fast gleich lang.

♀. Die 6.–10. Fühlerglieder schwach perlschnurförmig. Das 3te Bauchsegment einfach. Das erste Vordertarsenglied fast so lang wie die folgenden 2 zusammen.

Körperlänge: 3–3.5 mm.

Fundort: Sachalin (Kashiho, 1 ♂ u. 2 ♀, 1/VIII. 1932, Maguntan, 1 ♀, 23/VII. 1932, Tarandomari, 1 ♂, 18/VII. 1932, H. KÔNO).

A. rufilabris GYLL. ähnlich, aber das letzte Fühlerglied kräftiger und die Anhänge des 3ten Bauchsegmentes viel kürzer.

J. N.: *Karafuto-funagatahananomi.*

摘　　要

本邦産花蚤科の研究

(第四追補)

河　野　廣　道

本文は私が曩に札幌博物學會報第十卷に發表した「本邦産花蚤科の研究」の第四追補である。第三追補迄に知られた本邦産花蚤科の甲蟲は合計 49 種であつたが、その後三輪勇四郎氏が沖繩から一新種を記載し、私が本文に二新種を發表したから、總計 52 種となる。

本文に記載した新種の學名及び和名は次の如くである。

Mordellistena hirayamai KÔNO	ヒラヤマヒメハナノミ
Anaspis (Nassipa) karafutana KÔNO	カラフトフナガタハナノミ