



Title	台灣産Ochyromera屬の一新種
Author(s)	河野, 廣道
Citation	札幌博物学会会報, 16(1), 27-27
Issue Date	1939-07-31
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/64252
Type	journal article
File Information	Vol.16No.1_004.pdf



Eine neue *Ochyromera*-Art aus Formosa.

Von

Hiromichi KÔNO.


(河野 廣道)

Mit 1 Figur.

Ochyromera miwai n. sp.

Färbung dunkelbraun; Tarsen gelb, Augen schwarz. Schildchen gelb tomentiert.

Stirn zwischen den Augen nur $\frac{1}{3}$ so breit wie der Rüssel. Augen gross, deutlich länger als breit, mässig gewölbt. Rüssel so lang wie Kopf und Halsschild zusammen, parallelseitig, schwach gebogen, auf der Oberseite schwach punktiert, in der Basalhälfte mit schwachem Mittelkiel und je 2 Längsfurchen



Ochyromera miwai KÔNO

beiderseits desselben. Fühler weit vor der Mitte des Rüssels eingelenkt; das Schaftglied am Ende etwas verdickt; das erste Geisselglied verkehrt konisch, fast so long wie die folgenden 2 Glieder zusammen, das 2te Geisselglied viel länger als breit, das 3te nur so lang wie breit. Halsschild quer, an den Seiten abgerundet und am Vorderrand zylindrisch abgeschnürt; die Punktierung grob und ziemlich dicht. Schildchen länger als breit, etwas vorragend. Flügeldecken anderthalbmal so lang wie zusammen breit, vor der Mitte fast parallelseitig, dann nach hinten verschmälert; die Naht an der Spitze klaffend; die Längsstreifen fein, in den Streifen weitläufig punktiert; die Zwischenräume der Punktstreifen breit. Vorderschenkel stark gekeult und mit einem grossen Zahn. Mittel- und Hinterschenkel einfach gezähnt. Vorderschenkel gekrümmt.

Körperlänge: 4 mm.

Fundort: Formosa (2 Ex., 2/V. 1938, gesammelt von Dr. Y. MIWA).

Dr. Y. MIWA teilte mir brieflich mit, dass diese Art in Formosa an „Kaki“ ziemlich schädlich ist.

Diese Art widme ich ergebenst ihren Entdeckern.

Japanischer Name: *Kaki-hamugurizô*.