



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	遺伝子編集により単離したネイティブ自己抗原を用いた自己免疫性水疱症の新規診断法〔論文内容及び審査の要旨〕
Author(s)	眞井, 翔子
Description	配架番号 : 2783
Degree Grantor	北海道大学
Degree Name	博士(医学)
Dissertation Number	甲第15465号
Issue Date	2023-03-23
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/90013
Rights(URL)	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Type	doctoral thesis
File Information	MAI_Shoko_abstract.pdf, 論文内容の要旨



学位論文内容の要旨

博士の専攻分野の名称 博士（医 学） 氏 名 眞井 翔子

学 位 論 文 題 名

遺伝子編集により単離したネイティブ自己抗原を用いた自己免疫性水疱症の新規診断法

(Novel diagnostic method for autoimmune bullous disease using native autoantigen isolated by gene editing)

【背景と目的】類天疱瘡群は、組織学上表皮下水疱形成を特徴とし、その自己抗体は、皮膚の表皮真皮境界部もしくは粘膜上皮と粘膜固有層間に存在する基底膜部タンパクを標的とする。類天疱瘡群は類天疱瘡と後天性表皮水疱症に大別され、類天疱瘡はその自己抗原と臨床症状により分類される。主な亜型として、水疱性天疱瘡 (bullous pemphigoid, BP)、粘膜類天疱瘡 (mucous membrane pemphigoid, MMP)がある。

BP、MMP においてはヘミデスモソーム(HD)タンパクである XVII 型コラーゲン (Type XVII collagen, COL17) が主要な自己抗原となる。特に BP において、その自己抗体の主要なエпитープは COL17 の細胞外領域の非コラーゲン領域である 16A (NC16A)ドメインであるため、大腸菌によって産生された NC16A ドメインのポリペプチドを利用した enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) は診断に広く利用されている。近年、本研究室では DDDDK-tag 付きリコンビナント全長 COL17 タンパク (recombinant COL17、rCOL17)を基質とする ELISA (rCOL17 ELISA)を確立した。rCOL17 ELISA は、COL17 のあらゆる領域を標的とする抗 COL17 自己抗体が検出可能である。特に dipeptidyl peptidase-IV 阻害薬 (dipeptidyl peptidase-IV inhibitor, DPP4i)によって誘発された BP (DPP4i-associated BP、DPP4i-BP) の検出に有用である。しかし、これらに用いられているようなリコンビナントタンパクは、一般的に翻訳後修飾を欠くため、ネイティブな自己抗原と同等ではない。これらの違いは、リコンビナントタンパク質を利用したアッセイにおける自己抗体検出の障害となり得る。そこで、内在性の自己抗原としてネイティブな COL17 を用いたアッセイ系の確立を行い、リコンビナントタンパクとの比較を行うこととした。

近年、clustered regularly interspersed short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (CRISPR/Cas9) による遺伝子編集を利用して、内在性遺伝子座へのタグ配列のノックインにより、ネイティブなタンパクへのタグ付けが可能となった。この付加したタグを利用することで生理的条件下に存在するネイティブなタンパクを取得可能となる。自己免疫疾患の診断における自己抗体検出アッセイ系においては、従来の過剰発現させたリコンビナントタンパクを用いた検出系と異なり、ネイティブなタンパク利用したアッセイ系の構築が可能となる。

よって、本研究ではネイティブな状態の COL17 として、不死化ケラチノサイトである HaCaT 細胞が内在性に持つ COL17 を取得することを試みた。HaCaT の内在性 COL17 に一般的なタグとして広く用いられている DDDDK-tag を付加し、タグを利用した免疫沈降法により精製を行い、取得したタンパクの解析を行うこととした。また、類天

疱疹群の中には COL17 以外の HD タンパクを自己抗原とする疾患が存在し、特に MMP 患者は COL17 以外の様々な HD 分子を標的とする自己抗体も有しているため、rCOL17 ELISA はすべての MMP 自己抗体を同定することはできない。そこで、内在性のネイティブな状態の COL17 を中心とした HD タンパクを一塊として取得し、その複合体を固相化抗原として用いた新規 ELISA を作成し、MMP 自己抗体の検出に有用であるかどうかを検証する。

【材料と方法】 CRISPR/Cas9 を用いた遺伝子編集により、COL17A1 遺伝子座に DDDDK-tag をノックインした HaCaT 不死化ケラチノサイトを作製し、DDDDK-tag を用いた免疫沈降法を行う。それによりネイティブな自己抗原複合体を単離し、含まれているタンパクの解析を行う。次に、この複合体タンパク質を固相化抗原とした ELISA システムを作成する。BP、MMP の診断をそれぞれ満たす症例と健常人血清を本研究のために使用し、BP 血清と健常人血清を用いて、カットオフ値を決定する。BP、MMP 血清で全長 COL17 ELISA との比較を行う。また、DPP4i 存在下で細胞培養を行い、薬剤による内在性 COL17 の抗原性の変化の有無について検討を行う。

【結果】 CRISPR/Cas9 による HaCaT の内在性 COL17 へのタグ付けにより、ネイティブな COL17 だけではなく、COL17 結合タンパクである integrin $\alpha 6 \beta 4$ などのタンパクを含んだ自己抗原複合体を取得できた。また、このネイティブ COL17 の複合体には全長の COL17 のみではなく、生理的に切断されたと考えられる短い COL17 断片も含まれていた。その複合体を固相化抗原とした新規 ELISA (native COL17 ELISA、nCOL17 ELISA) を作成し、BP と健常人血清から ROC 解析を行い、カットオフ値を決定した。BP 症例を用いた ELISA ではリコンビナント COL17 を基質として用いた場合と大きな差は見られなかったが、nCOL17 ELISA 優位に反応した血清も見られ、それらの中では COL17 断片に対して反応していた血清が見られた。また、55 例の MMP 症例に対して nCOL17 ELISA を施行したところ、感度と特異度はそれぞれ 70.9% と 87.5% であり、MMP 自己抗体の検出において、従来の類天疱疹の自己抗体検出系と比較してはるかに優れたものであった。また、DPP4i 存在下で細胞培養を行い、その有無による DPP4i-BP 血清の nCOL17 ELISA index 値の比較を行ったが有意な差は見られなかったため、DPP4i は直接 COL17 の抗原性変化をもたらしてはいないことがわかった。

【考察】 本研究により、COL17 を中心とした基底膜部タンパク複合体を一塊に取得可能となった。MMP の自己抗体は様々な自己抗原に反応するため、この自己抗原複合体を用いた新規 ELISA はリコンビナントタンパク単独の検出系よりも MMP の自己抗体検出に有用であった。MMP のような自己抗体が様々な分子を標的とする自己免疫疾患では、抗原とタンパク質の複合体を分離することがより良い診断系の確立に役立つと考えられた。CRISPR/Cas9 による HaCaT の内在性 COL17 へのタグ付けによる自己抗原回収は、他の内在性基底膜タンパクを回収する系と比較して、簡便でありタンパク精製可能であるため優れた系である。

【結論】

遺伝子編集により COL17 を中心とした基底膜部タンパク複合体を一塊に取得可能となった。この自己抗原複合体を用いた新規 ELISA は MMP の自己抗体検出に有用であった。