



| | |
|------------------|---|
| Title | Die Heteromeren aus den Kurilen (CoL.) (Erster Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kurilen) |
| Author(s) | Kono, Hiromichi |
| Citation | Insecta matsumurana, 9(3), 85-89 |
| Issue Date | 1935-03 |
| Doc URL | https://hdl.handle.net/2115/9291 |
| Type | departmental bulletin paper |
| File Information | 9(3)_p85-89.pdf |



DIE HETEROMEREN AUS DEN KURILEN (*COL.*)
(ERSTER BEITRAG ZUR KENNTNIS
DER KÄFERFAUNA DER KURILEN)

VON

HIROMICHI KÔNO

Herr K. DOI hat sich die Erforschung der Insektenfauna der Kurilen zur Aufgabe gestellt und mir die Heteromeren seiner Sammelausbeute zur Bearbeitung zugesandt. Ausserdem erhielt ich von Herrn M. L. PEELE 2 auf der Insel Etorofu gesammelte Arten. Hiermit drücke ich den beiden Herren für ihre Freundlichkeit meinen herzlichsten Dank aus.

Familie *OEDEMERIDAE*

Tribus **Nacerdini**

1. *Xanthochroa atriceps* LEWIS

Xanthochroa atriceps LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 436 (1895); KÔNO, Ins. Mats., VI, 3, p. 141 (1932); id., Ins. Mats., IX, p. 27 (1934); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundorte: Ins. Kunashiri (Nikishiro, 1 ♂ u. 1 ♀, 12/VIII. 1925, K. DOI, Fushikokotan, 1 ♀, 11/VIII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Kikubi-kamikirimodoki*.

2. *Xanthochroa hilleri* HAROLD

Xanthochroa hilleri HAROLD, Deutsch. Ent. Zeitschr., XX, p. 71 (1878); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 108 (1933).

Xanthochroa hilleri KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 62 (1931); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 27 (1934).

Fundort: Ins. Shikotan.

G. V.: Kurilen, Hokkaido, Honshu, Shikoku.

J. N.: *Kiuro-kamikirimodoki*.

3. *Ezonacerta nigripennis* (MATSUMURA)

Oedemera nigripennis MATSUMURA, Journ. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ., Sapporo, IV, p. 128 (1911); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931).

[Ins. Mats., Vol. IX, No. 3, March, 1935]

Nacerda nigripennis KÔNO, Ins. Mats., VI, p. 143 (1932); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Ezonacerda nigripennis KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 28 (1934).

Fundorte: Ins. Etorofu (Rubetsu, 1 ♀, 3/VIII. 1931, M. L. PEELE); Ins. Shikotan.

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido.

J. N.: *Kuro-kamikirimodoki*.

Tribus **Asclerini**

4. *Chrysanthia viatica* LEWIS

Chrysanthia viatica LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 443 (1895); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., p. 110 (1933); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 29 (1934).

Fundorte: Ins. Etorofu (Oyama, 1 Ex., 24/VII. 1924, K. DOI); Ins. Shikotan (Notoro, 1 Ex., 14/VII. 1925, Shakotan, 1 Ex., 22/VII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Suji-kamikirimodoki*.

Tribus **Oedemerini**

5. *Oedemera concolor* LEWIS

Oedemera concolor LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 442 (1895); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 30 (1934).

Fundorte: Ins. Etorofu (Kamuikotan, 2 ♀, 20/VII. 1927, Shana, 1 ♂, 9/VII. 1927, K. DOI); Ins. Shikotan (Shakotan, 1 ♂ u. 2 ♀, 6/VII. 1925, Horobetsu, 2 ♂ u. 1 ♂, 10/VII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido.

J. N.: *Kuroao-kamikirimodoki*.

6. *Oedemera lucidicollis* MOTSCHULSKY

Oedemera lucidicollis MOTSCHULSKY, Bull. Mosc., XXXIX, 1, p. 174 (1866).

Oedemera montana MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), VI, p. 485 (1876); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundorte: Ins. Etorofu (Shana, 1 ♂ u. 1 ♀, 30/VII. 1927, K. DOI); Ins. Shikotan; Ins. Kunashiri (Nikishiro, 2 ♀, 12/VIII. 1925, K. DOI).

G. V.: Kurilen, Hokkaido, Honshu, Kiushu.

J. N.: *Momobuto-kamikirimodoki*.

Familie *PYROCHROIDAE*1. *Schizotus fuscicollis* (MANNERHEIM)

Pyrochroa fuscicollis MANNERHEIM, Bull. Mosc., p. 301 (1852).

Schizotus fuscicollis KÔNO, Ins. Mats., III, p. 65 (1929); id., Ins. Mats., IX, p. 30 (1934); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundorte: Ins. Paramushiru (Nosauki, 2 ♂ u. 1 ♀, 9/VII. 1926, Arakawa, 1 ♂, 7/VII. 1926, K. Doi).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Kamtchatka, Sibirien.

J. N.: *Karafuto-akahanemushi*.

2. *Pseudopyrochroa rufula etorofuensis* n. subsp.

Pseudopyrochroa vestiflua KÔNO, Ins. Mats., III, p. 69 (1929); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Die mir vorliegenden 5 Exemplare aus den Süd-Kurilen—in dieser Lokalität wurde das Männchen noch nicht aufgefunden—haben Fühler mit etwas längeren und schlankeren Ästen als die der Stammform.

KOBAYASHI'sche *vestiflua* aus der Ins. Shikotan ist auch höchst wahrscheinlich auch *etorofuensis*.

Fundorte: Ins. Etorofu (Kamuikotan, 2 ♀, 20/VII. 1927, Iriribushi, 1 ♀, 22/VII. 1927, Naipo, 1 ♀, 18/VII. 1927, Shana, 1 ♀, 10/VII. 1927, K. Doi); Ins. Shikotan.

G. V.: Kurilen.

J. N.: *Akahanemushi*.

Familie *MELOIDAE*Tribus **Meloini**1. *Meloe lobata* GEBLER

Meloe lobata GEBLER, Nouv. Mém. Mosc., II, p. 57 (1832); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933); KÔNO, Ins. Mats., IX, p. 31 (1934).

Fundort: Ins. Kunashiri (nach T. KANO).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Ins. Querspart, Korea, Ost-Sibirien.

J. N.: *Karafuto-tsuchihanmyo*.

Familie *MORDELLIDAE*Tribus **Mordellini**1. *Mordella aculeata* LINNÉ

Mordella aculeata LINNÉ, Syst. Nat., ed. X, p. 420 (1758); KÔNO, Ins. Mats., III, p. 83 (1929);

id., Ins. Mats., IX, p. 33 (1934); KOBAYASHI, Trans. Kansai Entom. Soc., 2, p. 63 (1931); KANO, Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, p. 110 (1933).

Fundort: Ins. Shikotan (1 Ex., 14/VII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Korea, Mongolei, Kamtschatka, Sibirien, Europa.

J. N.: *Kuro-hananomi*.

Tribus **Anaspidini**

2. **Anaspis frontalis** (LINNÉ)

Mordella frontalis LINNÉ, Syst. Nat., ed. X, p. 420 (1758).

Anaspis frontalis KONO, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., XII, p. 154 (1932); id., Ins. Mats., IX, p. 34 (1934).

Fundort: Ins. Shikotan (1 ♀, 9/VIII. 1931, M. L. PEELE).

G. V.: Sachalin, Ins. Kaibato, Kurilen, Hokkaido, Sibirien, Europa.

J. N.: *Ô-kuro-funagatahananomi*.

Familie **SERROPALPIDAE**

Tribus **Serropalpini**

1. **Serropalpus niponicus** LEWIS

Serropalpus niponicus LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XV, p. 263 (1895); KONO, Ins. Mats., IX, p. 35 (1934).

Fundort: Ins. Kunashiri (Fushikokotan, 1 Ex., 11/VIII. 1925, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Hoso-nagakuchiki*.

Familie **TENEBRIONIDAE**

Tribus **Phalerini**

1. **Phaleromela subhumeralis** (MARSEUL)

Phaleria subhumeralis MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), VI, p. 102 (1876).

Bisher ist diese Art nur aus Hokkaido, Honshu und Sachalin bekannt. Neuerdings ist ihr Vorkommen auch auf den Kurilen festgestellt worden.

Fundort: Ins. Uruppu (Onsenzaki, 3 Ex., 10/IX, 1927, K. DOI).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Kamtschatka.

J. N.: *Ko-hone-gomimushidamashi*.

2. **Obenbergeria riederi** (FALDERMAN)

Phaleria Riederi FALDERMAN, Bull. Mosc., VI, p. 57, t. 3, f. 8 (1833).

Diese von Mandschurei bis Kamtschatka weit verbreitete Art kommt auch

auf den Kurilen vor. Meine Sammlung weist bereits 5 Exemplare aus dieser Lokalität auf.

Fundorte: Ins. Uruppu (Tokotan, 3 Ex., 31/VIII. 1927, Kobuneminato, 1 Ex., 26/VIII. 1927, K. Doi); Ins. Shikotan (1 Ex., 5/VII. 1925, K. Doi).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu, Kamtschatka, Mandschurei.

J. N.: *Hone-gominushidamashi*.

Tribus **Helopini**

3. ***Stenophanes strigipennis*** MARSEUL

Stenophanes strigipennis MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr., (5), VI, p. 138 (1876).

Dass dieses Tierchen auch auf den Kurilen vorkommt, ist eine Neufeststellung.

Fundort: Ins. Etorofu (Shana, 1 Ex., 12/VII. 1927, K. Doi).

G. V.: Sachalin, Kurilen, Hokkaido, Honshu.

J. N.: *Hime-kimawari*.

4. ***Stenophanes strigipennis doii*** n. subsp.

Das Tierchen unterscheidet sich von der Stammform durch das viel kürzere und breitere Halsschild mit der weniger gewölbten Scheibe.

Fundort: Ins. Uruppu (Onsenzaki, 3 Ex., 10/IX, 1927, K. Doi).

G. V.: Kurilen.

Literaturverzeichnis

- 1929 KÔNO, H.: Die Pyrochroiden Japans (Ins. Mats., III, pp. 62-72).
 ——— : Die Mordelliden Japans, Erster Nachtrag (Ins. Mats., III, pp. 83-86).
- 1931 KOBAYASHI, K.: Chishima-no-kuni Shikotan-tô no Saishûhin ni tsuite (Trans. Kansai Ent. Soc., 2, pp. 55-66).
- 1932 KÔNO, H.: Die Nacerdinen Japans (Ins. Mats., VI, pp. 138-144).
- 1933 KANO, T.: Coleopterous Insects from the Northern Kuriles, with Some Considerations on the Insect-Fauna of the Kurile Islands (Bull. Biogeogr. Soc. Jap., IV, pp. 91-121).
- 1934 KÔNO, H.: Die Heteromeren von Sachalin (Ins. Mats., IX, pp. 27-40).