HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	2006年度 グラフ理論講義ノート
Author(s)	井上, 純一
Issue Date	2006
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/15412
Rights(URL)	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/
Type	learningobject
Note(URL)	http://www005.upp.so-net.ne.jp/j_inoue/index.html; http://chaosweb.complex.eng.hokudai.ac.jp/~j_inoue/
Additional Information	There are other files related to this item in HUSCAP. Check the above URL.
File Information	GraphTheory06_slide9.pdf (第9回講義スライド)

Instructions for use

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

グラフ理論　#9

第9回講義　6月5日

--- 双対グラフ、グラフの点彩色 ---

情報科学研究科　　井上純一

http://chaosweb.complex.eng.hokudai.ac.jp/~j_inoue/

演習問題8の解答例

全ての点の次数が4であるので

$$4n = \sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2m \quad \therefore 4n = 2m$$



辺の両側には
必ず2面ある

オイラーの公式: $n = 2m - f$を代入し、nを消去 ： $2m + 8 = 4f$

k角形の個数をφ_kとすると

$$f = \sum_{k=3} \varphi_k, \quad 2m = \sum_{k=3} k\varphi_k$$

題意を示すために、全ての量を
k角形の個数で書き直す

従って、これらを用いて

$$3\varphi_3 + 4\varphi_4 + 5\varphi_5 + 6\varphi_6 + \cdots + 8 = 4\varphi_3 + 4\varphi_4 + 4\varphi_5 + 4\varphi_6 + \cdots$$

$$\therefore \quad \varphi_3 - (\varphi_5 + 2\varphi_6 + \cdots) - 8 = 0 \leq \varphi_3 - 8$$

$$\therefore \quad \varphi_3 \geq 8$$

従って、考える平面グラフには3角形が8個以上ある

演習問題8の補足

全ての点の次数が **4でなくて3** ならば何が言えるか？

2004年度情報工学
演習II(B)(グラフ理論)
#1 問題6

握手補題から、$3n = 2m$であるが、これとオイラーの公式を組んで

$6 + m = 3f$

k角形の個数をφ_kとすると

$$f = \sum_{k=3} \varphi_k, \quad 2m = \sum_{k=3} k\varphi_k$$

代入してはじめの数項を書き出してみると

$$3\varphi_3 + 2\varphi_4 + \varphi_5 - \varphi_7 - 2\varphi_8 - \cdots = 12$$

$$\therefore \ \varphi_3 + \varphi_4 + \varphi_5 \geq \tfrac{1}{3}\left(3\varphi_3 + 2\varphi_4 + \varphi_5\right) \geq \tfrac{1}{3} \times 12 = 4$$

グラフには 3, 4, 5角形が少なくとも 4 個以上含まれることが言える

幾何学的双対グラフ

幾何学的双対グラフの作り方

(1)グラフGの各面 f の内側の点 v^* を選ぶ⇒双対グラフG^*の点となる

(2)グラフGの各辺 e に対応させて、e に交差する線 e^* を描いて、
eに接する2つの面fの点 v^* を結ぶようにする⇒双対グラフG^*の辺となる



破線と白丸からなるグラフ
が実線と黒丸からなるグラフの
幾何学的双対グラフになっている

幾何学的双対グラフの例

完全グラフK_4の幾何学的双対グラフは完全グラフK_4である



補題15-1とその証明

平面グラフGには n 個の点、m 本の点、f 個の面がある。
幾何学的双対グラフG^*には n^* 個の点、m^*本の辺、f^*個の面があるならば

$$n^* = f,\ m^* = m,\ f^* = n$$

が成り立つ　　補題15.1

（証明）

双対グラフの作り方から、$n^* = f, m^* = m$ は明らか。

オイラーの公式より

$n^* - m^* + f^* = 2$、$f^* = 2 - n^* + m^* = 2 - f + m = n$

従って、$f^* = n$



定理15-2

グラフGが連結平面ならば、G^{**}はグラフGと同形である

（例）

$$G \cong G^{**}$$



同形写像が存在する
ことは講義ノート参照

定理15-3

平面グラフGの幾何学的双対をG^*とする。グラフGの各辺のある集合が
グラフGにおいて閉路であるための必要十分条件は、それに対応する
双対グラフG^*の辺集合が、グラフG^*においてカットセットになっていることである

$\{\overline{v^*a}, \overline{v^*b}, \overline{v^*c}, \overline{v^*d}, \overline{v^*e}, \overline{v^*f}\}$は$G^*$においてカットセットになっている



系15・4

グラフGのある辺集合がGのカットセットであるための
必要十分条件は、対応する幾何学的双対グラフG^*の辺集合が
G^*の閉路となることである

Gのカットセット: $\{\overline{17}, \overline{28}, \overline{39}, \overline{410}, \overline{511}, \overline{612}\}_G$

対応する幾何学的双対グラフG^*の辺集合

$\{\overline{fa}, \overline{ab}, \overline{bc}, \overline{cd}, \overline{de}, \overline{ef}\}$

G*においては閉路となっている



（証明のアウトライン）

定理15・3をG→G*、G*→Gとして読みかえると、**
定理15・2からGとGは同形であるから題意が言える。**

例題8.8の(1)



車輪の幾何学的双対は車輪



例題8.8の(2)



非連結化グラフで
幾何学的双対を作る

両者は同型でない



できあがる
双対グラフ

例題8.8の(3)





同型



補グラフ



グラフの彩色：点彩色

k−彩色可能：
k個の色の一つをGの各点に割り当て、隣接するどの2つの点も同色できること

k−彩色的：
グラフGがk彩色可能であるが、(k−1)彩色不可能であるとき
⇒ グラフGの彩色数はkである

$$\chi(G) = k$$

「彩色数はkである」、というのを
このように表記する



いくつかの代表的グラフに対する例　：

$$\chi(K_n) = n,\ \chi(N_n) = 1,\ \chi(K_{r,s}) = 2$$

定理17-1

単純グラフGの最大次数がΔならば、グラフGは$(\Delta+1)$彩色可能である

（証明）

点数に関する帰納法で示す。

任意の点vとその接続辺を除去してできる$n-1$個の点、最大次数Δのグラフは$(\Delta+1)$彩色可能であると仮定する

vを元に戻し、vに隣接するΔ個以下の点と異なる色でvを彩色すれば、n個の点からなるグラフGの$(\Delta+1)$彩色が得られる



定理17・3

全ての単純平面グラフは6彩色可能である

（証明）

「n−1個の点をもつ全ての単純平面グラフは6彩色可能である」と仮定する

定理13・6より、「全ての単純平面グラフには次数5以下の点がある」



点vを除去すると、n−1個の点からなるグラフができあがるので、仮定より、これは6彩色可能。

点vを元に戻し、vに接続する5個以下の点以外の色でvを彩色すれば、n点からなるグラフの6彩色が得られる

定理17-4

全ての単純平面グラフは5彩色可能である

（証明）

「n−1個以下の点をもつ全ての
単純平面グラフは5彩色可能である」
と仮定する



定理13-6より、Gには次数5以下の
点がある



2本の辺vv1、vv3を縮約する



点vに当てられた色でv1、v3を彩色し、
点vを元々割り当てられた色以外で彩色しなおせば
Gの5彩色が完成する

点v1,v3は同色だから、v1−v5
の中にはまだ使われていない色
が存在する

例題9.1（点彩色の応用例）



	a	b	c	d	e	f	g
a	−	＊	＊	＊	−	−	＊
b	＊	−	＊	＊	＊	−	＊
c	＊	＊	−	＊	−	＊	−
d	＊	＊	＊	−	−	＊	−
e	−	＊	−	−	−	−	−
f	−	−	＊	＊	−	−	＊
g	＊	＊	−	−	−	＊	−

＊は同じ時間帯にあってはならない講義

講義 c, e は α 講時に開講
講義 a, f は β 講時に開講
講義 d, g は γ 講時に開講
講義 b だけは δ 講時に開講

例題9.2の1

G

ここで考えるグラフ







グラフGとG**は同型
同型写像の存在については
講義ノートを参照



定理15.2

例題9.2の1の(1)

G に含まれる任意の点 v について

$\delta \le \deg(v)$ と仮定すると $n\delta \le \sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2m$

ぎりぎり次数 δ の点が含まれると仮定する

握手補題より

G には三角形はないので

$4 \le \deg(F)$ $\therefore 4f \le \sum_{F \in F(G)} \deg(F) = 2m$

オイラーの公式: $f = 2 - n + m$ より f を消去して $m \le 2n - 4$

$\therefore$ $n\delta \le 2m \le 2(2n-4)$

つまり、 $\delta \le 4 - \frac{8}{n}$

nは8以上なので(講義ノート参照)
題意が成立する。

例題9.2の1の(2)





点vを元に戻し、
α、βと異なる色で塗れば
グラフGの3彩色が完成

例題9.3（プラトン・グラフの彩色）

彩色数4

(a)



正四面体

(c)



彩色数2

(b)



彩色数3

正八面体

(d)



彩色数4

正20面体

(E)



彩色数4

正12面体